

PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DIVENCE IBR MARKER LIVE lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční emulzi

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna dávka 2 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BoHV-1), s dvojitou delecí genů
gE- tk-, živý, kmen CEDDEL

$10^{6,3} - 10^{7,6}$ CCID₅₀*

gE- : delecce glykoproteinu E; tk- : delecce thymidinkinázy

* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

Adjuvans:

Montanid IMS

1,010 g

Pomocné látky:

Kvalitativní složení pomocných látek a dalších složek
Lyofilizát:
Hydrogenfosforečnan draselný
Želatina
Glycin
Dihydrogenfosforečnan draselný
Sorbitol
Sacharosa
Rozpouštědlo:
Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného
Chlorid draselný
Dihydrogenfosforečnan draselný
Chlorid sodný
Voda pro injekci

Lyofilizát: bílé až žluté barvy.

Rozpouštědlo: bílá průhledná emulze.

3. KLINICKÉ INFORMACE

3.1 Cílové druhy zvířat

Skot.

3.2 Indikace pro použití pro každý cílový druh zvířat

Aktivní imunizace skotu od stáří 10 týdnů ke snížení vylučování viru, hypertermie a klinických příznaků IBR (infekční bovinní rinotracheitidy).

Nástup imunity: 3 týdny po dokončení základní vakcinace.

Trvání imunity: 6 měsíců po dokončení základní revakcinace.
1 rok po dokončení první revakcinace.

3.3 Kontraindikace

Nejsou.

3.4 Zvláštní upozornění

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

3.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro bezpečné použití u cílových druhů zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření pro osobu, která podává veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně podaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou. Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně podané malé množství, náhodná injekce tohoto veterinárního léčivého přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí:

Neuplatňuje se.

3.6 Nežádoucí účinky

Skot:

Velmi časté (> 1 zvíře / 10 ošetřených zvířat):	Zánět v místě injekčního podání ¹ , zvýšená tělesná teplota ²
Méně časté (1 až 10 zvířat / 1 000 ošetřených zvířat):	Reakce anafylaktického typu ³ . Snížení produkce mléka ⁴ . Snížený příjem potravy ⁴ , Snížená aktivita ⁴ .

¹ Může být pozorován mírný až středně závažný dočasný zánět v místě injekčního podání (až do průměru 14 cm), jehož průměr se během 2 dnů rychle zmenšuje a zánět pak ustupuje bez léčby do 2 týdnů.

² Po vakcinaci se může objevovat zvýšená teplota (průměrné zvýšení o 1,7 °C, u jednotlivých zvířat až o 2,4 C). Toto zvýšení spontánně odezní během 3 dnů.

³ V případě reakcí anafylaktického typu by měla být podána vhodná symptomatická léčba.

⁴ Pozorováno u dojnic většinou po podání první dávky.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité. Umožňuje nepřetržité sledování bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku. Hlášení je třeba zaslat, pokud možno, prostřednictvím veterinárního lékaře, buď držiteli rozhodnutí o registraci, nebo jeho místnímu zástupci, nebo příslušnému vnitrostátnímu orgánu prostřednictvím národního systému hlášení. Podrobné kontaktní údaje naleznete v příbalové informaci.

3.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

3.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud se používá zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

3.9 Cesty podání a dávkování

Intramuskulární podání.

Pro použití u skotu od stáří 10 týdnů včetně.

Základní vakcinační schéma: Podejte dvě dávky (po 2 ml) v odstupu 3 týdnů.

První revakcinace: Podejte 1 dávku po 2 ml nejpozději 6 měsíců po dokončení základní vakcinace.

Následné revakcinace: Podejte 1 dávku po 2 ml nejpozději po 12 měsících.

Vakcína může být použita pro následnou revakcinaci po vakcinaci DIVENCE PENTA, pokud není nutná další ochrana proti BRSV, PI-3 nebo BVDV.

Vakcínu lze použít pro následná přeočkování po vakcinaci vakcínou DIVENCE TRI, pokud již není potřeba ochrana proti BRSV a PI-3 tam, kde je to možné.

Způsob podání:

Při rekonstituci a podávání se vyvarujte kontaminace. K podání používejte pouze sterilní jehly a injekční stříkačky.

Rekonstituujte lyofilizát odpovídajícím objemem rozpouštědla:

Počet dávek v jedné injekční lahvičce lyofilizátu	Potřebný objem rozpouštědla
5 dávek	10 ml
20 dávek	40 ml
40 dávek	80 ml

50 dávek	100 ml
----------	--------

1. Odloupněte horní část hliníkového víčka na injekční lahvičce s rozpouštědlem a odeberte 10 ml objemu.
2. Vstříkněte rozpouštědlo do injekční lahvičky s lyofilizátem.
3. Protřepávejte, dokud lyofilizát nevytvoří emulzi. Injekční lahvička s 5 dávkami je nyní připravená k použití.
4. U lahviček s 20, 40 a 50 dávkami, jakmile lyofilizát vytvoří s 10 ml rozpouštědla emulzi, odeberte veškerou získanou emulzi z injekční lahvičky s vakcínou a vstříkněte ji do injekční lahvičky obsahující zbývající rozpouštědlo.
5. Protřepávejte, dokud lyofilizát nevytvoří emulzi.

Rekonstituovaná vakcína je bílá až žlutá emulze.

Před podáním vyčkejte, až vakcína dosáhne teploty +15 až +25 °C.

3.10 Příznaky předávkování (a kde je relevantní, první pomoc a antidota)

Nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky než ty, které jsou popsány v bodě 3.6.

3.11 Zvláštní omezení pro použití a zvláštní podmínky pro použití, včetně omezení používání antimikrobních a antiparazitárních veterinárních léčivých přípravků, za účelem snížení rizika rozvoje rezistence

Osoba, která má v úmyslu vyrábět, dovážet, držet, distribuovat, prodávat, vydávat a používat tento veterinární léčivý přípravek, se musí na prvním místě informovat u příslušného úřadu členského státu o aktuálních vakcinačních postupech, protože tyto aktivity mohou být v členském státě zakázány na celém území nebo jeho části v souladu s národní legislativou.

Pro tento přípravek může být vyžadováno úřední uvolňování šarží státní kontrolní autoritou podle příslušných národních požadavků.

3.12 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

4. IMUNOLOGICKÉ INFORMACE

4.1 ATCvet kód: QI02AD01

Ke stimulaci aktivní imunity proti bovinnímu herpesviru typu 1 (BoHV-1).

Díky delecí markeru (*gE*-) lze odlišit komerčně dostupnými diagnostickými soupravami vakcinovaná zvířata od zvířat, která se virem infikovala v terénu.

5. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

5.1 Hlavní inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem kromě rozpouštědla dodaného k použití s veterinárním léčivým přípravkem.

5.2 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti rozpouštědla v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

5.3 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

5.4 Druh a složení vnitřního obalu

Lyofilizát: Injekční lahvičky o objemu 10 ml, sklo typu I, obsahující 5 dávek, 20 dávek, 40 dávek nebo 50 dávek, uzavřené zátkou z brombutylové pryže a utěsněné hliníkovou krytkou.

Rozpouštědlo: Polyethylenové (PET) injekční lahvičky o objemu 10 ml, 50 ml nebo 100 ml, uzavřené zátkou z brombutylové pryže a utěsněné hliníkovou krytkou.

Velikosti balení:

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 5 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku s 10 ml rozpouštědla.

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 20 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku s 40 ml rozpouštědla.

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 40 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku se 80 ml rozpouštědla.

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 50 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku se 100 ml rozpouštědla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5.5 Zvláštní opatření pro likvidaci nepoužitých veterinárních léčivých přípravků nebo odpadů, které pochází z těchto přípravků

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, likvidujte odevzdáním v souladu s místními požadavky a národními systémy sběru, které jsou platné pro příslušný veterinární léčivý přípravek.

6. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

7. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/24/318/001 - 004

8. DATUM PRVNÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 09/08/2024.

9. DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

10. KLASIFIKACE VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici v databázi přípravků Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

PŘÍLOHA II
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Žádné.

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonové krabičky

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DIVENCE IBR MARKER LIVE lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční emulzi

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka 2 ml obsahuje:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BoHV-1), s dvojitou delecí genů
gE- tk-, živý, kmen CEDDEL

$10^{6,3} - 10^{7,6}$ CCID₅₀

3. VELIKOST BALENÍ

1 injekční lahvička s 5 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvička s 10 ml rozpouštědla.
1 injekční lahvička s 20 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvička s 40 ml rozpouštědla.
1 injekční lahvička s 40 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvička se 80 ml rozpouštědla.
1 injekční lahvička s 50 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvička se 100 ml rozpouštědla.

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po rekonstituci spotřebujte do 2 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené. Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/2/24/318/001 (5 dávek)
EU/2/24/318/002 (20 dávek)
EU/2/24/318/003 (40 dávek)
EU/2/24/318/004 (50 dávek)

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**Injekční lahvička s lyofilizátem (5 dávek, 20 dávek, 40 dávek nebo 50 dávek)****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

DIVENCE IBR MARKER LIVE lyofilizát

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Jedna dávka 2 ml obsahuje:

BoHV-1 s dvojitou delecí genů gE- tk-, živý, kmen CEDDEL

 $10^{6,3} - 10^{7,6}$ CCID₅₀**3. OBSAH PODLE HMOTNOSTI, PODLE OBJEMU NEBO PODLE POČTU DÁVEK**

5 dávek

20 dávek

40 dávek

50 dávek

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

5. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po rekonstituci spotřebujte do 2 hodin.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (ŠTÍTKU) ROZPOUŠTĚDLA

Injekční lahvička s rozpouštědlem (10 ml, 40 ml, 80 ml nebo 100 ml)

1. NÁZEV ROZPOUŠTĚDLA

Rozpouštědlo pro DIVENCE IBR MARKER LIVE

2. OBSAH PODLE HMOTNOSTI, PODLE OBJEMU NEBO PODLE POČTU DÁVEK

10 ml
40 ml
80 ml
100 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. Název veterinárního léčivého přípravku

DIVENCE IBR MARKER LIVE lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční emulzi

2. Složení

Jedna dávka 2 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BoHV-1), s dvojitou delecí genů

gE- tk-, živý, kmen CEDDEL

$10^{6,3} - 10^{7,6}$ CCID₅₀*

gE- : delecce glykoproteinu E; tk- : delecce thymidinkinázy

* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

Adjuvans:

Montanid IMS

1,010 g

Lyofilizát: bílé až žluté barvy.

Rozpouštědlo: bílá průhledná emulze.

3. Cílové druhy zvířat

Skot.

4. Indikace pro použití

Aktivní imunizace skotu od stáří 10 týdnů ke snížení vylučování viru, hypertermie a klinických příznaků IBR (infekční boviní rinotracheitidy).

Nástup imunity: 3 týdny po dokončení základní vakcinace.

Trvání imunity: 6 měsíců po dokončení základní revakcinace.
1 rok po dokončení první revakcinace.

5. Kontraindikace

Žádné.

6. Zvláštní upozornění

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření pro osobu, která podává veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně podaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou. Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně podané malé množství, náhodná injekce tohoto veterinárního léčivého přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Březost a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud se používá zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování:

Nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky než ty, které jsou popsány v bodě „Nežádoucí účinky“.

Zvláštní omezení pro použití a zvláštní podmínky pro použití:

Osoba, která má v úmyslu vyrábět, dovážet, držet, distribuovat, prodávat, vydávat a používat tento veterinární léčivý přípravek, se musí na prvním místě informovat u příslušného úřadu členského státu o aktuálních vakcinačních postupech, protože tyto aktivity mohou být v členském státě zakázány na celém území nebo jeho části v souladu s národní legislativou.

Pro tento přípravek může být vyžadováno úřední uvolňování šarží státní kontrolní autoritou podle příslušných národních požadavků.

Hlavní inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem kromě rozpouštědla dodaného k použití s veterinárním léčivým přípravkem.

7. Nežádoucí účinky

Skot:

Velmi časté (> 1 zvíře / 10 ošetřených zvířat):
Zánět v místě injekčního podání ¹ , zvýšená tělesná teplota ² .
Méně časté (> 1 zvíře / 1 000 ošetřených zvířat):
Reakce anafylaktického typu ³ .

Snížení produkce mléka⁴.

Snížený příjem potravy⁴, Snížená aktivita⁴.

¹ Může být pozorován mírný až středně závažný dočasný zánět v místě injekčního podání (až do průměru 14 cm), jehož průměr se během 2 dnů rychle zmenšuje a zánět pak ustupuje bez léčby do 2 týdnů.

² Po vakcinaci se může objevovat zvýšená teplota (průměrné zvýšení o 1,7 °C, u jednotlivých zvířat až o 2,4 C). Toto zvýšení spontánně odezní během 3 dnů.

³ V případě reakcí anafylaktického typu by měla být podána vhodná symptomatická léčba.

⁴ Pozorováno u dojnic většinou po podání první dávky.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité. Umožňuje nepřetržité sledování bezpečnosti přípravku. Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, obraťte se prosím nejprve na svého veterinárního lékaře. Nežádoucí účinky můžete hlásit také držitel rozhodnutí o registraci nebo místnímu zástupci držitele rozhodnutí o registraci s využitím kontaktních údajů uvedených na konci této příbalové informace nebo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků: [údaje o národním systému](#)

8. Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání

Intramuskulární podání.

Pro použití u skotu od stáří 10 týdnů včetně.

Základní vakcinační schéma: podejte dvě dávky (po 2 ml) v odstupu 3 týdnů.

První revakcinace: podejte 1 dávku po 2 ml nejpozději 6 měsíců po dokončení základní vakcinace.

Následné revakcinace: podejte 1 dávku po 2 ml nejpozději po 12 měsících.

Vakcína může být použita pro následnou revakcinaci po vakcinaci DIVENCE PENTA, pokud není nutná další ochrana proti BRSV, PI-3 nebo BVDV.

Vakcínu lze použít pro následná přeočkování po vakcinaci vakcínou DIVENCE TRI, pokud již není potřeba ochrana proti BRSV a PI-3 tam, kde je to možné.

9. Informace o správném podávání

Při rekonstituci a podávání se vyvarujte kontaminace. K podání používejte pouze sterilní jehly a injekční stříkačky.

Rekonstituujte lyofilizát odpovídajícím objemem rozpouštědla:

Počet dávek v jedné injekční lahvičce lyofilizátu	Potřebný objem rozpouštědla
5 dávek	10 ml
20 dávek	40 ml
40 dávek	80 ml
50 dávek	100 ml

1. Odloupněte horní část hliníkového víčka na injekční lahvičce s rozpouštědlem a odeberte 10 ml objemu.
2. Vstříkněte rozpouštědlo do injekční lahvičky s lyofilizátem.
3. Protřepávejte, dokud lyofilizát nevytvoří emulzi. Injekční lahvička s 5 dávkami je nyní připravená k použití.
4. U lahviček s 20, 40 a 50 dávkami, jakmile lyofilizát vytvoří s 10 ml rozpouštědla emulzi, odeberte veškerou získanou emulzi z injekční lahvičky s vakcínou a vstříkněte ji do injekční lahvičky obsahující zbývající rozpouštědlo.
5. Protřepávejte, dokud lyofilizát nevytvoří emulzi.

Rekonstituovaná vakcína je bílá až žlutá emulze.

Před podáním vyčkejte, až vakcína dosáhne teploty +15 až +25 °C.

10. Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

11. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě na injekční lahvičce po Exp. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

12. Zvláštní opatření pro likvidaci

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, likvidujte odevzdáním v souladu s místními požadavky a platnými národními systémy sběru. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem.

13. Klasifikace veterinárních léčivých přípravků

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. Registrační čísla a velikosti balení

Registrační čísla: EU/2/24/318/001 - 004

Velikosti balení:

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 5 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku s 10 ml rozpouštědla.

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 20 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku s 40 ml rozpouštědla.

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 40 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku se 80 ml rozpouštědla.

Kartonová krabička obsahující 1 injekční lahvičku s 50 dávkami lyofilizátu a 1 injekční lahvičku se 100 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

15. Datum poslední revize příbalové informace

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici v databázi přípravků Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktní údaje

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva 135

17170 Amer (Girona), Španělsko

Tel: +34 972 43 06 60

Místní zástupci a kontaktní údaje pro hlášení podezření na nežádoucí účinky:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Nieuwewandeling 62

9000 Gent

BELGIË

Tel: +32 09 2964464

Lietuva

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. La Selva 135

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

Tel: +34 972 43 06 60

Република България

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. La Selva 135

17170 Amer (Girona)

ИСПАНИЯ

Тел: +34 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg

HIPRA BENELUX NV

Nieuwewandeling 62

9000 Gent

BELGIQUE

Tel: +32 09 2964464

Česká republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Zochova 5,

811 03 Bratislava,

SLOVENSKO

Tel: +421 02 32 335 223

Magyarország

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. La Selva 135

17170 Amer (Girona)

SPANYOLORSZÁG

Tel: +34 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel: +34 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
HISPAANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 80 & Μηριόνου 2-4,
104 41 Κολωνός - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ
Τηλ: +30 210 4978660

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPAÑA
Tel: +34 972 43 06 60

France

HIPRA FRANCE
7 rue Roland Garros, Batiment H
44700 - Orvault -
FRANCE
Tél: +33 02 51 80 77 91

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANJOLSKA
Tel: +34 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANJA
Tel: +34 972 43 06 60

Nederland

HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIË
Tel: +32 09 2964464

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tlf: +34 972 43 06 60

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Ul. Wincentego Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa - POLSKA
Tel: +48 22 642 33 06

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários
De Uso Animal, Lda
Portela de Mafra e Fontainha - Abrunheira
2665 – 191 Malveira - PORTUGAL
Tel: +351 219 663 450

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Ireland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPÁNN
Sími: +34 972 43 06 60

Italia

Hipra Italia S.r.l.
Enrico Mattei, 2
25030 Coccaglio (BS)
ITALIA
Tel: +39 030 7241821

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ΙΣΠΑΝΙΑΤηλ: +34 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPĀNIJA
Tel. +34 972 43 06 60

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANIIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Slovenská republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPANJA
Puh/Tel: +34 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel. +34 972 43 06 60

United Kingdom (Northern Ireland)

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60

17. Další informace

Díky delecí markeru (gE-) lze odlišit komerčně dostupnými diagnostickými soupravami vakcinovaná zvířata od zvířat, která se virem infikovala v terénu.