

**В. ЛИСТОВКА**

## ЛИСТОВКА ЗА:

### **Duplocillin LA**

Инжекционна суспензия за кучета и котки

#### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
The Netherlands

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Intervet Production S.r.l.  
Via Nettunense Km 20, 300  
04011 Aprilia  
Italy

#### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

Duplocillin LA

#### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ**

1 ml съдържа:

**Активни субстанции:**

150 000 IU ( $\pm$  150 mg) procaine benzylpenicillin  
150 000 IU ( $\pm$  115 mg) benzathine benzylpenicillin

#### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

За лечение на инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към пеницилин.

#### **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при свръхчувствителност към пеницилин.

Да не се използва при наличие на  $\beta$ -лактамаза продуциращи стафилококи.

#### **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

Понякога може да се наблюдават поява на алергична реакция.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

#### **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Котки и кучета.

#### **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

Два пъти x 1 доза (1 ml/10 kg т.м), интрамускулно или подкожно приложение, с интервал от 72 часа.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

При повторно приложение да не се инжектира на същото място.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Не е приложимо.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 8 седмици.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се използва при животни алергични към пеницилин.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Хора с установена свръхчувствителност към пеницилин трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Може да се наблюдава антагонизъм между Duplocillin LA и някои бактериостатични средства.

Може да се появят бактерии с кръстосана резистентност към други β-лактамни антибиотици.

Наблюдаван е синергизъм с други бактерицидни продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции, освен описаните в т. 6.

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

## **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

07/2016

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

Интервет България ЕООД  
ул. Искърско шосе 7, гр. София  
България