

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Prinocate 40 mg/10 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka merilna kapalka po 0,4 ml vsebuje: 40 mg imidakloprida, 10 mg moksidektina.

3. VELIKOST PAKIRANJA


1 x 0,4 ml
3 x 0,4 ml
4 x 0,4 ml
6 x 0,4 ml
24 x 0,4 ml
48 x 0,4 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Majhni psi (≤ 4 kg).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Nanos na kožo.

**7. KARENCA****8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo in vlago.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0690/003

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

VREČA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Prinocate

≤ 4 kg



2. KOLIČINA UČINKOVIN

imidacloprid/moxidectin

40 mg/10 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

MERILNA KAPALKA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Prinocate



2. KOLIČINA UČINKOVIN

≤ 4 kg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.