

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Palladia 10 mg comprimate filmate pentru câini
Palladia 15 mg comprimate filmate pentru câini
Palladia 50 mg comprimate filmate pentru câini

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Fiecare comprimat filmat conține fosfat de toceranib echivalent cu 10 mg, 15 mg sau 50 mg de toceranib.

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Miezul comprimatului:
Monohidrat de lactoză
Celuloză, microcristalină
Stearat de magneziu
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Crospovidonă
Învelișul comprimatului:
Macrogol
Dioxid de titan (E 171)
Lactoză monohidrat
Triacetină
Hipromeloză
Comprimatele filmate Palladia de 10 mg: Indigo Carmin Lake (E 132)
Comprimatele filmate Palladia de 15 mg: Sunset Yellow Lake (E 110), Oxid roșu de fier (E 172)
Comprimatele filmate Palladia de 50 mg: Oxid roșu de fier (E 172) Talc

Palladia 10 mg: comprimate de formă rotundă de culoare albastră.

Palladia 15 mg: comprimate de formă rotundă de culoare portocalie.

Palladia 50 mg: comprimate de formă rotundă de culoare roșie.

Fiecare comprimat este imprimat pe o față cu concentrația (10, 15 sau 50) și neted pe cealaltă față.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Câini.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Tratamentul tumorilor cu celule mastocitare cutanate neoperabile, Patnaik grad II (grad intermediar) sau III (grad înalt), recurente, la câini.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează la cățele gestante sau în lactație sau la câini destinați reproducției.
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.
Nu se utilizează la câini cu vârsta mai mică de 2 ani sau cu greutatea corporală mai mică de 3 kg.
Nu se utilizează la câini cu sângerări gastrointestinale.

3.4 Atenționări speciale

Pentru orice tumori ale celulelor mastocitare care se pot trata chirurgical, intervenția chirurgicală ar trebui să fie prima opțiune de tratament.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Câinii trebuie să fie monitorizați cu atenție. Reducerea dozei și/sau întreruperi ale dozei pot fi necesare în cazul apariției reacțiilor adverse. Tratamentul trebuie re-evaluat săptămânal în primele șase săptămâni și la fiecare șase săptămâni după aceea sau la intervale considerate adecvate de către medicul veterinar. Evaluările trebuie să includă și semnele clinice raportate de proprietarul animalului de companie.

Pentru a se utiliza în mod corespunzător tabelul de administrare a dozelor, se recomandă efectuarea unei numărători complete a celulelor sangvine, analiza tabloului chimic al serului și urinei, înainte de inițierea tratamentului și la aproximativ o lună de la începutul tratamentului; după aceea la interval de circa șase săptămâni sau după cum se stabilește de către medicul veterinar. Monitorizarea periodică a analizelor de laborator trebuie efectuată în contextul semnelor clinice, a stării animalului și al rezultatelor variabilelor de laborator la vizitele anterioare.

Siguranța produsului Palladia a fost evaluată în cazul câinilor cu tumori ale celulelor mastocitare cu următoarele:

- Număr total de neutrofile > 1500/microlitru
- Hematocrit > 25%
- Număr total de trombocite > 75000/microlitru
- ALT sau AST < 3 X peste limita normală
- Bilirubina < 1,25 X peste limita normală
- Creatinina < 2,5 mg/dl
- Azot uric în sânge < 1,5 X peste limita normală

Palladia poate cauza disfuncții vasculare care pot conduce la edem și tromboembolism, incluzând și tromboembolism pulmonar. Întrerupeți tratamentul până când semnele clinice și patologia clinică revin la normal. Înainte de efectuarea intervenției chirurgicale întrerupeți tratamentul pentru cel puțin 3 zile pentru a asigura homeostazia vasculară.

Dacă mastocitoza sistemică este prezentă, se va institui prevenția (blocați H - 1 și H - 2) înainte de inițierea tratamentului cu Palladia pentru a evita sau reduce degranularea celulelor mastocitare semnificativă din punct de vedere clinic și ulterior efectele secundare sistemice potențial severe.

Palladia a fost asociată cu diaree sau sângerări gastrointestinale care pot fi grave și necesită un tratament imediat. Întreruperea și reducerea dozei poate depinde de severitatea semnelor clinice.

În cazuri rare, la câinii tratați cu Palladia, au apărut complicații gastrointestinale grave și uneori letale inclusiv perforații gastrointestinale (vezi secțiunea 3.6). Dacă se suspectează ulcerări gastrointestinale indiferent că sunt sau nu datorate Palladia, sau degranularea celulelor tumorale mastocitare, opriți administrarea de Palladia și se va trata în mod corespunzător.

Toceranib este metabolizat în ficat și în absența oricăror studii privind efectele insuficienței renale sau hepatice va fi utilizat cu precauție la câinii care suferă de boli hepatice.

Tratamentul trebuie întrerupt în permanență dacă reacțiile adverse grave reapar sau persistă în ciuda tratamentului de susținere și reducerii dozei așa după cum este descrisă în tabelul următor.

Ajustarea dozei bazate pe Semne Clinice / Patologie	
Semne Clinice / Patologie	Ajustarea Dozei*
Anorexie	
< 50% ingestie alimentară ≥ 2 zile	Întrerupeți tratamentul și instituiți modificări ale dietei ± tratament de suport până ingestia se îmbunătățește, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Diaree	
< 4 scaune apoase/zi pentru < 2 zile sau scaune moi	Mențineți doza și instituiți tratament de suport.
> 4 scaune apoase/zi pentru ≥ 2 zile	Întrerupeți tratamentul până scaunul se întărește și instituiți tratament de susținere, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Sângerări gastrointestinale	
Sânge proaspăt în scaun sau scaun negru pentru >2 zile sau scaun gleros, cheaguri de sânge în scaun.	Întrerupeți tratamentul și instituiți tratament de susținere până la ameliorarea semnelor clinice de sânge în scaun, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg.
Hipoalbuminemie (albumina)	
Albumina < 1,5 g/dl	Întrerupeți tratamentul până la >1,5 g/dl și semne clinice normale, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Neutropenie (număr total de neutrofile)	
> 1000 /μl	Mențineți nivelul dozei.
≤ 1000 /μl sau febra neutropenică sau infecție	Întrerupeți tratamentul până la > 1000 / μl și semne clinice normale, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Anemie (hematocrit)	
> 26%	Mențineți nivelul dozei.
≤ 26%	Întrerupeți tratamentul până la > 26% și semne clinice normale, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Toxicitate Hepatică (ALT, AST)	
> 1 X – 3 X peste limita normală	Mențineți nivelul dozei; întrerupeți administrarea medicamentelor hepatotoxice, dacă sunt utilizate.
> 3 X peste limita normală	Întrerupeți tratamentul până la ≤ 3 X peste limita normală, întrerupeți administrarea medicamentelor hepatotoxice, dacă sunt utilizate, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Toxicitate Renală (creatinină)	
< 1,25 X peste limita normală	Mențineți nivelul dozei.
≥ 1,25 X peste limita normală	Întrerupeți tratamentul până la < 1,25 X peste limita normală, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg

Anemie concurentă, azotemie, hipoalbuminemie și hiperfosfatemie

Întrerupeți tratamentul pentru 1 până la 2 săptămâni, până ce valorile se îmbunătățesc și albumina este > 2,5 g/dl, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg.

*O reducere a dozei cu 0,5 mg/kg este o reducere de la 3,25 mg/kg la 2,75 mg/kg sau de la 2,75 mg/kg la 2,25 mg/kg. Doza nu trebuie să fie <2,2 mg/kg.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Palladia poate afecta fertilitatea masculilor și femelelor și dezvoltarea embrionară/fetală. Evitați contactul cutanat cu comprimatele, fecalele, urina și voma câinilor tratați. Comprimatele trebuie administrate întregi și nu trebuie sparte sau mărunțite. Dacă un comprimat rupt este respins de câine după mestecare, aceasta trebuie eliminat. Spălați bine mâinile cu apă și săpun după manipularea produsului și eliminați voma, urina sau fecalele câinilor tratați.

Femeile gravide nu trebuie să administreze în mod obișnuit Palladia, să evite contactul cu fecalele, urina și voma câinilor tratați și comprimatele Palladia sparte sau umectate.

Ingerarea Palladia poate fi dăunătoare pentru copii. Copii nu trebuie să intre în contact cu produsul. Țineți copiii departe de fecalele, urină sau voma câinilor tratați. Disconfort gastrointestinal ca voma, diaree poate apare dacă acest medicament este ingerat accidental. În cazul ingerării accidentale, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3.6 Evenimente adverse

Câini:

Foarte frecvente (>1 animal / 10 animale tratate):	Ușoare până la moderat: Diaree, vărsături, sânge în fecale, diaree hemoragică, hemoragie a tractului digestiv Anorexie, deshidratare, letargie, pierdere în greutate Șchiopătură, tulburări musculo-scheletice Dermatită, prurit Scăderea hematocritului, hipoalbuminemie, creșterea alanin aminotransferazei (ALT), neutropenie, trombocitopenie
Frecvente (1 până la 10 animale / 100 de animale tratate):	Severe: Anorexie, deshidratare, pirexie, scădere în greutate, septicemie, letargie Diaree, vărsături, sânge în fecale, diaree hemoragică, hemoragie a tractului digestiv, ulcer duodenal, greață Necroza pielii Scăderea hematocritului, creșterea alanin aminotransferazei (ALT) Ușoare până la moderat: Durere localizată, durere generală, polidipsie, pirexie Depigmentarea planului nazal, decolorarea părului blăni, alopecie Greață, flatulență

	Tahipnee Infecții ale tractului urinar Bilirubina totală crescută, creatinina crescută
Mai puțin frecvente (1 până la 10 de animale / 1 000 de animale tratate):	Severe: Șchiopătură, tulburări musculo-scheletice Șoc circulator

Rezultatele studiului clinic de teren efectuat pe 151 câini tratați și tratați-placebo au arătat că semnele clinice ale bolii (tumori ale celulelor mastocitare cutanate) și reacțiile adverse ale tratamentului sunt similare prin natura lor.

- Au existat două decese posibile datorită tratamentului. La un câine, constatările patologice au evidențiat tromboză vasculară cu coagulopatie intravasculară diseminată (DIC) și pancreatită. Celălalt câine a murit în urma perforației gastrice.
- Au existat alte două decese; cu toate acestea, nu a fost stabilită o legătură cu tratamentul.
- Doi câini au prezentat epistaxis care nu a fost asociat cu trombocitopenie. Alt câine a prezentat epistaxis cu coagulopatie intravasculară diseminată concurrentă.
- Trei câini au prezentat simptome asemănătoare atacului de apoplexie; cu toate acestea, nu a fost stabilită o legătură cu tratamentul.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței produsului medicinal veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului autorizației de comercializare sau reprezentantului local al acestuia, fie autorității naționale competente prin sistemul național de raportare. Consultați prospectul pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu se utilizează la cățelele gestante sau în lactație sau la câinii destinați reproducției (vezi secțiunea 3.3). Alți componenți din clasa anti-angiogenică a agenților antineoplazici sunt cunoscuți că produc o creștere a embrioletalității și anomaliilor fetale. Angiogeneza este o componentă critică a dezvoltării embrionare și fetale, este de așteptat ca inhibarea angiogenezei după administrarea de Palladia să aibă reacții adverse asupra gestației la cățelele.

3.8 Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Nu s-au efectuat studii de interacțiune cu toceranib. Nu sunt disponibile informații cu privire la posibila rezistență încrucișată cu alte medicamente citostatice.

Deoarece toceranibul este probabil eliminat într-o mare parte prin metabolizarea în ficat, combinația cu alte medicamente capabile să inducă sau să inhibe enzimele hepatice trebuie utilizată cu precauție.

Nu se știe în ce măsură toceranibul poate afecta eliminarea altor medicamente.

Utilizați medicamente antiinflamatoare nesteroidiene cu precauție în combinație cu Palladia datorită creșterii riscului de ulcerare sau perforare gastrointestinală.

3.9 Căi de administrare și doze

Administrare orală.

Comprimatele pot fi administrate cu sau fără alimente.

Doza inițială recomandată este 3,25 mg/kg greutate corporală, administrat o dată la două zile (pentru detalii, vezi tabelul de dozare).

Doza administrată va fi bazată pe evaluările veterinare efectuate săptămânal pentru primele șase săptămâni și ulterior la fiecare șase săptămâni. Durata tratamentului depinde de răspunsul la tratament.

Tratamentul trebuie continuat în cazul unui răspuns stabil la boală, parțial sau complet, cu condiția ca produsul să fie suficient de bine tolerat. În cazul progresiei tumorale, tratamentul este puțin probabil să aibă succes și trebuie revizuit.

TABEL DE DOZARE: COMPRIMATE PALLADIA 3,25 mg / kg, GREUTATE CORPORALĂ:

Greutate corporală câini (kg)	Număr de comprimate				
	10 mg (albastru)		15 mg (portocaliu)		50 mg (roșu)
5,0* – 5,3			1		
5,4 – 6,9	2				
7,0 – 8,4	1	plus	1		
8,5 – 10,0			2		
10,1 – 11,5	2	plus	1		
11,6 – 13,0	1	plus	2		
13,1 – 14,6			3		
14,7 – 16,1					1
16,2 – 17,6	1	plus	3		
17,7 – 19,2	1			plus	1
19,3 – 20,7			1	plus	1
20,8 – 23,0	2			plus	1
23,1 – 26,9			2	plus	1
27,0 – 29,9			3	plus	1
30,0 – 32,3					2
32,4 – 34,6	1			plus	2
34,7 – 36,1			1	plus	2
36,2 – 38,4	2			plus	2
38,5 – 43,0			2	plus	2
43,1 – 47,6					3
47,7 – 49,9	1			plus	3
50,0 – 51,5			1	plus	3
51,6 – 53,8	2			plus	3
53,9 – 58,4			2	plus	3
58,5 – 63,0*					4

*numărul comprimatelor necesare pentru câini sub 5,0 kg sau peste 63 kg greutate corporală, se va calcula pe baza regimului de dozare de 3.25 mg/kg.

Ajustarea / reducere dozei:

Pentru a contracara reacțiile adverse, doza poate fi redusă la 2,75 mg/kg greutate corporală sau până la 2,25 mg/kg greutate corporală, administrată la fiecare două zile sau tratamentul poate fi întrerupt până la două săptămâni (vezi secțiunea 3.5, tabel ajustare doză).

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

Semne de supradozare au fost observate într-un studiu de toxicitate realizat pe câini din rasa Beagle, adulți sănătoși, tratați cu 2 mg/kg, 4 mg/kg sau 6 mg/kg la fiecare două zile timp de 13 săptămâni consecutive fără întrerupere a dozei. Toceranibul a fost bine tolerat la doza de 2 mg/kg, în timp ce reacții adverse s-au semnalat la câțiva câini tratați cu 4 mg/kg și astfel limita NOAEL, valoarea la care nu se observă reacții adverse, nu a putut fi stabilită.

Câinii din grupul tratat cu doza de 6 mg/kg la fiecare două zile prezintă cele mai multe reacții adverse care includ scăderea consumului alimentar și scăderea în greutate. Legate de doză, sporadic, șchiopătat, rigiditate, slăbiciune și durere în zona membrilor, s-au rezolvat fără tratament. Legate de doză au fost anemie, neutropenie și eozinopenie. Doi câini (6 mg/kg) au fost

eutanasiați la aproximativ 3 săptămâni pentru toxicitate clinică datorată tratamentului, manifestată prin scăderea aportului de alimente, melenă culminând cu anorexie, pierderea în greutate și hematochezie.

Principalele organe țintă ale toxicității includ tractul gastrointestinal, măduva osoasă, gonadele și sistemul musculoscheletic.

În cazul reacțiilor adverse ca urmare a supradozării, tratamentul va fi întrerupt până la soluționarea acestora și apoi se va relua la nivelul dozei terapeutice recomandate. Vezi secțiunile 3.4, 3.5 și 3.9 pentru Tabel de dozare.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Nu este cazul.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QL01EX90

4.2 Farmacodinamie

Toceranibul este o moleculă mică, inhibitor de multi-kinază, cu acțiune antitumorală directă și anti-angiogenică. Toceranibul inhibă în mod selectiv, activitatea tirozin kinazei, a unor receptori divizați din familia tirozin kinaza (RTK) unii dintre ei fiind implicați în creșterea tumorală, angiogeneza patologică și progresia metastatică a cancerului.

Toceranibul inhibă activitatea tirozin kinazei Flk – 1 / KDR (receptorul factorului de creștere al endoteliului vascular, VEGFR2), receptorului factorului de creștere derivat din plachete (PDGFR) și receptorului pentru factorii celulelor stem (c-Kit) atât în testele biochimice cât și celulare. Toceranibul exercită un efect antiproliferativ asupra celulelor endoteliale *in vitro*. Toceranibul induce oprirea ciclului celular și ulterior apoptoza în liniile de celule tumorale care exprimă mutații de activare la nivelul kinazei divizată (RTK, c-Kit). Creșterea celulelor tumorale mastocitare de la câine este frecvent condusă de o mutație activă în c-Kit.

Eficacitatea și siguranța comprimatelor orale Palladia pentru tratarea tumorilor cutanate cu celule mastocitare a fost evaluată într-un studiu clinic multicentric, randomizat, controlat cu placebo, dublu mascat, care a implicat 151 câini cu tumori cutanate cu celule mastocitare, Patnaik grad II sau III, recurente, cu / fără implicarea ganglionului limfoid local. Studiile clinice din teren s-au desfășurat pe parcursul a 6 săptămâni cu o fază controlată placebo dublu-orb, urmată de o fază vizibilă, în care toți câinii au primit Palladia pentru o durată medie de 144 zile.

Câinii tratați cu Palladia au avut o creștere semnificativ mai mare a ratei de răspuns (37,2 %) comparativ cu câinii tratați cu placebo (7,9 %). La câinii tratați cu Palladia, după 6 săptămâni de tratament, s-a observat un răspuns complet pentru 8,1 % și un răspuns parțial la 29,1 %. A existat, de asemenea, un avantaj semnificativ al tratamentului cu Palladia față de placebo în obiectivul secundar de eficacitate, timpul până la progresia tumorilor. Media TTP a câinilor tratați cu Palladia a fost de 9 până la 10 săptămâni iar pentru câinii tratați cu placebo a fost de 3 săptămâni.

Câinii la care există c-kit de tip sălbatic și câinii la care există c-kit mutant au răspuns mai bine la tratament decât lotul placebo.

4.3 Farmacocinetică

La un regim de 3,25 mg toceranib/kg greutate corporală, administrat pe cale orală sub formă de comprimate la fiecare două zile timp de 2 săptămâni (7 doze) s-au raportat următorii parametri farmacocinetici ai toceranibului în plasma câinilor Beagle sănătoși: timpul de înjumătățire ($t_{1/2}$) $17,2 \pm 3,9$ ore, timp până la concentrația maximă în plasmă (T_{max}) de aproximativ $6,2 \pm 2,6$ ore, concentrație maximă în plasmă (C_{max}) de aproximativ 108 ± 41 ng/ml, concentrație minimă în plasmă (C_{min}) de aproximativ $18,7 \pm 8,3$ ng/ml și aria de sub curba concentrației plasmatice în funcție de timp (AUC_{0-48}) 2640 ± 940 ng oră/ml.

Toceranib este puternic legat de proteine între 91% și 93%. Biodisponibilitatea absolută a toceranibului a fost determinată a fi 86% când doza administrată oral a fost de 3,25 mg/kg.

Farmacocinetica lineară a fost observată indiferent de calea de administrare la doze de până la 5 mg/kg administrate de două ori pe zi, în fiecare zi. Într-un studiu *in vitro*, metabolismul toceranibului a fost determinat, la câini și pisici, în principal pentru derivații N-oxid. Nu există studii *in vivo* cu referire la metabolismul hepatic la câini. La studiile *in vivo* nu s-au observat diferențe de farmacocinetică în funcție de sex. În urma administrării orale de fosfat de toceranib, aproximativ 92% din medicamentul administrat este excretat prin fecale și o altă parte de 7% este excretat în urină.

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Nu este cazul.

5.2 Termen de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Cutie de carton care conține 20 comprimate filmate în 4 blistere de aluminiu-PVC cu sistem de închidere securizat pentru copii, fiecare blister conține 5 comprimate filmate.

Comprimatele filmate Palladia sunt disponibile în concentrații de 10 mg, 15 mg și 50 mg.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium

7. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/09/100/001 (comprimate de 10 mg)

EU/2/09/100/002 (comprimate de 15 mg)

EU/2/09/100//003 (comprimate de 50 mg)

8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI

Data primei autorizări: 23/09/2009

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI**

10. CLASIFICAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ANEXA II

ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Nu există.

ANEXA III
ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON / COMPRIMATE

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Palladia 10 mg –comprimate filmate
Palladia 15 mg –comprimate filmate
Palladia 50 mg –comprimate filmate

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare comprimat conține 10 mg toceranib (ca toceranib fosfat)
Fiecare comprimat conține 15 mg toceranib (ca toceranib fosfat)
Fiecare comprimat conține 50 mg toceranib (ca toceranib fosfat)

3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

20 comprimate filmate

4. SPECII ȚINTĂ

Câini.



5. INDICAȚII

6. CĂI DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

7. PERIOADE DE AȘTEPTARE

8. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

10. MENȚIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”

A se citi prospectul înainte de utilizare.

11. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

12. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

13. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium

14. NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

15. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

BLISTERE / Alu – PVC

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Palladia 10 mg

Palladia 15 mg

Palladia 50 mg



2. INFORMAȚII CANTITATIVE PRIVIND SUBSTANȚELE ACTIVE

10 mg toceranib

15 mg toceranib

50 mg toceranib

3. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

4. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

B. PROSPECTUL

PROSPECTUL

1. Denumirea produsului medicinal veterinar

Palladia 10 mg comprimate filmate pentru câini
Palladia 15 mg comprimate filmate pentru câini
Palladia 50 mg comprimate filmate pentru câini

2. Compoziție

Substanță activă:

Fiecare comprimat filmat conține toceranib fosfat echivalent cu 10 mg, 15 mg sau 50 mg de toceranib.

Palladia sunt comprimate filmate rotunde și au un înveliș (film) colorat pentru a reduce riscul expunerii și pentru a ajuta la identificarea corectă a concentrației fiecărui comprimat:

Palladia 10 mg – albastru.
Palladia 15 mg – portocaliu.
Palladia 50 mg – roșu.

3. Specii țintă

Câini.

4. Indicații de utilizare

Tratamentul tumorilor cu celule mastocitare cutanate neoperabile, Patnaik grad II (grad intermediar) sau III (grad înalt), recurente, la câini.

5. Contraindicații

Nu se utilizează la cățele gestante sau în lactație sau la câini destinați reproducției.
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.
Nu se utilizează la câini cu vârsta mai mică de 2 ani sau cu greutatea corporală mai mică de 3 kg.
Nu se utilizează la câini cu sângerări gastrointestinale. Medicul veterinar vă va sfătui dacă este cazul pentru câinele dumneavoastră.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Pentru orice tumori ale celulelor mastocitare care se pot trata chirurgical, intervenția chirurgicală ar trebui să fie prima opțiune de tratament.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Câinii trebuie să fie monitorizați cu atenție. Reducerea dozei și/sau întreruperi ale dozei pot fi necesare în cazul apariției reacțiilor adverse. Tratamentul trebuie re-evaluat săptămânal în primele șase săptămâni și la fiecare șase săptămâni după aceea sau la intervale considerate adecvate de către medicul veterinar. Este posibil ca medicul veterinar să fie nevoit să preleveze probe de sânge și urină de la câinele dumneavoastră pentru a efectua aceste verificări.

- Opiți imediat tratamentul cu Palladia și contactați medicul veterinar dacă observați oricare dintre următoarele modificări la câinele Dvs.:
 - Refuz alimentar
 - Vomă sau scaune apoase (diaree), în special când sunt mai frecvente de două ori în 24 de ore
 - Scaune cu aspect negricios
 - Sânge roșu deschis în vomă și scaune
 - Vânătași sau sângerări inexplicabile
 - Sau dacă câinele Dvs. prezintă alte schimbări care vă îngrijorează

Tratamentul trebuie întrerupt permanent dacă apar și persistă reacții adverse severe în ciuda tratamentului de susținere adecvat și reducerii dozei.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

- Copii nu au voie să intre în contact cu comprimatele Palladia. Copii nu trebuie să aibă contact cu fecalele, urina sau voma câinilor tratați.
- Dacă sunteți gravidă, nu trebuie să administrați în mod obișnuit Palladia; totuși, dacă alegeți să oferiți aceste comprimate câinelui dumneavoastră, trebuie să acordați atenție și să urmați procedurile de manipulare descrise mai jos.
- Dacă Palladia este ingerată în mod accidental (înghițită sau mâncată) de dumneavoastră sau de un membru al familiei, solicitați imediat sfatul medicului. Este important să prezentați medicului o copie a acestui prospect. În cazurile de ingerare accidentală de Palladia este posibil să aveți disconfort gastric, inclusiv vomă și diaree.

Următoarele proceduri de manipulare vă vor ajuta să reduceți la minim expunerea la substanța activă din Palladia pentru dvs. și pentru ceilalți membri ai gospodăriei dvs.:

- Oricine din gospodăria dvs. care administrează Palladia câinelui dvs. trebuie să-și spele mâinile întotdeauna după manipularea comprimatelor.
- Când manipulați comprimatele:
 - Nu rupeți sau măcinați comprimatele.
 - Comprimatele Palladia trebuie să fie administrate câinelui dvs. imediat după ce au fost scoase din blister și nu trebuie lăsate în jurul locului unde pot fi manipulate / înghițite de copii.
 - Blisterul trebuie întotdeauna să fie pus înapoi în cutia de carton, imediat după ce un comprimat sau comprimate a (au) fost scos (e) din blister.
 - Dacă comprimatul Palladia va fi "ascuns" în alimente, asigurați-vă ca a fost ingerată toată doza de către câine. Aceasta va reduce la minim riscul expunerii copiilor sau alți membri ai casei să intre în contact accidental cu Palladia.

Gestație, lactație și fertilitatea

Nu se utilizează la cățelele gestante sau în lactație sau la câinii destinați reproducției (vezi secțiunea 5). Alți componenți din clasa anti-angiogenică a agenților antineoplazici sunt cunoscuți că produc o creștere a embrioletalității și anomaliilor fetale. Angiogeneza este o componentă critică a dezvoltării embrionare și fetale, este de așteptat ca inhibarea angiogenezei după administrarea de Palladia să aibă reacții adverse asupra gestației la cățelele.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Există câteva medicamente pe care nu trebuie să le dați câinelui în timpul tratamentului, pentru că împreună pot determina reacții adverse grave. Spuneți medicului veterinar despre toate medicamentele, inclusiv și pe cele fără prescripție pe care intenționați să le administrați câinelui dumneavoastră.

Nu s-au efectuat studii de interacțiune cu toceranib. Nu sunt disponibile informații cu privire la posibila rezistență încrucișată cu alte medicamente citostatice.

Deoarece toceranibul este probabil eliminat într-o mare parte prin metabolizarea în ficat, combinația cu alte medicamente capabile să inducă sau să inhibe enzimele hepatice trebuie utilizată cu precauție.

Nu se știe în ce măsură toceranibul poate afecta eliminarea altor medicamente.

Utilizați medicamente antiinflamatoare nesteroidiene cu precauție în combinație cu Palladia datorită creșterii riscului de ulcerare sau perforare gastrointestinală.

Supradozare:

Semne de supradozare au fost observate într-un studiu de toxicitate realizat pe câini din rasa Beagle, adulți sănătoși, tratați cu 2 mg/kg, 4 mg/kg sau 6 mg/kg la fiecare două zile timp de 13 săptămâni consecutive fără întrerupere a dozei. Toceranibul a fost bine tolerat la doza de 2 mg/kg, în timp ce reacții adverse s-au semnalat la câțiva câini tratați cu 4 mg/kg.

Câinii din grupul tratat cu doza de 6 mg / kg la fiecare două zile prezintă cele mai multe reacții adverse care includ scăderea consumului alimentar și scăderea în greutate. Legate de doză, sporadic, șchiopătat, rigiditate, slăbiciune și durere în zona membrilor, s-au rezolvat fără tratament. Legate de doză au fost anemie, neutropenie și eozinopenie. Doi câini (6 mg/kg) au fost eutanasiați la aproximativ 3 săptămâni pentru toxicitate clinică datorată tratamentului, manifestată prin scăderea aportului de alimente, melenă culminând cu anorexie, pierderea în greutate și hematochezie.

Principalele organe țintă ale toxicității includ tractul gastrointestinal, măduva osoasă, gonadele și sistemul musculoscheletic.

În cazul reacțiilor adverse ca urmare a supradozării, tratamentul va fi întrerupt până la soluționarea acestora și apoi se va relua la nivelul dozei terapeutice recomandate.

7. Evenimente adverse

Câini:

Foarte frecvente (>1 animal / 10 animale tratate):	Ușoare până la moderat: Diaree, vărsături, sânge în fecale, diaree hemoragică (sângeroasă), hemoragie a tractului digestiv Anorexie, deshidratare, letargie, pierdere în greutate Șchiopătură, tulburări musculo-scheletice Dermatită (inflamație a pielii), prurit (mâncărime) Scăderea hematocritului (fracția de globule roșii din sânge), hipoalbuminemie (nivel scăzut de proteine în sânge), alanin aminotransferaza (ALT) crescută (o enzimă hepatică), neutropenie (nivel scăzut de globule albe), trombocitopenie (nivel scăzut de trombocite).
Frecvente (1 până la 10 animale / 100 de animale tratate):	Severe: Anorexie, deshidratare, pirexie (febră), scădere în greutate, septicemie (intoxicație în sânge), letargie Diaree, vărsături, sânge în fecale, diaree hemoragică (sângeroasă), hemoragie a tractului digestiv, ulcer duodenal, greață Necroza pielii (descuamarea și dezlipirea pielii) Scăderea hematocritului (fracția de globule roșii din sânge), creșterea alanin aminotransferazei (ALT) (o enzimă hepatică) Ușoare până la moderat: Durere localizată, durere generală, polidipsie (sete crescută), pirexie (febră) Depigmentarea planului nazal, decolorarea părului blăni, alopecie (căderea părului) Greață, flatulență Tahipnee (respirație rapidă) Infecții ale tractului urinar Bilirubina totală crescută, creatinina crescută
Mai puțin frecvente (1 până la 10 de animale / 1 000 de animale tratate):	Severe: Șchiopătură, tulburări musculo-scheletice Șoc circulator

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul autorizației de comercializare sau reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: {detalii sistem național}

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Administrare orală.

Doza inițială este de aproximativ 3,25 mg/kg greutate corporală, administrat o dată la două zile (vezi tabelul de dozare de la sfârșitul prospectului **tipărit** pentru detalii).

Numărul comprimatelor administrate câinelui dumneavoastră, poate fi ajustat de către medicul dumneavoastră veterinar pentru a contracara reacțiile adverse. De aceea doza indicată va fi

prescrisă de medicul dumneavoastră veterinar chiar dacă aceasta este diferită de cea din tabelul de dozare.

Doza administrată va fi bazată pe evaluările veterinare efectuate săptămânal pentru primele șase săptămâni și ulterior la fiecare șase săptămâni.

Durata tratamentului depinde de răspunsul la tratament. Tratamentul trebuie continuat în cazul unui răspuns stabil la boală, parțial sau complet, cu condiția ca produsul să fie suficient de bine tolerat. În cazul progresiei tumorale, tratamentul este puțin probabil să aibă succes și trebuie revizuit.

TABEL DE DOZARE: COMPRIMATE PALLADIA 3,25 mg / kg, GREUTATE CORPORALĂ:

Greutate corporală câini (kg)	Număr de comprimate				
	10 mg (albastru)		15 mg (portocaliu)		50 mg (roșu)
5,0* – 5,3			1		
5,4 – 6,9	2				
7,0 – 8,4	1	plus	1		
8,5 – 10,0			2		
10,1 – 11,5	2	plus	1		
11,6 – 13,0	1	plus	2		
13,1 – 14,6			3		
14,7 – 16,1					1
16,2 – 17,6	1	plus	3		
17,7 – 19,2	1			plus	1
19,3 – 20,7			1	plus	1
20,8 – 23,0	2			plus	1
23,1 – 26,9			2	plus	1
27,0 – 29,9			3	plus	1
30,0 – 32,3					2
32,4 – 34,6	1			plus	2
34,7 – 36,1			1	plus	2
36,2 – 38,4	2			plus	2
38,5 – 43,0			2	plus	2
43,1 – 47,6					3
47,7 – 49,9	1			plus	3
50,0 – 51,5			1	plus	3
51,6 – 53,8	2			plus	3
53,9 – 58,4			2	plus	3
58,5 – 63,0*					4

*Numărul comprimatelor necesare pentru câini sub 5,0 kg sau peste 63 kg greutate corporală, se va calcula pe baza regimului de dozare de 3,25 mg/kg.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Comprimatele pot fi administrate cu sau fără alimente.

Comprimatele trebuie administrate întregi și nu trebuie împărțite, rupte sau mărunțite. Dacă un comprimat rupt este respins de câine după mestecare, aceasta trebuie eliminat. Pentru a obține doza corectă comprimatele de concentrații (culori) diferite pot fi combinate așa cum este descris în tabel.

Dacă se ratează administrarea unei doze, următoarea doză va fi administrată așa cum este prescris. Nu creșteți sau dublați doza. Dacă s-a administrat mai mult decât doza recomandată, contactați medicul veterinar.

Câinii trebuie monitorizați cu atenție după administrare pentru a ne asigura că fiecare comprimat este înghițit.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutie, după Exp.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile.

Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea produselor medicinale veterinare

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele autorizațiilor de comercializare și dimensiunile ambalajelor

EU/2/09/100/001-003

Cutie de carton care conține 20 comprimate filmate în 4 blistere din aluminiu-PVC cu sistem de închidere securizat pentru copii, fiecare blister conține 5 comprimate filmate.

Comprimatele filmate Palladia sunt disponibile în concentrații de 10 mg, 15 mg și 50 mg.

15. Data ultimei revizuri a prospectului

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Date de contact

Deținătorul autorizației de comercializare:

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
Italia

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
BE-1930 Zaventem
Tél/Tel: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgija
Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Белгия
Тел: +359 888 51 30 30

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belsch
Tél/Tel: +32 (2) 746 80 11

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.
náměstí 14. října 642/17
CZ 150 00 Praha
Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.
Csörsz u. 41.
HU-1124 Budapest
Tel.: +36 1 224 5200

Danmark

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Tlf: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Malta

Agrimed Limited
Mdina Road, Zebbug ZBG 9016,
MT
Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH
Schellingstr. 1
DE-10785 Berlin
Tel: +49 30 2020 0049
tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com

Nederland

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
NL-2909 LD Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgia
Tel: +370 610 05088

Κύπρος

Zoetis Hellas S.A.
Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
15125, Αττική
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6791900

España

Zoetis Spain, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte Edificio nº1,
c/ Quintanavides nº13
ES-28050 Madrid
Tel: +34 91 4191900

France

Zoetis France
10 rue Raymond David
FR-92240 Malakoff
Tél: +33 (0)800 73 00 65

Hrvatska

Zoetis B.V.
Podružnica Zagreb za promidžbu
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 6441 462

Ireland

Zoetis Belgium S.A. (Irish Branch)
2nd Floor, Building 10,
Cherrywood Business Park,
Loughlinstown,
Co. Dublin,
IE – Dublin D18 T3Y1
Tel: +353 (0) 1 256 9800

Ísland

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmörku
Sími: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Norge

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark
Tlf: +47 23 29 86 80
adr.scandinavia@zoetis.com

Österreich

Zoetis Österreich GmbH
Floridsdorfer Hauptstr. 1
AT-1210 Wien
Tel: +43 (0)1 2701100 100

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
PL - 02-676 Warszawa
Tel.: +48 22 2234800

Portugal

Zoetis Portugal Lda.
Lagoas Park, Edifício 10
PT-2740-271 Porto Salvo
Tel: +351 21 042 72 00

România

Zoetis România S.R.L.
Expo Business Park, 54A Aviator Popișteanu,
Clădirea 2, Etaj 1-3, Sector 1,
București, 012095 - RO
Tel: +40785019479

Slovenija

Zoetis B.V.
Podružnica Zagreb za promidžbu
Petra Hektorovića 2,
10000 Zagreb,
Hrvaška
Tel: +385 1 6441 462

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.
náměstí 14. října 642/17
150 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria 41M,
IT-00192 Roma
Tel: +39 06 3366 8111

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy
Bulevardi 21 / SPACES
FI-00180 Helsinki/Helsingfors
Suomi/Finland
Puh/Tel: +358 10 336 7000
laaketurva@zoetis.com

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.
Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
EL-15125 Αττική
Τηλ: +30 210 6791900

Sverige

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 Köpenhamn
Danmark
Tel: +46 (0) 76 760 0677
adr.scandinavia@zoetis.com

Latvija

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgija
Tel: +370 610 05088

United Kingdom (Northern Ireland)

Zoetis Belgium S.A. (Irish Branch)
2nd Floor, Building 10,
Cherrywood Business Park,
Loughlinstown,
Co. Dublin,
IE – Dublin D18 T3Y1
Tel: +353 (0) 1 256 9800

17. Alte informații**Informații speciale pentru medicul veterinar**

Rezultatele studiului clinic de teren efectuat pe 151 câini tratați și tratați-placebo au arătat că semnele clinice ale bolii (tumori ale celulelor mastocitare cutanate) și reacțiile adverse ale tratamentului sunt similare prin natura lor.

- Au existat două decese posibile datorită tratamentului. La un câine, constatările patologice au evidențiat tromboză vasculară cu coagulopatie intravasculară diseminată (DIC) și pancreatită. Celălalt câine a murit în urma perforației gastrice.
- Au existat alte două decese; cu toate acestea, nu a fost stabilită o legătură cu tratamentul.
- Doi câini au prezentat epistaxis care nu a fost asociat cu trombocitopenie. Alt câine a prezentat epistaxis cu coagulopatie intravasculară diseminată concurrentă.
- Trei câini au prezentat simptome asemănătoare atacului de apoplexie; cu toate acestea, nu a fost stabilită o legătură cu tratamentul.

Câinii trebuie să fie monitorizați cu atenție. Reducerea dozei și/sau întreruperi ale dozei pot fi necesare în cazul apariției reacțiilor adverse. Tratamentul trebuie re-evaluat săptămânal în primele șase săptămâni și la fiecare șase săptămâni după aceea sau la intervale considerate adecvate de către medicul veterinar. Evaluările trebuie să includă și semnele clinice raportate de proprietarul animalului de companie.

Pentru a se utiliza în mod corespunzător tabelul de administrare a dozelor, se recomandă efectuarea unei numărări complete a celulelor sangvine, analiza tabloului chimic al serului și urinei, înainte de inițierea tratamentului și la aproximativ o lună de la începutul tratamentului; după aceea la interval de circa șase săptămâni sau după cum se stabilește de către medicul veterinar. Monitorizarea periodică a analizelor de laborator trebuie efectuată în contextul semnelor clinice, a stării animalului și al rezultatelor variabilelor de laborator la vizitele anterioare.

Siguranța produsului Palladia a fost evaluată în cazul câinilor cu tumori ale celulelor mastocitare cu următoarele:

- Număr total de neutrofile > 1500/microlitru
- Hematocrit > 25%
- Număr total de trombocite > 75000/microlitru
- ALT sau AST < 3 X peste limita normală
- Bilirubina < 1,25 X peste limita normală
- Creatinina < 2,5 mg/dl
- Azot uric în sânge < 1,5 X peste limita normală

Palladia poate cauza disfuncții vasculare care pot conduce la edem și tromboembolism, incluzând și tromboembolism pulmonar. Întrerupeți tratamentul până când semnele clinice și patologia clinică revin la normal. Înainte de efectuarea intervenției chirurgicale întrerupeți tratamentul pentru cel puțin 3 zile pentru a asigura homeostazia vasculară.

Dacă mastocitoza sistemică este prezentă, se va institui prevenția (blocați H - 1 și H - 2) înainte de inițierea tratamentului cu Palladia pentru a evita sau reduce degranularea celulelor mastocitare semnificativă din punct de vedere clinic și ulterior efectele secundare sistemice potențial severe.

Palladia a fost asociată cu diaree sau sângerări gastrointestinale care pot fi grave și necesită un tratament imediat. Întreruperea și reducerea dozei poate depinde de severitatea semnelor clinice.

În cazuri rare, la câinii tratați cu Palladia, au apărut complicații gastrointestinale grave și uneori letale inclusiv perforații gastrointestinale. Dacă se suspectează ulcerații gastrointestinale indiferent că sunt sau nu datorate Palladia, sau degranularea celulelor tumorale mastocitare, opriți administrarea de Palladia și se va trata în mod corespunzător.

Toceranib este metabolizat în ficat și în absența oricăror studii privind efectele insuficienței renale sau hepatice va fi utilizat cu precauție la câinii care suferă de boli hepatice.

Tratamentul trebuie întrerupt în permanență dacă reacțiile adverse grave reapar sau persistă în ciuda tratamentului de susținere și reducerii dozei așa după cum este descrisă în tabelul următor.

Ajustarea dozei bazate pe Semnele Clinice / Patologie	
Semne Clinice / Patologie	Ajustarea Dozei*
Anorexie	
< 50% ingestie alimentară ≥ 2 zile	Înterupeți tratamentul și instituiți modificări ale dietei ± tratament de suport până ingestia se îmbunătățește, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Diaree	
< 4 scaune apoase/zi pentru < 2 zile sau scaune moi	Mențineți doza și instituiți tratament de suport.
> 4 scaune apoase/zi pentru ≥ 2 zile	Înterupeți tratamentul până scaunul se întărește și instituiți tratament de susținere, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Sângerări gastrointestinale	
Sânge proaspăt în scaun sau scaun negru pentru >2 zile sau scaun gleros, cheaguri de sânge în scaun.	Înterupeți tratamentul și instituiți tratament de susținere până la ameliorarea semnelor clinice de sânge în scaun, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg.
Hipoalbuminemie (albumina)	
Albumina < 1,5 g/dl	Înterupeți tratamentul până la >1,5 g/dl și semne clinice normale, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Neutropenie (număr total de neutrofile)	
> 1000 /μl	Mențineți nivelul dozei.
≤ 1000 /μl sau febra neutropenică sau infecție	Înterupeți tratamentul până la > 1000 / μl și semne clinice normale, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Anemie (hematocrit)	
> 26%	Mențineți nivelul dozei.
≤ 26%	Înterupeți tratamentul până la > 26% și semne clinice normale, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Toxicitate Hepatică (ALT, AST)	
> 1 X – 3 X peste limita normală	Mențineți nivelul dozei; întrerupeți administrarea medicamentelor hepatotoxice, dacă sunt utilizate.
> 3 X peste limita normală	Înterupeți tratamentul până la ≤ 3 X peste limita normală, întrerupeți administrarea medicamentelor hepatotoxice, dacă sunt utilizate, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Toxicitate Renală (creatinină)	
< 1,25 X peste limita normală	Mențineți nivelul dozei.
≥ 1,25 X peste limita normală	Înterupeți tratamentul până la < 1,25 X peste limita normală, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg
Anemie concurentă, azotemie, hipalbuminemie și hiperfosfatemie	
Înterupeți tratamentul pentru 1 până la 2 săptămâni, până ce valorile se îmbunătățesc și albumina este > 2,5 g/dl, apoi reduceți doza cu 0,5 mg/kg.	

*O reducere a dozei cu 0,5 mg/kg este o reducere de la 3,25 mg/kg la 2,75 mg/kg sau de la 2,75 mg/kg la 2,25 mg/kg. Doza nu trebuie să fie <2,2 mg/kg.