

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1472

Chan Pen Strep suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Īrija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Chan Pen Strep suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

Procaine benzylpenicillin

Dihydrostreptomycin

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Prokaīna benzilpenicilīns 200 mg

Dihidrostreptomicīna sulfāts 200 mg

Palīgvielas:

Metilparahidroksibenzoāts 1 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Pret prokaīna benzilpenicilīnu un dihidrostreptomicīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu infekcijas slimību ārstēšanai liellopiem, aitām un cūkām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot, ja ir pierādīta penicilāzi producējošu stafilokoku klātbūtne.

Tetraciklīni ir bakteriostatiskas antibiotikas, kas jādāmā var mijiedarboties ar baktericīdām vielām, tādām kā penicilīni.

Ja penicilīns tiek lietots kopā ar tetraciklīnu, kad iespējams, jābūt uzmanīgiem, lai ievērotu sekojošus punktus:

1. Pārliecinieties, ka tiek iedots pietiekams daudzums katras vielas; iespējams antagonisms parādās, kad tiek iedots pārāk niecīgs katras vielas daudzums.
2. Sākt penicilīna lietošanu vismaz pāris stundas pirms tetraciklīna lietošanas.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti tikusi novērota gadījuma rakstura alerģiska reakcija uz penicilīniem.

Hipersensitīvas (alerģiskas) reakcijas pret penicilīniem var variēt no lokāla iekaisuma līdz anafilaksei un nāvei. Ārstēšana ietver karsta un auksta ūdens strūklu un/vai kortikosteroīdus.

Dažreiz zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām prokaīna benzilpenicilīnu saturošu veterināro zāļu lietošana var izraisīt īslaicīgu drudzi, vemšanu, trīcēšanu, vispārēju vārgumu un kustību koordinācijas traucējumus.

Grūsnām sivēnmātēm un jauncūkām iespējama vulvas izvēršanās, kas var būt saistīta ar abortu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ieteicamā deva ir 4 ml uz 100 kg ķermeņa svara, t.i., 8 000 IU prokaīna benzilpenicilīna un 10 mg dihidrostreptomicīna sulfāta uz kg ķermeņa svara 3 – 5 dienas pēc kārtas. Nepārsniegt noteikto devu.

Tikai intramuskulārai lietošanai.

Sugas	Deva (ml)	Ķermeņa svars, kg
Liellopiem	4,0	100
Teļiem	2,0	50
Aitām	1,0	25
Jēriem	0,4	10
Sivēnmātēm	3,0	75
Sivēniem	0,2	5

Notīrīt injekcijas vietu un tamponēt ar spirtu.

Liellopiem maksimāli ievadāmā suspensijas deva vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 20 ml.

Pirms lietošanas flakonu saskalināt.

Pareizas devas noteikšanai pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka ķermeņa svars, lai izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tikai intramuskulārai ievadīšanai.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi, aitas, cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Liellopi: pienam: 72 stundas.

Nav reģistrēts lietošanai aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Uzglabāt ledusskapī (2⁰ C – 8⁰ C).

Nesasaldēt.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Izvairīties no veterināro zāļu kontaminācijas.

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojošiem šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Kad vien iespējams, šīs zāles vajadzētu lietot, balstoties uz jutīguma testu rezultātiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt hipersensitivitāti (alerģiju), kas seko pēc injekcijas, inhalācijas, norīšanas vai saskares ar ādu. Hipersensitivitāte pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas.

Ja pēc pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki simptomi, tādēļ nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība.

Grūsnība un laktācija:

Prokaīna penicilīns un dihidrostreptomicīns ir drošas lietošanai grūšņiem dzīvniekiem.

Nelietot aītām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Tetraciklīni ir bakteriostatiskas antibiotikas, kas iespējams var mijiedarboties ar baktericīdām vielām, tādām kā penicilīni. Tā kā penicilīni darbojas kavējot šūnu apvalka sintēzi, tādas vielas kā tetraciklīni, kuri kavē proteīnu sintēzi, var slēpt penicilīnu baktericīdo iedarbību.

Ja prokaīna benzilpenicilīns tiek lietots kopā ar tetraciklīnu, kad vien iespējams, jābūt uzmanīgiem un, kad vien iespējams, jāievēro sekojošais:

1. Pārliecinieties, ka tiek iedots pietiekams daudzums katras vielas; iespējams, antagonisms parādās, kad tiek iedots pārāk niecīgs katras vielas daudzums.

2. Lietot prokaīna benzilpenicilīnu vismaz pāris stundas pirms tetraciklīna lietošanas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Hipersensitīvas (alerģiskas) reakcijas pret penicilīniem var variēt no lokāla iekaisuma līdz anafilaksei un nāvei. Ārstēšana ietver karsta un auksta ūdens strūklu un/vai kortikosteroīdus.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.