

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/03/0226**  
**Albionic** šķīdums ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Huvepharma NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerp  
Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Biovet Joint Stock Company  
39, Petar Rakov Str.  
4550 Peshtera  
Bulgārija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Albionic** šķīdums ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm  
*Lincomycin, Neomycin*

Dzidrs, bezkrāsains vai viegli dzeltens šķīdums.

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viens 10 ml injektors satur:

**Aktīvās vielas:**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Linkomicīns (linkomicīna hidrohlorīda veidā) | 330 mg, |
| Neomicīns (neomicīna sulfāta veidā)          | 100 mg. |

**Palīgviela:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Dinātrija edetāts | 5 mg. |
|-------------------|-------|

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Mastīta ārstēšanai laktējošām govīm. Šīs zāles ir efektīvas pret *Staphylococcus* sugām (penicilināzi producējošie un neproducējošie celmi), tajā skaitā *Staphylococcus aureus*; pret *Streptococcus* sugām, tajā skaitā *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* un *Streptococcus uberis*, un pret koliformu baktērijām, ieskaitot *Escherichia coli*.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Laktējošas govīs.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Katrā skartajā tesmeņa ceturksnī ievadīt viena injektora saturu (10 ml zāļu) tūlīt pēc slaukšanas 3 reizes ar 12 stundu intervālu.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Ievadīšanai tikai tesmenī, ievērojot piesardzību. Injektoru drīkst izmantot tikai vienu reizi.

Kad nepieciešams, rūpīgi nomazgājiet pupus vai visu tesmeni ar siltu ūdeni, kam pievienots piemērots tesmeni dezinficējošs līdzeklis, un rūpīgi noslaukiet. Pilnībā izslauciet tesmeni. Ar spirtā vai citā piemērotā dezinfekcijas līdzeklī samitrinātu tamponu nodezinficējiet pupu galus. Katram pupam izmantojiet atsevišķu tamponu.

*Norādījumi ievadīšanai:*

a) Pilnīga ievadīšana: pavelkot taisnā virzienā uz augšu, noņemiet uzgali. Maigi ievadiet visu kanulu pupa kanālā; uzmanīgi veiciet zāļu ievadīšanu.

b) Daļēja ievadīšana: pavelkot taisnā virzienā uz augšu, noņemiet uzgali. Maigi ievadiet 1/8" (0,32 cm; 1" = 2,54 cm) kanulas pupa kanālā; uzmanīgi veiciet zāļu ievadīšanu.

Nospiediet virzuli, lai ievadītu visu zāļu saturu, un masējiet tesmeņa ceturksni, lai zāles izplatītos pa tesmeņa cisternu. Pēc ievadīšanas ir ieteicams iemērkēt pupus atzītā, pupu iemērkšanai paredzētā šķīdumā.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Pienam: 3,5 dienas (84 stundas).

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas (72 stundas).

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojošs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:  
Izvairīties no saskares ar šķīdumu. Pēc lietošanas nekavējoties mazgāt rokas un ādu, kas nonākusi saskarē ar zālēm.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Šīs zāles nedrīkst lietot vienlaicīgi ar makrolīdiem, piemēram, eritromicīnu, jo linkomicīns un makrolīdi iedarbības vietā, ribosomālā 50S subvienībā, savstarpēji darbojas antagonistiski.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Zāļu panesamība ir laba. Nejaušas pārdozēšanas gadījumā ir maz ticams, ka dzīvniekiem būs kāda vietēja vai sistēmiska nevēlama reakcija, tomēr par jebkurām nevēlamu reakciju pazīmēm nekavējoties jāziņo atbildīgajam veterinārārstam.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

10/2020

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.