

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FLEA COLLAR FOR CAT, antkaklis katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

diazinono (92 %) 16,4 %.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Polivinilchloridinė juostelė, impregnuota diazinonu.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms, užsikrėtusioms blusomis *Ctenocephalides felis* ir kraujasiurbėmis erkėmis *Ixodes ricinus*, gydyti ir profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti sergantiems, sveikstantiems gyvūnams, padidėjus jautrumui fosforo organiniams junginiams (FOJ), esant kepenų funkcijų sutrikimams, vaikingoms katėms ir laktacijos metu bei jaunesniems kaip 6 mėn. amžiaus kačiukams.

4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Antkaklis, kuris juosia gyvūno kaklą per stipriai, gali sukelti odos sudirgimą.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ar gyvūnų ėdesio. Antkaklio juosimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Būtina kiek galima vengti sąlyčio su oda. Apjuosus antkaklį būtina plauti rankas. Atsitiktinai prarijus būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę ar informacinį lapelį.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Retai gali pasireikšti nepalankūs poveikis, kaip dažnas šlapinimasis, viduriavimas, vėmimas, ašarojimas, seilėjimasis, ištakos iš nosies, kosulys ir raumenų drebulys.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Kadangi nėra pakankamai duomenų, nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Diazinonas yra FOJ. Sąveika su kitais FOJ gali būti sinerginė bei antagonistinė. Nervų-raumenų blokadą sukeliančios medžiagos, medžiagos, kurios veikia tas pačias esterazes, kurios skatina kepenų fermentus ar turi poveikį raumenų funkcijoms, pesticidai pasižymintys panašiu veikimu kaip FOJ, gali didinti FOJ toksiškumą.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Tik išoriniam naudojimui. Prakirpus pakelį ir išėmus antkaklį, jį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad neveržtų ir nesmuktų. Augančiam gyvūnui dirželį būtina nuolat atlaisvinti. Jei dirželis per ilgas, nereikalingą jo dalį patartina nukirpti, tačiau būtina atsižvelgti į galimą gyvūno augimą. Atsiradus odos dirginimo požymiams, dirželį būtina nedelsiant nuimti. Antkaklis nuo ektoparazitų saugo 6 mėn. Negalima leisti su antkakliu žaisti vaikams, apsauginį pakelį galima atplėšti tik prieš naudojimą. Naudotą antkaklį būtina saugiai išmesti į šiukšlių konteinerį.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Apsinuodijimo simptomai – dažnas šlapinimasis, viduriavimas, vėmimas, ašarojimas, seilėjimasis, ištakos iš nosies ir bronchų, kosulys, vyzdžių susitraukimas, refleksų išnykimas, raumenų drebulys ir koma bei cianozė. Tokiu atveju būtina antkaklį nedelsiant nuimti ir švirkšti priešnuodžio atropino.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos.
ATCvet kodas: QP53AF.

Iš apjuosto ant katės kaklo antkaklio 6 mėn. nuolat išsiskiria diazinonas. Jis pasiskirsto po visą gyvūno odą. Diazinonas nepatenka į kraujo apytaką, todėl neveikia sistemškai. Erkės ir blusos po sąlyčio su diazinonu žūva.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Polivinilchloridas, di-(2-etilheksil)ftalatas, di-izobutilftalatas, bario lauratas, kalcio stearatas, cinko stearatas, epoksidintas sojų pupelių aliejus, stearino rūgštis, kalcio karbonatas, titano oksidas, suodžiai.

6.2. Nesuderinamumai

Nenaudoti kartu su kitais fosforo organiniais junginiais, morfinu ir kitais opioidais, teofilinu, aminofilinu, dideliu intraveninių tirpalų kiekiu, ksanteno dariniais, inhaliaciniais anestetikais, magnio jonais, antibiotikais (aminoglikozidais, polimiksinu B ir kt.), depoliarizuojančiais ir nedepoliarizuojančiais raumenų relaksantais, sukcinilcholinu, fenotiazinu, prokainu, fenobarbitaliu, chloruotais angliavandenilių pesticidais ir daugeliu chloruotų bifenilių.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sandarioje pakuotėje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Juodos spalvos polivinilchloridinis antkaklis popieriniuose/aliumininiuose/polietileniniuose pakeliuose, kartoninėse dėžutėse arba polivinilchloridiniais blisteriais, uždengtais popieriniais/didelio tankio polietileniniais/aliumininiais/didelio tankio polietileniniais/popieriniais lakštais.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Beaphar B.V.,
Drostenkamp 3,
8101 BX Raalte,
Olandija

8. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/03/1576/001-002

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2008-06-30

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2008-06-13

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ
BLISTERIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FLEA COLLAR FOR CAT, antkaklis katėms

2. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Antkaklyje yra:
diazinono (92 %) 16,4 %.

3. VAISTO FORMA

Polivinilchloridinė juostelė, impregnuota diazinonu.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 antkaklis

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

6. INDIKACIJOS

Katėms, užsikrėtusioms blusomis *Ctenocephalides felis* ir kraujasiurbėmis erkėmis *Ixodes ricinus*, gydyti ir profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui. Prakirpus paketį ir išėmus antkaklį, jį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad neveržtų ir nesmuktų.

8. IŠLAUKA

Išlauka: nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sandarioje pakuotėje.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Beaphar B.V.,
Drostenkamp 3,
8101 BX Raalte,
Olandija

16. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/03/1576/001
LT/2/03/1576/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ

PAKELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FLEA COLLAR FOR CAT, antkaklis katėms

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Beaphar B.V., Olandija

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
FLEA COLLAR FOR CAT, antkaklis katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Beaphar B.V.,
Drostenkamp 3,
8101 BX Raalte,
Olandija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FLEA COLLAR FOR CAT, antkaklis katėms

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

diazinono (92 %) 16,4 %.

4. INDIKACIJOS

Katėms, užsikrėtusioms blusomis *Ctenocephalides felis* ir kraujasiurbėmis erkėmis *Ixodes ricinus*, gydyti ir profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti sergantiems, sveikstantiems gyvūnams, padidėjus jautrumui fosforo organiniams junginiams (FOJ), esant kepenų funkcijų sutrikimams, vaikingoms katėms ir laktacijos metu bei jaunesniems kaip 6 mėn. amžiaus kačiukams.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retai gali pasireikšti nepalankūs poveikis, kaip dažnas šlapinimasis, viduriavimas, vėmimas, ašarojimas, seilėjimasis, ištakos iš nosies, kosulys ir raumenų drebulys.

Pastebėjus bet kokių sunkių poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Tik išoriniam naudojimui. Prakirpus pakelį ir išėmus antkaklį, jį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad neveržtų ir nesmuktų. Augančiam gyvūnui dirželį būtina nuolat atlaisvinti. Jei dirželis per ilgas, nereikalingą jo dalį patartina nukirpti, tačiau būtina atsižvelgti į galimą gyvūno augimą. Atsiradus odos dirginimo požymiams, dirželį būtina nedelsiant nuimti. Antkaklis nuo ektoparazitų saugo 6 mėn.

Negalima leisti su antkakliu žaisti vaikams, apsauginį pakelį galima atplėsti tik prieš naudojimą. Naudotą antkaklį būtina saugiai išmesti į šiukšlių konteinerį.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Antkaklis, kuris juosia gyvūno kaklą per stipriai, gali sukelti odos sudirgimą.

Kadangi nėra pakankamai duomenų, nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Diazinonas yra FOJ. Sąveika su kitais FOJ gali būti sinerginė bei antagonistinė. Nervų-raumenų blokadą sukeliančios medžiagos, medžiagos, kurios veikia tas pačias esterazes, kurios skatina kepenų fermentus ar turi poveikį raumenų funkcijoms, pesticidai pasižymintys panašiu veikimu kaip FOJ, gali didinti FOJ toksiškumą.

Apsinuodijimo simptomai – dažnas šlapinimasis, viduriavimas, vėmimas, ašarojimas, seilėjimasis, ištakos iš nosies ir bronchų, kosulys, vyzdžių susitraukimas, refleksų išnykimas, raumenų drebulys ir koma bei cianozė. Tokiu atveju būtina antkaklį nedelsiant nuimti ir švirkšti priešnuodžio atropino.

Nenaudoti kartu su kitais fosforo organiniais junginiais, morfinu ir kitais opioidais, teofilinu, aminofilinu, dideliu intraveninių tirpalų kiekiu, ksanteno dariniais, inhaliaciniais anestetikais, magnio jonais, antibiotikais (aminoglikozidais, polimiksinu B ir kt.), depoliarizuojančiais ir nedepoliarizuojančiais raumenų relaksantais, sukcinilcholinu, fenotiazinu, prokainu, fenobarbitaliu, chloruotais angliavandenilių pesticidais ir daugeliu chloruotų bifenilių.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sandarioje pakuotėje.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ar gyvūnų ėdesio. Antkaklio juosimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Būtina kiek galima vengti sąlyčio su oda. Apjuosus antkaklį būtina plauti rankas. Atsitiktinai prarijus būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę ar informacinį lapelį.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-06-13

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: ektoparaziticidinės medžiagos.

ATCvet kodas: QP53AF.

Iš apjuosto ant katės kaklo antkaklio 6 mėn. nuolat išsiskiria diazinonas. Jis pasiskirsto po visą gyvūno odą. Diazinonas nepatenka į kraujo apytaką, todėl neveikia sistemiškai. Erkės ir blusos po sąlyčio su diazinonu žūva.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.