

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel mit 10 Beutel à 100 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bacivet S, 4200 IE/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser, Kaninchen.

2. WIRKSTOFF(E)

Bacitracin-Zink 4200 IE/g

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Schachtel mit 10 Beutel à 100 g.

4. ZIELTIERART(EN)

Mastkaninchen.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 2 Tage

8. VERFALLDATUM

Nach dem Öffnen des Beutels: sofort verwenden.
Nach dem Auflösen: 24 Stunden.

Exp. (Monat/Jahr)

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT- UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

HUVEPHARMA NV

14. ZULASSUNGNUMMERN

BE-V372425

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**100-g-Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte/Aluminium/Polyester****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bacivet S, 4200 IE/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser, Kaninchen.

2. WIRKSTOFF(E)

Bacitracin-Zink 4200 IE/g

3. ZIELTIERART(EN)

Mastkaninchen.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 2 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. (MM/JJJJ)

Nach dem Öffnen: sofort verwenden.

Nach dem Auflösen: innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}