

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

KETOPROCEN, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas arkliams, galvijams ir kiaulėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename ml yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

ketoprofeno 100 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

benzilo alkoholio (E1519) 10 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus gelsvas tirpalas kuriame nėra matomų dalelių.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Arkliai, galvijai ir kiaulės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliai:

- uždegimo ir skausmo, susijusio su kaulų ir raumenų ligomis, malšinimas.
- simptominis visceralinio skausmo, susijusio su diegliais, gydymas. Pooperacinis skausmas ir uždegimas.

Galvijai:

- Priešuždegiminis ir skausmą malšinantis raumenų ir kaulų sistemos ligų gydymas.
- Pireksijos ir distreso, susijusio su bakterinėmis kvėpavimo takų ligomis, mažinimas, jei taikoma kartu su antimikrobiniu gydymu.
- Pieno edemos mažinimas.
- prieš uždegiminis, skausmą malšinantis ir karščiavimą mažinantis gydymas esant ūmiems klinikiniam mastito požymiams, kartu su antimikrobiniu gydymu

Kiaulės:

- Pireksijos mažinimas sergant kvėpavimo takų ligomis.
- Pogimdyvinio disgalaktijos sindromo, mastito metrito agalaktijos sindromo gydymas.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti padidėjus jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Negalima naudoti gyvūnams, sergantiems širdies, kepenų ar inkstų ligomis.

Negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra virškinimo trakto išopėjimo ar kraujavimo galimybė.

Negalima naudoti gyvūnams, kai yra kraujo diskrazijos ar kraujo krešėjimo sutrikimų.

Nevartokite kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) vienu metu arba per 24 valandas vienas nuo kito.

Negalima skirti kartu su kortikosteroidais, diuretikais ar antikoagulantais.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Jaunesniems kaip 15 dienų kumeliukams ketoprofeno vartoti nerekomenduojama. Naudojimas gyvūnams, jaunesniems nei 6 savaitių, arba vyresniems gyvūnams gali sukelti papildomą riziką. Jei tokio vartojimo išvengti negalima, gyvūnams gali prireikti sumažinti dozę ir kruopščiai juos tvarkyti. Venkite injekcijos į arteriją.

Neviršykite nurodytos dozės ar gydymo trukmės.

Venkite naudoti gyvūnams, kuriems dehidratuojama, hipovolemija ar hipotenzija, nes yra padidėjusio toksiškumo inkstams pavojus. Gydymo metu reikia pakankamai vartoti vandens.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai ir (ar) benzilo alkoholiui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Stengtis, kad neužtikštų ant odos ir į akis. Užtikškus kruopščiai nuplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka reikia kreiptis į gydytoją.

Po naudojimo reikia plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Labai retai gali atsirasti dirginimas ar virškinimo trakto išopėjimas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniai tyrimai su žiurkėmis, pelėmis ir triušiais; galvijams nepateikė jokių teratogeninio ar embriotoksinio poveikio įrodymų. Galima naudoti galvijams nėščios ir laktacijos metu.

Veterinarinio vaisto saugumas žirgų vaisingumo, nėštumo ar vaisiaus sveikatos metu nebuvo nustatytas. Nenaudoti nėščioms kumelėms.

Paršavedžių nėštumo metu veterinarinio vaisto saugumas nebuvo nustatytas. Naudokite tik atsakingo veterinarijos gydytojo įvertinus naudos ir rizikos santykį.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti su kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), gliukokortikoidai ar diuretikais bei antikoagulantais.

Ketoprofenas gali stipriai prisijungti prie plazmos baltymų ir konkuruoti su kitais stipriai surištais vaistais, kurie gali sukelti toksinį poveikį.

Reikia vengti vartoti kartu su nefrotoksiais vaistais.

Kadangi ketoprofenas gali slopinti trombocitų agregaciją ir sukelti virškinimo trakto opas, jo negalima vartoti kartu su kitais vaistais, turinčiais tą patį nepageidaujamų reakcijų pobūdį.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vartoti į raumenis arba į veną.

Arkliai:

Injekcija į veną.

- Skiriant kaulų ir raumenų ligoms, dozė yra 2,2 mg ketoprofeno 1 kg kūno svorio, t. Y. 1 ml produkto kiekvienam 45 kg kūno svorio, vieną kartą per parą 3–5 dienas.

Vartojant dieglius, dozė yra 2,2 mg ketoprofeno / kg, t. Y. 1 ml produkto kiekvienam 45 kg kūno svorio per vieną injekciją.

Paprastai pakanka vienos injekcijos: prieš bet kokią papildomą injekciją reikia pakartotinai kliniškai įvertinti gyvūną.

Galvijai:

Injekcija į raumenis arba į veną.

Rekomenduojama dozė: 3 mg ketoprofeno / kg kūno svorio, atitinkanti 1 ml produkto kiekvienam 33 kg kūno svorio, vieną kartą per parą iki 1–3 dienų.

Kiaulės:

Injekcija į raumenis.

Rekomenduojama dozė: 3 mg / kg kūno svorio, atitinkanti 1 ml produkto kiekvienam 33 kg kūno svorio, vienkartinė dozė.

Norint išvengti daug kamštelių, norint įkišti kelis buteliukus, rekomenduojama išsiurbti adatą arba daugiadozį švirkštą. Dangtelis gali būti saugiai pradurtas iki 30 kartų.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Gali pasitaikyti anoreksija, vėmimas ir viduriavimas.

4.11. Išlauka

Arkliai

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

Pienui – 0 val.

Galvijai

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

Pienui – 0 val.

Kiaulės

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir reumato, propiono rūgšties dariniai.
ATCvet kodas: QM01AE03.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Ketoprofenas turi priešuždegiminių, nuskausminamųjų ir karščiavimą mažinančių savybių. Ne visi jo veikimo mechanizmo aspektai yra žinomi. Poveikis iš dalies gaunamas slopinant prostaglandinų ir leukotrienų sintezę ketoprofenu, veikiant atitinkamai ciklooksigenazei ir lipoksigenazei. Taip pat

slopinamas bradikinino susidarymas. Ketoprofenas slopina trombocitų agregaciją. Yra žinoma, kad (S)-enantiomeras skatina

5.2. Farmakokinetinės savybės

Ketoprofenas greitai absorbuojamas. Naudojus parenteraliai, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro greičiau nei per vieną valandą. Biologinis prieinamumas yra beveik visiškas. Ketoprofenas gerai jungiasi su plazmos baltymais, leisdamas jiems kauptis uždegiminių vietų eksudate.

Veikimas yra ilgesnis, nei galima tikėtis atsižvelgiant į jo pusinės eliminacijos laiką iš plazmos, kuris skirtingoms rūšims svyruoja nuo vienos iki keturių valandų.

Ketoprofenas patenka į sinovinį skystį ir išlieka ten didesnės koncentracijos nei kraujo plazmoje, o pusinės eliminacijos laikas yra du ar tris kartus ilgesnis nei pusinės eliminacijos laikas iš kraujo plazmos.

Ketoprofenas metabolizuojamas kepenyse ir 90 % išsiskiria su šlapimu.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis (E1519),
argininas,
citrinų rūgštis monohidratas (pH koregavimui),
injekcinis vanduo.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 30 mėn.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo tamsaus stiklo buteliukai po 50 ml, 100 ml ir 250 ml, užkimšti bromobutilinės gumos kamšteliais ar apgaubti aliumininiais gaubteliais su nuplėšiamais dangteliais.

Pakuotės

- Kartoninė dėžutė su vienu 50 ml buteliuku.
- Kartoninė dėžutė su vienu 100 ml buteliuku.
- Kartoninė dėžutė su vienu 250 ml buteliuku.
- Kartoninė dėžutė su 10 buteliukų po 50 ml.
- Kartoninė dėžutė su 10 buteliukų po 100 ml.
- Kartoninė dėžutė su 10 buteliukų po 250 ml.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su juo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

CENAVISA, S.L.
Camí Pedra Estela s/n
43205 Reus
ISPANIJA

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/16/2372/001-003

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2016-11-09
Perregistravimo data 2022-01-26

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2022-01-24

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Platinimo sąlygos: parduodama tik su veterinariniu receptu.

Naudojimo sąlygos: naudoti (švirkšti į veną) gali tik veterinarijos gydytojas arba naudoti tik jam tiesiogiai prižiūrint.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS IR PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ml ir 250 ml buteliukų etiketės
Dėžutės vienam 50 ml, 100 ml ir 250 ml buteliukui
Dėžutės 10 buteliukų po 50 ml, 100 ml ir 250 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

KETOPROGEN, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas arkliams, galvijams ir kiaulėms
Ketoprofenas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekviename ml yra:
veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):
ketoprofeno 100 mg;

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai, galvijai ir kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vartoti į raumenis arba į veną
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

Arkliai

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

Pienui – 0 val.

Galvijai

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

Pienui – 0 val.

Kiaulės

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 28 dienas.

Atidarius sunaudoti iki...

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

CENAVISA, S.L.
Cami Pedra Estela s/n
43205 Reus
ISPANIJA
Tel. + 34 977 757273

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/16/2372/001 (1 x 50 ml, 10 x 50 ml)
LT/2/16/2372/002 (1 x 100 ml, 10 x 100 ml)
LT/2/16/2372/003 (1 x 250 ml, 10 x 250 ml)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

50 ml buteliukų etiketės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

KETOPROGEN, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas arkliams, galvijams ir kiaulėms
Ketoprofenas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

100 mg/ml

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti į raumenis (galvijams ir kiaulėms) ar į veną (arkliams ir galvijams).

5. IŠLAUKA

Išlauka:

Arkliai Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.
Pienui – 0 val.

Galvijai Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.
Pienui – 0 val.

Kiaulės Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius būtina sunaudoti per 28 dienas.
Atidarius sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
KETOPROCEN, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

CENAVISA S.L.

Camí Pedra Estela s/n

43205 Reus

ISPANIJA

Tel. + 34 977 757273

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

KETOPROCEN, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas arkliams, galvijams ir kiaulėms
Ketoprofenas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekviename ml yra:

veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

ketoprofeno 100 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

benzilo alkoholio (E1519) 10 mg.

kitų pagalbinių medžiagų q.s.

Skaidrus gelsvas tirpalas kuriame nėra matomų dalelių.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliai:

- uždegimo ir skausmo, susijusio su kaulų ir raumenų ligomis, malšinimas.
- simptominis visceralinio skausmo, susijusio su diegliais, gydymas. Pooperacinis skausmas ir uždegimas.

Galvijai:

- Priešuždegiminis ir skausmą malšinantis raumenų ir kaulų sistemos ligų gydymas.
- Pireksijos ir distreso, susijusio su bakterinėmis kvėpavimo takų ligomis, mažinimas, jei taikoma kartu su antimikrobiniu gydymu.
- Pieno edemos mažinimas.
- prieš uždegiminis, skausmą malšinantis ir karščiavimą mažinantis gydymas esant ūmiems klinikiniams mastito požymiams, kartu su antimikrobiniu gydymu.

Kiaulės:

- Pireksijos mažinimas sergant kvėpavimo takų ligomis.
- Pogimdyvinio disgalaktijos sindromo, mastito metrito agalaktijos sindromo gydymas.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti padidėjus jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Negalima naudoti gyvūnams, sergantiems širdies, kepenų ar inkstų ligomis.
Negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra virškinimo trakto išopėjimo ar kraujavimo galimybė.
Negalima naudoti gyvūnams, kai yra kraujo diskrazijos ar kraujo krešėjimo sutrikimų.
Nevartokite kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) vienu metu arba per 24 valandas vienas nuo kito.
Negalima skirti kartu su kortikosteroidais, diuretikais ar antikoagulantais.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retai gali pasireikšti dirginimas ar virškinimo trakto išopėjimas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai, galvijai ir kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vartoti į raumenis arba į veną.

Arkliai:

Injekcija į veną.

- Skiriant kaulų ir raumenų ligoms, dozė yra 2,2 mg ketoprofeno 1 kg kūno svorio, t. Y. 1 ml produkto kiekvienam 45 kg kūno svorio, vieną kartą per parą 3–5 dienas.

Vartojant dieglius, dozė yra 2,2 mg ketoprofeno / kg, t. Y. 1 ml produkto kiekvienam 45 kg kūno svorio per vieną injekciją.

Paprastai pakanka vienos injekcijos: prieš bet kokią papildomą injekciją reikia pakartotinai kliniškai įvertinti gyvūną.

Galvijai:

Injekcija į raumenis arba į veną.

Rekomenduojama dozė: 3 mg ketoprofeno / kg kūno svorio, atitinkanti 1 ml produkto kiekvienam 33 kg kūno svorio, vieną kartą per parą iki 1–3 dienų.

Kiaulės:

Injekcija į raumenis.

Rekomenduojama dozė: 3 mg / kg kūno svorio, atitinkanti 1 ml produkto kiekvienam 33 kg kūno svorio, vienkartinė dozė.

9. NURODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Negalima maišyti su jokia kita medžiaga tame pačiame švirškšte.

Norint išvengti daugkartinio patekimo į flakoną, rekomenduojama naudoti aspiracinę adatą ar daugiadozį švirškštą, kad išvengti per daug intensyvaus kamštelio pradūrimo. Dangtelis gali būti saugiai pradurtas iki 30 kartų.

10. IŠLAUKA

Arkliai

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

Pienui – 0 val.

Galvijai

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

Pienui – 0 val.

Kiaulės

Skerdienai ir subproduktams – 4 paros.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po EXP. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Jaunesniems kaip 15 dienų kumeliukams ketoprofeno vartoti nerekomenduojama. Naudojimas gyvūnams, jaunesniems nei 6 savaitių, arba vyresniems gyvūnams gali sukelti papildomą riziką. Jei tokio vartojimo išvengti negalima, gyvūnams gali prireikti sumažinti dozę ir kruopščiai juos tvarkyti. Venkite injekcijos į arteriją.

Neviršykite nurodytos dozės ar gydymo trukmės.

Venkite naudoti gyvūnams, kuriems dehidratuojama, hipovolemija ar hipotenzija, nes yra padidėjusio toksiškumo inkstams pavojus. Gydymo metu reikia pakankamai vartoti vandens.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai ir (ar) benzilo alkoholiui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai įsišvirškštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Stengtis, kad neužtikštų ant odos ir į akis. Užtikškus kruopščiai nuplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka reikia kreiptis į gydytoją.

Po naudojimo reikia plauti rankas.

Vaikingumas ir laktacija

Laboratoriniai tyrimai su žiurkėmis, pelėmis ir triušiais; galvijams nepateikė jokių teratogeninio ar embriotoksinio poveikio įrodymų. Galima naudoti galvijams nėščios ir laktacijos metu.

Veterinarinio vaisto saugumas žirgų vaisingumo, nėštumo ar vaisiaus sveikatos metu nebuvo nustatytas. Nenaudoti nėščioms kumelėms.

Paršavedžių nėštumo metu veterinarinio vaisto saugumas nebuvo nustatytas. Naudokite tik atsakingo veterinarijos gydytojo įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti su kitais nesteroidiniais, vaistais nuo uždegimo (NVNU), gliukokortikoidai ar diuretikais bei antikoaguliantais.

Ketoprofenas gali stipriai prisijungti prie plazmos baltymų ir konkuruoti su kitais stipriai surištais vaistais, kurie gali sukelti toksinį poveikį.

Reikia vengti vartoti kartu su nefrotoksinais vaistais.

Kadangi ketoprofenas gali slopinti trombocitų agregaciją ir sukelti virškinimo trakto opas, jo negalima vartoti kartu su kitais vaistais, turinčiais tą patį nepageidaujamų reakcijų pobūdį.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Klinikinių požymių nepastebėta, kai arkliams 15 dienų buvo skiriama 5 kartus didesnė už rekomenduojamą dozę, o galvijams - 5 kartus didesnė už rekomenduojamą dozę - 5 dienas, o kiaulėms - 3 kartus didesnė už rekomenduojamą dozę 3 dienas.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas ir vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

2022-01-24

15. KITA INFORMACIJA

Pakuotės:

- Kartoninė dėžutė su vienu 50 ml buteliuku.
- Kartoninė dėžutė su vienu 100 ml buteliuku.
- Kartoninė dėžutė su vienu 250 ml buteliuku.
- Kartoninė dėžutė su 10 buteliukų po 50 ml.
- Kartoninė dėžutė su 10 buteliukų po 100 ml.
- Kartoninė dėžutė su 10 buteliukų po 250 ml.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Naudojimo sąlygos: naudoti (švirkšti į veną) gali tik veterinarijos gydytojas arba naudoti tik jam tiesiogiai prižiūrint.