



## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Кучета и котки.

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ**

Една доза от RABIGEN MONO се прилага подкожно по следната схема:

### Основна ваксинация

Една доза RABIGEN MONO след 3 месечна възраст.

### Реваксинация

Една доза RABIGEN MONO веднъж годишно.

Впоследствие ваксинациите при кучетата се правят на интервали от 3 години.

Титрите на антителата могат да спаднат в течение на 3-годишната продължителност на имунитета под нивото, определено от изискванията за тест при пътуване (титри на антитела  $\geq 0,5$  IU/ml), въпреки че животните са защитени. При пътуване до рискови райони или извън ЕС, ветеринарните лекари могат да пожелаят да извършат допълнителни ваксинации срещу бяс, за да гарантират, че ваксинираните животни имат титър на антитела  $\geq 0,5$  IU/ml, което обикновено се счита за достатъчна защита.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Да се ваксинират само здрави животни.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Не е приложимо.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние ( $2\text{ }^{\circ}\text{C} - 8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Препоръчва се животните да бъдат третирани срещу вътрешни паразити 10 дни преди ваксинацията.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност:

Да не се използва при бременни кучки.

Да не се използва при бременни котки.

Лактация:

Не се препоръчва прилагането му по време на кърмене.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

При кучета, наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че RABIGEN MONO може да бъде смесван с ваксина CANIGEN DHA2PPi/L.

При котки, наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че RABIGEN MONO може да бъде смесван с ваксина FELIGEN CRP.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Предозирането с RABIGEN MONO не води до други реакции, освен споменатите в т. "Неблагоприятни реакции".

Основни несъвместимости:

Да не се прилага RABIGEN MONO в комбинация с други ваксини, освен с FELIGEN CRP или CANIGEN DHA2PPi/L.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

април 2023 г

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Картонена кутия с 1, 10, 50 и 100 флакона.

Стъклен флакон тип I. Еластична гумена запушалка. Алуминиева капачка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

Ергон-Миланова ООД, гр. София 1335, ж.к. Люлин 10, бл.145, ап.1, Тел: + 359/ 02/ 8255167.

**Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ**

*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*