

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
TRIVACTON 6 inj.

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l'Aviation,
69800 Saint Priest, Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRIVACTON 6 inj.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1ml vakcíny obsahuje:

Escherichia coli 0:101 antigen K99

Escherichia coli 0:117 antigen Y

v množství minimálně 0,9 log 10 indexu

Escherichia coli 0:78 antigen 31A

serokonverze u morčat

Escherichia coli 0:101 antigen F41

Rotavirus bovine inactivatum - minimum 2,0 log 10 HAI titr u morčat

Coronavirus bovinum inactivatum - minimum 1,5 log 10 SN titr u morčat

(INRA patent)

Aluminium hydroxid, Saponin, Thiomersal, Chlorid sodný

4. INDIKACE

Pasivní imunizace proti neonatálním průjmům u telat způsobeným *E. coli*, rotaviry a koronaviry
zajištěná prostřednictvím vakcinace březích krav.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po vakcinaci se může objevit uzlíkovité zduření v místě vpichu. Po vakcinaci se mohou vyskytnout
hypersenzitivní reakce u senzibilizovaných zvířat.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánně. Dávka 5ml podle následujícího vakcinačního schéma:

Primární vakcinace

2 injekce s intervalem dvou týdnů.

- Prvá injekce: 1 - 2 měsíce před porodem

- Druhá injekce: * kojící krávy: v den porodu (+- 24 hodin)

* krávy v laktaci: 2 - 6 týdnů před otelením

Revakcinace: 2 týdny před porodem (dojnice) nebo v den porodu (kojné krávy).

Pro telata je nezbytné zajistit:

- první den: přisun kolostra ihned po porodu v dostatečném množství, t.j. 10% z hmotnosti telete
během prvních 24 hodin věku.

- během následujících 3 týdnů: * telata od kojných krav: mléko od vakcinovaných krav

* telata od krav v laktaci: přidávat do doplňkového krmiva
10 % objemu kolostra od vakcinovaných matek, skladovaného v
mrazicím boxu.

V případě epidemie, částečná vakcinace všech zvířat snižuje počet a závažnost průjmových onemocnění. Ačkoliv, v takovém případě je nezbytné k plné kontrole průjmů zajistit, že všechna telata obdrží kolostrum a mléko od vakcinovaných krav tzn., že je nutné pokračovat s vakcinací i v dalším roce.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením obsah lékovky protřepat. Vakcinujte pouze zdravá zvířata. Použijte obvyklé aseptické postupy. Pro vakcinaci použijte sterilní materiál. Obsah lékovky je nutno po otevření ihned spotřebovat.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2020

15. DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: 1 x 1 dávka, 1 x 10 dávek, 10 x 1 dávka, 20 x 1 dávka, 100 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze na předpis veterinárního lékaře. Jen pro zvířata.