

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Limoxin-200 LA, 200 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Oxytetracycline (като dihydrate) – 200 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml
100 ml
250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, кози и свине

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение и контрол на възприемчиви към окситетрациклина бактериални инфекции, причинени от Грам-положителни и Грам-отрицателни патогенни бактерии, някои рикетсии и по-големи вируси.

Някои специфични терапевтични показания са: респираторни инфекции, като пастъорелоza, бронхопневмония и други респираторни заболявания при говеда, овце, кози и свине.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.

Препоръчителна доза: 20 mg/kg телесна маса (или 1 ml Limoxin-200 LA на 10 kg телесна маса) чрез дълбока мускулна инжекция.

Ако е необходимо, лечението да се повтори след 48 часа при овце.

При свине с телесна маса под 10 kg, да се използва доза от 1 ml, която може да се приложи подкожно.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 28 дни

Мляко: 7 дни (или 15 издоения при крави, доени 2 пъти дневно)

Свине, овце и кози:

Месо и вътрешни органи: 28 дни

Не се разрешава за употреба при лактиращи овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След първо отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °C.

Да не се замразява.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”
--

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-2565

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

Стъклени флакони от 50 ml, 100 ml и 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Limoxin-200 LA, 200 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Oxytetracycline (като dihydrate) – 200 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце, кози и свине

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 28 дни

Мляко: 7 дни (или 15 издоения при крави, доени 2 пъти дневно)

Свине, овце и кози:

Месо и вътрешни органи: 28 дни

Не се разрешава за употреба при лактиращи овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °C.

Да не се замразява.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП