

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril 25 mg/ml Lösung zum Eingeben

**2. WIRKSTOFF(E)**

Enrofloxacin 25 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

500 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kalb), Schaf (Lamm)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind (Kalb): Essbare Gewebe: 7 Tage.

Schaf (Lamm): Essbare Gewebe: 7 Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Das Datum der ersten Entnahme ist auf dem Etikett der Flasche einzutragen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Elanco Logo

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 8-00061

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****FLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril 25 mg/ml Lösung zum Eingeben

**2. WIRKSTOFF(E)**

Enrofloxacin 25 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kalb), Schaf (Lamm)

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind (Kalb): Essbare Gewebe: 7 Tage.

Schaf (Lamm): Essbare Gewebe: 7 Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen innerhalb von 3 Monaten aufzubrauchen.

Erste Entnahme am: \_\_\_\_\_

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Elanco Logo

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}