

## ЛИСТОВКА:

ИНВОЛИН – инжекционен разтвор за кучета и коне

### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба:

„Фарма СИС БГ” ООД,  
ул. „Сан Стефано“ № 6 вх. Б ет.1 офис 3, гр. Добрич  
Р. България  
телефон/факс: 058604266

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

„ФАРМА ВЕТ” ООД,  
ул. „Отец Паисий” № 40, гр. Шумен,  
Р. България  
телефон/факс: 054/801 215

### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

ИНВОЛИН  
INVOLIN

### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ**

Pilocarpine hydrochloride      50 mg/ml

### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Продуктът се използва като диафоретично средство – за отделяне на големи количества течности.

- При нарушение във функциите на бъбреците – за предотвратяване на уремия.
- За ускоряване на резорбцията на ексудати и трансудати.
- При остър тотален асептичен пододерматит при конете.
- При остри възпаления на мозъка и менингите и при хронична мозъчна хидроцефалия.
- При сърдечна недостатъчност, съпроводена със застой.
- При чернодробни заболявания, придружени с асцити.
- При ендометрити и при хипофункция на яйчниците (в комбинация с хормонални продукти).
- Като очистително (препоръчително е след прилагане на селинен пургатив).
- При колики на червата и атония на пикочния мехур.

### **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

Да не се използва при белодробни и сърдечни заболявания.

Да не се използва при бременност и при тетанус.

### **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

Могат да се наблюдават миоза, промени в зрителното поле, повишаване на слъзната секреция, конюнктивална вазодилатация, гастроинтестинални, бронхопулмонални смущения, хиперсекреция на слъзните, потните и слюнчените жлези и медикаментозна алергия.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Кучета и коне (чието месо и мляко не са предназначени за консумация от хора).

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

За подкожно приложение.

Коня и кучета: 0,02 ml/kg т.м. дневно.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Моля, вижте т.8.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо и мляко са предназначени за консумация от хора.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Трябва да се внимава за да се избегне случайно самоинжектиране.

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към пилокарпин трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременност и лактация:

Не се препоръчва прилагането по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Установена е несъвместимост с атропин, поради наличен антагонизъм.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Могат да се наблюдават възбуждане на централната нервна система, безпокойство при животните, коремни болки и диспнея.

Като антидот се използва атропин.

Основни несъвместимости:

Несъвместим с атропин, поради наличен антагонизъм.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

01/2022

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

“Фарма СИС БГ” ООД,

ул. „Сан Стефано“ № 6 вх. Б ет.1 офис 3, гр. Добрич

Р. България

телефон/факс: 058604266

**ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ**  
*ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*