

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ORBENIN Extra Dry Cow 600 mg intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

3,60 g suspenzije (1 injektor) vsebuje:

Učinkovina:

kloksacilin (kot benzatinijev kloksacilinat)..... 600 mg.

Pomožne snovi:

stearinska kislina, aluminijev stearat, parafin, tekoči

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

24 injektorjev

60 injektorjev

120 injektorjev

200 injektorjev

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Krave v presušitvi.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

intramamarno

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Mleko: 96 ur (4 dni) po telitvi.

Meso in organi: 28 dni.

Zdravila ne dajemo kravam, kadar je obdobje do časa telitve krajše od 42 dni.

Če krava teli ali povrže predčasno, oziroma, če ji zdravilo damo v obdobju, krajšem od 42 dni do datuma telitve, je mleko primerno za prehrano ljudi 42. dan + 96 ur po zadnjem vnosu zdravila.

Če smo s tem zdravilom pomotoma zdravili krave med laktacijo, se mleka za prehrano ne sme uporabljati 46 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odpadne snovi odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0244/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ORBENIN Extra Dry Cow 600 mg intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

600 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3,6 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i/mam

5. KARENCA

Karenca:

Mleko: 96 ur (4 dni) po telitvi.

Meso in organi: 28 dni.

Zdravila ne dajemo kravam, kadar je obdobje do časa telitve krajše od 42 dni.

Za natančnejše navodilo karence preberite navodilo za uporabo.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.