

LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 56,25 mg täpilahus väga väikestele koertele
Prac-tic 137,5 mg täpilahus väikestele koertele
Prac-tic 275 mg täpilahus keskmist kasvu koertele
Prac-tic 625 mg täpilahus suurtele koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml sisaldab:

Toimeaine:

Püriprool 125 mg

Ühe pipetiga manustatakse:

	Annus	Püriprool
Prac-tic väga väikestele koertele	0,45 ml	56,25 mg
Prac-tic väikestele koertele	1,1 ml	137,5 mg
Prac-tic keskmist kasvu koertele	2,2 ml	275 mg
Prac-tic suurtele koertele	5,0 ml	625 mg

Abiained:

0,1% butüülhüdrosütolueen (E321)

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM

Värvitu kuni kollane, läbipaistev täpilahus välispidiseks kasutamiseks.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kirbunakkuse (*Ctenocephalides canis* ja *C. felis*) ravi ja profülaktika koertel. Edasise kirbunakkuse vastane toime kestab vähemalt 4 nädalat.

Puuginakkuste (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*) ravi ja profülaktika koertel. Puukidevastane toime püsib 4 nädalat.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada alla 8 nädala vanustel kutsikatel või vähem kui 2 kg kaaluvatel koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust fenüülpirasooli klassi komponentide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada haigetel (nt süsteemse haiguse või palavikuga) loomadel ega haigusest paranevatel loomadel.

See veterinaarravim on valmistatud spetsiaalselt koertele.

Mitte kasutada seda kassidel, kuna on üledoseerimise oht.

Mitte kasutada küülikutel.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

See veterinaarravim on ette nähtud puukide ja kirpude tõrjeks. Ravimit tuleks manustada ühe majapidamise kõigile koertele.

Raskekujulise kirbunakkuse korral tuleks enne ravi koera ümbritsevat keskkonda tolmuimejaga puhastada ja sobiva insektitsiidiga töödelda.

Koeri ei tohiks kuni 48 tundi enne ravi alustamist vannitada ega šampooniga pesta. 24 tunni jooksul pärast ravimi manustamist looma vannitamine või šampooniga pesemine vähendab ravimi tõhusust. Siiski, looma igapäevane pesemine ei mõjutanud ravimi puugi- ega kirbuvastast tõhusust.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Tarvitada ainult nahapinnal ja terve naha peal.

Ravim on mõeldud ainult raviks välispidiselt manustatava täpilahusena. Mitte manustada oraalselt või ükskõik millisel muul viisil.

Enne manustamist tuleks koerte kehamass täpselt määrata.

Tuleks hoolitseda selle eest, et ravim ei satuks loomale silma.

Oluline on manustada ravim kohta, kust koer ei saaks seda ära lakkuda. Kindlustada, et loomad ei lakuks üksteist pärast ravimi manustamist.

Ravi tulemusena lasevad puugid end 24 kuni 48 tunni jooksul pärast infestatsiooni peremehe küljest lahti, üksikud puugid võivad loomale siiski jääda. Seetõttu ei saa täielikult välistada puukidega levivaid nakkushaigusi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ettevaatusabinõuna tuleb inimestel vältida otsekontakti loomade ravimi manustamiskohaga ning lastel ei tohiks lasta ravialuste loomadega mängida kuni manustamiskoht on kuivanud. Seetõttu on soovitatav loomi ravida õhtul. Äsja ravitud loomi ei tohi lasta magada omanike ning eriti laste voodites.

Inimestel, kellel esineb ülitundlikkust fenüülpürasooli klassi komponentide või ravimi ükskõik milliste abiainetes, tuleks vältida kontakti ravimiga.

Vältida nahakontakti pipeti sisuga. Pärast kasutamist pesta käed või muud katmata kehaosad seebi ja veega. Ravimi juhuslikul silma sattumisel tuleb silmi hoolikalt veega loputada. Silmaärrituse püsivatel pöörduge abi saamiseks arsti poole ning näidake talle pakendi infolehte või etiketti.

Ravimi manustamise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua.

Kokkupuutel ravimiga võib ilmneda naha ja limaskestast ärritus ning tuimus, mis tavaliselt iseeneslikult

kaovad.

Muud ettevaatusabinõud

Tuleks vältida koera karva liigset märjaks tegemist ravimiga, sest see võib põhjustada ravitud koha karva muutumise kleepuvaks ja pulstunuks. Kui karv siiski juhtub pulstuma, kaob see 24 tunni jooksul pärast ravimi manustamist.

Prac-tic koostisse kuuluv lahusti võib muuta teatud materjalide värvust, sh nahk, tekstiilid, plastmassid ja viimistletud pinnad. Laske ravimi manustamiskohal täielikult kuivada, enne kui see puutub kokku selliste materjalidega.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Väga harvadel juhtudel on täheldatud järgmisi toimeid:

- manustamiskoha ja naha reaktsioonid: pruuritus (sügelev nahk), karvamuutus, dermatiit (nahapõletik), erüteem (naha punetus), alopeetsia (karvade väljalangemine), karva värvi muutus ja karva muutumine rasvaseks;
- neuroloogilised reaktsioonid: ataksia (koordinatsioonihäired) ja krambid;
- süsteemsed reaktsioonid: letargia (uimasus);
- seedetrakti reaktsioonid: emees (oksendamine) ja kõhulahtisus.

Need nähud on tavaliselt mööduvad ja kaovad 24 tunni jooksul pärast ravimi manustamist; kui need kestavad kauem, pidage nõu veterinaariga.

Kui koer ennast kohe pärast ravimi manustamist lakub, võib sellele järgneda lühike hüpersalivatsiooni (liigse süljeerituse) periood. See ei ole mürgistusnäht ning kaob minutite jooksul ravi vajamata. Ravimi õige pealekandmine vähendab manustamiskoha lakkumist koera poolt.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud)

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Veterinaarravimi ohutus tiinetel ja lakteerivatel loomadel ning tõuloomadel ei ole tõestatud. Uuringud laboriloomadel pole siiski näidanud mingeid ravimiga seotud mõjusid loomade paljunemisele või loote arengule.

Mitte kasutada tiinuse või laktatsiooni perioodil või kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule ravi kohta tiinuse või laktatsiooni perioodil.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada. Kuid koeraomanikel on soovitatav konsulteerida loomaarstiga, kui nad kavatsevad preparaati kasutada koertel, kes saavad ka teisi preparaate/ravimeid.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Täppmanustamine, välispidine.

Annustamise tabel

Soovituslik miinimumannus on 12,5 mg püriprooli ühe kilogrammi kehamassi kohta, mis vastab 0,1

ml täpilahust ühe kilogrammi kehamassi kohta.

Koera kehakaalu vahemik	Kasutatava pipeti suurus	Üks pipetitüüs 12,5% (w/v) lahust sisaldab (ml)	Püriprool (mg/kg kehamassi kohta)
2 - 4,5 kg	Väga väikesed koerad	0,45	12,5 - 28,1
> 4,5 - 11 kg	Väikesed koerad	1,1	12,5 - 30,6
> 11 - 22 kg	Keskmi kasvukoe koerad	2,2	12,5 - 25,0
> 22 - 50 kg	Suured koerad	5,0	12,5 - 28,4
Üle 50 kg	Õige annuse saamiseks kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.		

Iga kaaluvahemiku puhul tuleb õige suurusega pipeti kogu sisu kanda koera nahale.

Kirpude hävitamine ja profülaktika

Püriprool tapab kirbud 24 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist. Ühekordne manustamine hoiab ära kirbunakkuse 4 nädalaks.

Puukide hävitamine ja profülaktika

Püriprool tapab puugid 48 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist. Ühekordne manustamine tagab puugivastase toime 4 nädalaks.

Manustamisviis

Ainult nahale manustamiseks.

Eemaldada üks pipett pakendist. Hoida pipetti püstises asendis. Koputada pipeti kitsast osa, veendumaks, et selle sisu on pipeti suuremas osas. Murda pipeti ots mööda joont ära.

Lükata looma seljal abaluude vahel karv laiiali nii, et nahk oleks nähtaval. Asetada pipeti ots nahale ja suruge pipetti mitu korda õrnalt ühes või mitmes kohas, et tühjendada selle sisu nahale. Veenduge, et kogu ravim on nahale kantud. Suurtele koertele manustada 5 ml pipeti sisu 2 - 3 kohale, et vältida ravimi maha valgumist.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Kuue kuu jooksul kord kuus **3-kordse** soovitatava maksimumannuse manustamise järel täheldati mõnedel loomadest mõõdukaid neuroloogilisi nähte nagu kerged koordinatsioonihäired ja ebakindlus. Need nähud kadusid manustamisele järgnenud 3 tunni jooksul.

Ühel koeral kaheksast täheldati **5-kordse** soovitatava annuse korduva manustamise järel järgmisi mõõduvaid kõrvalnähte: treemor (värinad), ataksia (koordinatsioonihäired), hingeldus ja krambid. Need nähud kadusid manustamisele järgnenud 18 tunni jooksul.

Ühe korraga kümnekordse maksimumannuse manustamisel täheldati järgmisi kõrvalnähte: oksendamine, anoreksia (isukaotus), kehakaalu vähenemine, lihastreemor, krambid, tasakaaluhäired, raske hingamine. Kõik nähud lahenesid 48 tunni jooksul, välja arvatud isukaotus.

Ravimi üleannustamine põhjustab manustamise kohal karva muutumise kleepuvaks ja pulstunuks 24 tunniks.

Üleannustamise korral pöörduge oma loomaarsti poole.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasiitidevastane aine

ATCvet kood: QP53AX26

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Veterinaaravim on insektitsiidne ja akaritsiidne täpilahus, mis sisaldab toimeainena püriprooli.

Püriprool on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasoolide klassi. See toimib mõjutades ligandsõltuvaid kloriidikanaleid, eriti neid, mis on sõltuvad neuromediaator gammaaminovõihappest (GABA), blokeerides pre- ja postsünaptilise kloriidioonide ülekande läbi rakumembraani. Selle tagajärjeks on kirpude ja puukide kesknärvisüsteemi kontrollimatu tegevus ja surm. Koertel on kõrvaltoimed seotud aktiivse aine metaboliitidest põhjustatud neuroloogiliste sümptomitega.

Parasiidid surevad pigem otsese kontakti kui süsteemse kokkupuute tagajärjel. Püriprool tapab kirbud 24 tunni jooksul ja puugid (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*) 48 tunni jooksul.

Täiskasvanud kirbud surevad enne munemist vähemalt 4 nädala jooksul pärast ravi. Kuna see veterinaaravim kõrvaldab täielikult munade tootmise, katkestatakse sellega kirbu elutsükkel.

5.2. Farmakokineetilised andmed

Pärast püriprooli nahale manustamist koertele imendub see aeglaselt nahka, millele järgneb aine kahe peamise metaboliidi süsteemne toime.

Pärast nahale manustamist jaotub püriprool kiiresti koerte karvkattes ühe päeva jooksul pärast aine nahale kandmist. Ainete võib karvkattes leiduda kogu raviperioodi ajal.

Keskkonnaomadused

Püriprool võib olla ohtlik veeorganismidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Butüülhüdrosütolueen (E321)

Dietüleenglükoolmonoetüüleeter

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaaravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused

Säilitada pipette originaalpakendis valguse eest kaitstuna.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Täpilahuse pipeti pakend koosneb erekollasest polüpropüleenümbrisest ning helekollasest alumiiniumfooliumist pakendist, mis on kaetud polüetüleen-tereftalaatkilega. Pipett asub pehmes lapsekindlas alumiiniumfooliumist/PVCst blistris.

Pappkarp, milles on 1, 2 või 10 blistrit, igäühes omakorda 3 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Prac-tic ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/066/001-012

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18. 12. 2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16. 11. 2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Raviameti koduleheküljelt <http://www.ema.europa.eu/>.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

LISA II

- A. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA**
- B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**
- C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID**
- D. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE**

A. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Elanco France S.A.S.
26, Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Prantsusmaa

B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Käsimüügiravim.

C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

D. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Järgneva kolme aasta jooksul esitab müügiloa hoidja perioodilised uuendused (perioodilise ohutusuaruande) üks kord aastas ning seejärel kahe aasta pärast; edaspidi tuleb teated esitada iga kolme aasta järel.

III LISA
PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**PAPPKARP (56,25 mg)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Prac-tic 56,25 mg täpilahus väga väikestele koertele

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Prac-tic täpilahuse pipett sisaldab järgmist:

Annus	Püriprool
0,45 ml	56,25 mg

Abiained:

0,1% butüülhüdrosütolueen (E321)

3. RAVIMVORM

Täpilahus välispidiseks kasutamiseks nahal.

4. PAKENDI SUURUS(ED)3 pipetti
6 pipetti
30 pipetti**5. LOOMALIIGID**

Koer (2 - 4,5 kg)

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbunakkuse ja puuginakkuse ravi ja profülaktika.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine välispidiselt nahale.

1. Eemaldada üks pipett pakendist.
2. Hoida pipetti püstises asendis. Koputada pipeti kitsast osa, veendumaks, et selle sisu on pipeti suuremas osas. Murda pipeti ots mööda joont ära.
3. Lükata looma seljal abaluude vahel karv laiali nii, et nahk oleks nähtaval.
4. Asetada pipeti ots nahale ja suruge pipetti mitu korda õrnalt ühes või mitmes kohas, et tühjendada selle sisu nahale. Veenduge, et kogu ravim on nahale kantud.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ohutusalaane teave inimestel:

Vältida ravimi sattumist nahale, silma ja suhu.

Vältige kokkupuudet ravi saanud loomaga, kuni ravimi manustamiskoht on ära kuivanud.

Ohutusalaane teave loomadel:

Ette nähtud kasutamiseks ainult koertel.

Mitte kasutada kassidel ja küülikutel.

Ärge manustage ravimit suukaudselt.

Vältige preparaadi sattumist koera silmadesse.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada pipette originaalpakendis valguse eest kaitstuna.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/066/001 (3 pipetti)
EU/2/06/066/002 (6 pipetti)
EU/2/06/066/003 (30 pipetti)

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

BLISTER (56,25 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic täpilahus koertele

Püriprool

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

56,25 mg

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

0,45 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine.

5. KEELUAEG

6. PARTII NUMBER

Lot {number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER – VÕI RIBAPAKENDIL

PIPETT (56,25 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 56,25 mg

Pyriprole

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Elanco

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

4. PARTII NUMBER

Lot {number}

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP (137,5 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 137,5 mg täpilahust väikestele koertele

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Prac-tic täpilahuse pipett sisaldab järgmist:

Annus	Püriprool
1,1 ml	137,5 mg

Abiained:

0,1% butüülhüdrosütolueen (E321)

3. RAVIMVORM

Täpilahus välispidiseks kasutamiseks nahal.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

3 pipetti
6 pipetti
30 pipetti

5. LOOMALIIGID

Koer (> 4,5 - 11 kg)

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbunakkuse ja puuginakkuse ravi ja profülaktika.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine välispidiselt nahale.

1. Eemaldada üks pipett pakendist.
2. Hoida pipetti püstises asendis. Koputada pipeti kitsast osa, veendumaks, et selle sisu on pipeti suuremas osas. Murda pipeti ots mööda joont ära.
3. Lükata looma seljal abaluude vahel karv laiali nii, et nahk oleks nähtaval.
4. Asetada pipeti ots nahale ja suruge pipetti mitu korda õrnalt ühes või mitmes kohas, et tühjendada selle sisu nahale. Veenduge, et kogu ravim on nahale kantud.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

9 ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ohutusalaane teave inimestel:

Vältida ravimi sattumist nahale, silma ja suhu.

Vältige kokkupuudet ravi saanud loomaga, kuni ravimi manustamiskoht on ära kuivanud.

Ohutusalaane teave loomadel:

Ette nähtud kasutamiseks ainult koertel.

Mitte kasutada kassidel ja küülikutel.

Ärge manustage ravimit suukaudselt.

Vältige preparaadi sattumist koera silmadesse.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada pipette originaalpakendis valguse eest kaitstuna.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/066/004 (3 pipetti)
EU/2/06/066/005 (6 pipetti)
EU/2/06/066/006 (30 pipetti)

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

BLISTER (137,5 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic täpilahus koertele

Püriprool

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

137,5 mg

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1,1 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine.

5. KEELUAEG

6. PARTII NUMBER

Lot {number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER – VÕI RIBAPAKENDIL

PIPETT (137,5 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 137,5 mg

Pyriprole

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Elanco

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

4. PARTII NUMBER

Lot {number}

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**PAPPKARP (275 mg)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Prac-tic 275 mg täpilahus keskmist kasvu koertele

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Prac-tic täpilahuse pipett sisaldab järgmist:

Annus	Püriprool
2,2 ml	275 mg

Abiained:

0,1% butüülhüdrosütolueen (E321)

3. RAVIMVORM

Täpilahus välispidiseks kasutamiseks nahal.

4. PAKENDI SUURUS(ED)3 pipetti
6 pipetti
30 pipetti**5. LOOMALIIGID**

Koer (> 11 - 22 kg)

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbunakkuse ja puuginakkuse ravi ja profülaktika.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine välispidiselt nahale.

1. Eemaldada üks pipett pakendist.
2. Hoida pipetti püstises asendis. Koputada pipeti kitsast osa, veendumaks, et selle sisu on pipeti suuremas osas. Murda pipeti ots mööda joont ära.
3. Lükata looma seljal abaluude vahel karv laiali nii, et nahk oleks nähtaval.
4. Asetada pipeti ots nahale ja suruge pipetti mitu korda õrnalt ühes või mitmes kohas, et tühjendada selle sisu nahale. Veenduge, et kogu ravim on nahale kantud.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ohutusalane teave inimestel:

Vältida ravimi sattumist nahale, silma ja suhu.

Vältige kokkupuudet ravi saanud loomaga, kuni ravimi manustamiskoht on ära kuivanud.

Ohutusalane teave loomadel:

Ette nähtud kasutamiseks ainult koertel.

Mitte kasutada kassidel ja küülikutel.

Ärge manustage ravimit suukaudselt.

Vältige preparaadi sattumist koera silmadesse.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada pipette originaalpakendis valguse eest kaitstuna.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/066/007 (3 pipetti)
EU/2/06/066/008 (6 pipetti)
EU/2/06/066/009 (30 pipetti)

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

BLISTER (275 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic täpilahus koertele

Püriprool

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

275 mg

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

2,2 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine.

5. KEELUAEG

6. PARTII NUMBER

Lot {number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD BLISTER – VÕI RIBAPAKENDIL

PIPETT (275 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 275 mg

Pyriprole

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Elanco

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

4. PARTII NUMBER

Lot {number}

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**PAPPKARP (625 mg)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Prac-tic 625 mg täpilahus suurtele koertele

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Prac-tic täpilahuse pipett sisaldab järgmist:

Annus	Püriprool
5,0 ml	625 mg

Abiained:

0,1% butüülhüdrosütolueen (E321)

3. RAVIMVORM

Täpilahus välispidiseks kasutamiseks nahal.

4. PAKENDI SUURUS(ED)3 pipetti
6 pipetti
30 pipetti**5. LOOMALIIGID**

Koer (> 22 - 50 kg)

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbunakkuse ja puuginakkuse ravi ja profülaktika.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Täppmanustamine välispidiselt nahale.

1. Eemaldada üks pipett pakendist.
2. Hoida pipetti püstises asendis. Koputada pipeti kitsast osa, veendumaks, et selle sisu on pipeti suuremas osas. Murda pipeti ots mööda joont ära.
3. Lükata looma seljal abaluude vahel karv laiuli nii, et nahk oleks nähtaval.
4. Asetada pipeti ots nahale ja suruge pipetti mitu korda õrnalt 2 - 3 kohale, et vältida ravimi maha valgumist. Veenduge, et kogu ravim on nahale kantud.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ohutusalaane teave inimestel:

Vältida ravimi sattumist nahale, silma ja suhu.

Vältige kokkupuudet ravi saanud loomaga, kuni ravimi manustamiskoht on ära kuivanud.

Ohutusalaane teave loomadel:

Ette nähtud kasutamiseks ainult koertel.

Mitte kasutada kassidel ja küülikutel.

Ärge manustage ravimit suukaudselt.

Vältige preparaadi sattumist koera silmadesse.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada pipette originaalpakendis valguse eest kaitstuna.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/066/010 (3 pipetti)
EU/2/06/066/011 (6 pipetti)
EU/2/06/066/012 (30 pipetti)

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

BLISTER (625 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic täpilahus koertele

Püriprool

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

625 mg

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

5,0 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine.

5. KEELUAEG

6. PARTII NUMBER

Lot {number}

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER – VÕI RIBAPAKENDIL

PIPETT (625 mg)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 625 mg

Pyriprole

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Elanco

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

4. PARTII NUMBER

Lot {number}

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Prac-tic täpilahus koertele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja:

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Elanco France S.A.S.
26, Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Prantsusmaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Prac-tic 56,25 mg täpilahus väga väikestele koertele

Prac-tic 137,5 mg täpilahus väikestele koertele

Prac-tic 275 mg täpilahus keskmist kasvu koertele

Prac-tic 625 mg täpilahus suurtele koertele

Püriprool

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab 125 mg püriprooli värvitu kuni kollase läbipaistva lahuseana, mis on ette nähtud välispidiseks kasutamiseks nahal.

Ühe pipetiga manustatakse:

	Annus	Püriprool
Prac-tic väga väikestele koertele	0,45 ml	56,25 mg
Prac-tic väikestele koertele	1,1 ml	137,5 mg
Prac-tic keskmist kasvu koertele	2,2 ml	275 mg
Prac-tic suurtele koertele	5,0 ml	625 mg

Lahus sisaldab ka 0,1% butüülhüdrosütolueeni (E321).

4. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbunakkuse (*Ctenocephalides canis* ja *C. felis*) ravi ja profülaktika koertel.

Puuginakkuse (*Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*) ravi ja profülaktika koertel.

Kirbunakkuse ravi ja profülaktika koertel: Prac-tic hoiab ära edasise kirbunakkuse vähemalt 4 nädala jooksul.

Puuginakkuse ravi ja profülaktika koertel: Prac-tic'i puugivastane toime kestab 4 nädalat.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 8 nädala vanustel kutsikatel või vähem kui 2 kg kaaluvatel koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust fenüülpirasooli klassi komponentide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada haigetel loomadel ega haigusest paranevatel loomadel.

See veterinaarravim on valmistatud spetsiaalselt koertele.

Mitte kasutada seda kassidel, kuna on üledoseerimise oht.

Mitte kasutada küülikutel.

6. KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel on täheldatud järgmisi toimeid:

- manustamiskoha ja naha reaktsioonid: pruuritus (sügelev nahk), karvamuutus, dermatiit (nahapõletik), erüteem (naha punetus), alopeetsia (karvade väljalangemine), karva värvi muutus ja karva muutumine rasvaseks;
- neuroloogilised reaktsioonid: ataksia (koordinatsioonihäired) ja krambid;
- süsteemsed reaktsioonid: letargia (uimasus);
- seedetrakti reaktsioonid: emees (oksendamine) ja kõhulahtisus.

Need nähud on tavaliselt mööduvad ja kaovad 24 tunni jooksul pärast ravimi manustamist; kui need kestavad kauem, pidage nõu veterinaariga.

Kui koer ennast kohe pärast ravimi manustamist lakub, võib sellele järgneda lühike hüpersalivatsiooni (liigse süljeerituse) periood. See ei ole mürgistusnäht ning kaob minutite jooksul ravi vajamata. Ravimi õige pealekandmine vähendab manustamiskoha lakkumist koera poolt.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Koer.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Täppmanustamine välispidiselt koera nahale.

Annustamise tabel

Soovituslik miinimumannus on 12,5 mg püriprooli ühe kilogrammi kehamassi kohta, mis vastab 0,1 ml täpilahust ühe kilogrammi kehamassi kohta.

Koera kehakaalu vahemik	Kasutatava pipeti suurus	Üks pipetitüis 12,5% (w/v) lahust sisaldab (ml)	Püriprool (mg/kg kehamassi kohta)
2 - 4,5 kg	Väga väikesed koerad	0,45	12,5 - 28,1
> 4,5 - 11 kg	Väikesed koerad	1,1	12,5 - 30,6
> 11 - 22 kg	Keskmi kasvukoe koerad	2,2	12,5 - 25,0
> 22 - 50 kg	Suured koerad	5,0	12,5 - 28,4
Üle 50 kg	Õige annuse saamiseks kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.		

Iga kaaluvahemiku puhul tuleb õige suurusega pipeti kogu sisu kanda koera nahale.

Kirbunakkuse ravi ja profülaktika

Püriprool tapab kirbud 24 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist. Ühekordne manustamine hoiab ära kirbunakkuse 4 nädalaks.

Puuginakkuse ravi ja profülaktika

Püriprool tapab puugid 48 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist. Ühekordse manustamise puugivastane toime kestab 4 nädalat.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ainult nahale manustamiseks.

Eemaldada üks pipett pakendist. Hoida pipetti püstises asendis. Koputada pipeti kitsast osa, veendumaks, et selle sisu on pipeti suuremas osas. Murda pipeti ots mööda joont ära.

Lükata looma seljal abaluude vahel karv laiuli nii, et nahk oleks nähtaval. Asetada pipeti ots nahale ja suruge pipetti mitu korda õrnalt ühes või mitmes kohas, et tühjendada selle sisu nahale. Veenduge, et kogu ravim on nahale kantud. Suurtele koertele manustada 5 ml pipeti sisu 2 - 3 kohale, et vältida ravimi maha valgumist.

Enne ravi teostamist tuleb koerad täpselt üle kaaluda, et valida raviks õige suurusega pipett.

10. KEELUAEG

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikusaega, mis on märgitud pipett pärast "Kõlblik kuni".

Säilitada pipette originaalpakendis valguse eest kaitstuna.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimestel, kellel esineb ülitundlikkust feniülpüraasooli klassi komponentide või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes, tuleks vältida kontakti preparaadiga.

Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Pärast kasutamist pesta käed ning eemaldada seebi ja veega ka mujale nahale sattunud ravim. Kui preparaat satub kogemata silma, loputage silmi hoolikalt veega. Silmaärrituse püsimisel pöörduge abi saamiseks arsti poole ning näidake talle pakendi infolehte või etiketti.

Kui preparaat satub nahale või limaskestale, võib see põhjustada kokkupuute kohas tuimust ja ärritust, kuid need nähud paranevad tavaliselt iseneslikult.

Kui Teie või keegi teine on kogemata seda preparaati alla neelanud, pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole ja näidake oma arstile käesolevat infolehte või ravimi pakendi märgistust.

Preparaadi manustamise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua.

Ettevaatusabinõuna tuleks ravialuste koertega vältida otsekontakti ning lastel ei tohiks lasta ravialuste koertega mängida kuni manustamiskoht on kuivanud. Seetõttu on soovitatav koeri ravida õhtul. Äsja ravitud koeri ei tohi lasta magada omanike ning eriti laste voodites.

See veterinaarravim on ette nähtud puukide ja karpude vastu. Ravimit tuleks manustada ühe majapidamise kõigile koertele samaaegselt.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravi tulemusena langevad puugid 24 kuni 48 tunni jooksul pärast loomaga kokkupuutumist koera küljest maha, üksikud puugid võivad loomale siiski jääda. Seetõttu ei saa täielikult välistada puukidega levivaid nakkushaigusi.

Raskekujulise kirbunakkuse korral tuleks enne ravi koera ümbritsevat keskkonda tolmuimejaga puhastada ja sobiva insektitsiidiga töödelda.

Tarvitada ainult nahapinnal ja terve naha peal.

Preparaati tohib manustada ainult koera nahale, seda ei tohi panna koera suhu. Olge ettevaatlik, et veterinaarravim ei satuks koerale silma.

Konsulteerige veterinaariga, kui kavatsete ravimit kasutada koertel, kes saavad raviks teisi preparaate/ravimeid.

Ärge manustage preparaati suu kaudu (see võib põhjustada ravimi üleannustamise) ega mis tahes muul manustamisviisil.

Ravimi ohutus tõukoertel, sh tiinetel ja lakteerivatel koertel ei ole tõestatud. Kui te arvate, et teie koer võib olla tiine või kui emasloom imetab kutsikaid või kui te soovite ravida tõukoera, pidage enne ravimi kasutamist nõu veterinaariga.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Mõnedel loomadel, kes olid saanud ravi üks kord kuus, täheldati kergeid neuroloogilisi nähte, nt kergeid koordinatsiooni- ja tasakaaluhäireid. Need nähud kadusid 3 tunni jooksul pärast ravimi manustamist.

Ühel koeral 8-st täheldati järgmisi mööduvaid kõrvaltoimeid: treemor (värinad), ataksia (koordinatsioonihäire), hingeldus ja krambid. Need nähud kadusid 18 tunni jooksul pärast ravimi manustamist.

Ühel juhul täheldati üleannustamise järgselt järgmisi kõrvaltoimeid: oksendamine, anoreksia (isukaotus), kehakaalu vähenemine, lihastreemor, krambid, tasakaaluhäired, raske hingamine. Kõik nähud lahenesid 48 tunni jooksul, välja arvatud isukaotus.

Preparaadi üleannustamine võib põhjustada karva muutumist kleepuvaks ja pulstunuks ravimi manustamiskohal kuni 24 tunniks.

Üleannustamise korral pöörduge oma veterinaari poole.

Oluline on manustada ravim kohta, kust teie koer ei saaks seda ära lakkuda. Kindlustada, et loomad ei lakuks üksteist pärast ravimi manustamist.

Koeri ei tohiks kuni 48 tundi enne ravi alustamist vannitada ega šampooniga pesta. Kui teie koer satub 24 tunni jooksul pärast ravi teostamist vette või teda šampoonitatakse, väheneb preparaadi mõju. Kui Te soovite oma koera pesta, jätke ravi ja pesemise vahele vähemalt üks päev.

Püüdke preparaadi manustamisel vältida koera karva märjaks saamist, see võib tuua kaasa karva muutumise kleepuvaks ja pulstunuks. Kui see siiski juhtub, paraneb olukord 24 tunni jooksul.

Prac-tic koostisse kuuluv lahusti võib muuta teatud materjalide värvust, sh nahk, tekstiilid, plastmassid ja viimistletud pinnad. Laske ravimi manustamiskohal täielikult kuivada, enne kui see puutub kokku selliste materjalidega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Prac-tic ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt <http://www.ema.europa.eu/>.

15. LISAINFO

Täiskasvanud kirbud surevad enne munemist vähemalt 4 nädala jooksul pärast ravi. Kuna Prac-tic kõrvaldab täielikult munade tootmise, katkestatakse sellega kirbu elutsükkel.

Pappkarp, milles on 1, 2 või 10 blistrit, igaihes omakorda 3 pipetti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.