

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Orbenin 1000 mg – Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder (trockenstehende Milchkühe)

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder Euterinjektor mit 6 g enthält:

Wirkstoff:

Cloxacillin-Benzathin (2 : 1) 1,28 g
(entspricht Cloxacillin 1,00 g)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

24 Injektoren zu je 6 g

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (trockenstehende Milchkühe).

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramammären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 21 Tage.

Milch:

- 5 Tage nach Beginn der Laktation bei trockenstehenden Kühen, die früher als 42 Tage vor dem Geburtstermin behandelt werden.
- 47 Tage nach der Anwendung an trockenstehenden Tieren, die innerhalb von 42 Tagen vor dem Geburtstermin behandelt werden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 8-00329

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Injektor****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Orbenin 1000 mg – Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder (trockenstehende Milchkühe)

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Cloxacillin-Benzathin (2 : 1)	1,28 g
entspricht Cloxacillin	1,00 g

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}