

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR - COMBINED LABEL AND PACKAGE LEAFLET**

**ETUI DU CONDITIONNEMENT DU FLACON DE 125 ML**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

ABCEDYL GA, SOLUTION BUVABLE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

**COMPOSITION**

Pyrogenium .....	7 CH
Hepar sulfur.....	7 CH
Silicea .....	7 CH
Calcarea sulfurica.....	7 CH
Echinacea angustifolia.....	3 CH
Belladonna.....	5 CH
Myristica sebifera .....	3 CH aa

Excipient :

Ethanol à 15 % (v/v) QSP ..... 1 mL

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

Flacon de 125 mL

**Boîte de 1 flacon de 125 mL et de 1 pipette graduée**

**4. ESPÈCES CIBLES**

**ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, lapins et volailles.

**5. INDICATIONS**

Affections cutanées suppuratives.

**INDICATIONS D'UTILISATION**

**Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les lapins et les volailles :** Médicament homéopathique traditionnellement utilisé en présence d'affections cutanées suppuratives.

**6. CONTRE-INDICATIONS**

Sans objet.

**7. MISES EN GARDES PARTICULIERES**

**UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION**

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

## **8. EFFETS INDESIRABLES**

Sans objet.

## **9. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION**

### **POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

#### **Voie orale.**

5 mL 2 à 3 fois par jour jusqu'à disparition des signes. Administrer soit directement dans la bouche de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 mL par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

## **10. INDICATIONS NÉCESSAIRES À UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Sans objet.

## **11. TEMPS D'ATTENTE**

### **TEMPS D'ATTENTE**

Zéro jour.

## **12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

### **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

## **13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ELIMINATION**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## **14. CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES**

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance.

## **15. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET PRÉSENTATIONS**

AMM n° FR/V/2653261 5/2012

## **16. DATE DU DERNIER ÉTIQUETAGE APPROUVÉ**

<{MM/YYYY}>

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données *Union Product Database* (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**17. COORDONNÉES**

**Titulaire / Exploitant / Fabricant :**

**BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

France

Tél. pour la France Métropolitaine :

0 810 809 810 (Service 0,05€ / min + prix appel)

**18. AUTRES INFORMATIONS****PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

GTIN {numéro}

**19. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIREUNIQUEMENT »»**

**Médicament homéopathique.**

**Usage vétérinaire.**

**20. DATE DE PÉREMPCTION**

EXP {mm/aaaa}

**21. NUMÉRO DU LOT**

LOT {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****ETIQUETTE FLACON 125 ML****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

ABCEDYL GA, SOLUTION BUVABLE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES****COMPOSITION**

Pyrogenium .....	7 CH
Hepar sulfur.....	7 CH
Silicea .....	7 CH
Calcarea sulfurica .....	7 CH
Echinacea angustifolia.....	3 CH
Belladonna.....	5 CH
Myristica sebifera.....	3 CH aa

Excipient :

Ethanol à 15 % (v/v) QSP ..... 1 mL

**3. ESPÈCES CIBLES****ESPECES CIBLES**

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, lapins et volailles.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION****POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION****Voie orale.**

5 mL 2 à 3 fois par jour jusqu'à disparition des signes. Administrer soit directement dans la bouche de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 mL par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

**5. TEMPS D'ATTENTE****TEMPS D'ATTENTE**

Zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTE**

EXP {mm/aaaa}

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ****Titulaire / Exploitant : BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

**9. NUMÉRO DU LOT**

LOT {numéro}

**10. AUTRES MENTIONS****INDICATIONS D'UTILISATION**

**Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les lapins et les volailles** : Médicament homéopathique traditionnellement utilisé en présence d'affections cutanées suppuratives.

Affections cutanées suppuratives

**PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

**UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION**

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.**

**Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.**

AMM n° FR/V/2653261 5/2012

Flacon de 125 ml

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****ETIQUETTE FLACON 1 L****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

ABCEDYL GA, SOLUTION BUVABLE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES****COMPOSITION**

Pyrogenium 7 CH, Hepar sulfur 7 CH, Silicea 7 CH, Calcarea sulfurica 7 CH, Echinacea angustifolia 3 CH, Belladonna 5 CH, Myristica sebifera 3 CH aa

Excipient : éthanol à 15 % (v/v) QSP 1 mL

**3. ESPÈCES CIBLES****ESPECES CIBLES**

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, lapins et volailles.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION****POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION****Voie orale.**

5 mL 2 à 3 fois par jour jusqu'à disparition des signes. Administrer soit directement dans la bouche de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 mL par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

**5. TEMPS D'ATTENTE****TEMPS D'ATTENTE**

Zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP {mm/aaaa}

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ****Titulaire / Exploitant / Fabricant : BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

Tél. pour la France Métropolitaine : 0 810 809 810

(Service 0,05€ / min + prix appel)

**9. NUMÉRO DU LOT**

LOT {numéro}

## **10. AUTRES MENTIONS**

Flacon de 1 L avec bouchon doseur

### **INDICATIONS D'UTILISATION**

**Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les lapins et les volailles :**

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé en présence d'affections cutanées suppuratives.

### **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

AMM n° FR/V/2653261 5/2012

GTIN {numéro}

Affections cutanées suppuratives.

Flacon de 1 L

### **UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION**

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.**

**Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.**