

[Version 9.1, 11/2024]

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Alphafluben, 44 mg/ml, geriamasis gelis šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviena ml yra:

veikliosios medžiagos:

flubendazolo 44 mg,

pagalbinių medžiagų:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis	Kiekybinė sudėtis, jei ta informacija būtina siekiant tinkamai naudoti veterinarinį vaistą
Metilo parahidroksibenzoatas (E218)	
Propilo parahidroksibenzoatas	
Glicerolis (85 %) (E422)	
Karbomeras	
Natrio hidroksidas (reguluoti pH)	
Išgrynintas vanduo	

Balta ar beveik balta bekvapė suspensija geliui.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Antihelmintikas šunims, užsikrėtusiems apvaliosiomis kirmėlėmis, ankilostomomis ar plaukagalviais, gydyti.

Apvaliosios kirmėlės: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*.

Ankilostomos: *Ancylostoma caninum*.

Plaukagalviai: *Trichuris vulpis*.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

3.4. Specialieji įspėjimai

Būtina vengti toliau išvardintų veiksmų, nes jie didina atsparumo išsivystymo riziką ir gydymas gali būti neveiksmingas:

- per dažnai ir pakartotinai naudoti tos pačios klasės antihelmintikus ilgą laiką;
- naudoti per mažomis dozėmis dėl neteisingai nustatyto kūno svorio arba netinkamo veterinarinio vaisto naudojimo.

Sprendimas naudoti šį veterinarinį vaistą turi būti pagrįstas parazitų rūšies ir užsikrėtimo sunkumo patvirtinimu arba užsikrėtimo rizikos, atsižvelgiant į epidemiologines savybes, įvertinimu kiekvienam gyvūnui atskirai.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Dėl pernelyg dažno ir pakartotinio tos pačios klasės antihelmin tikų naudojimo parazitai gali tapti atsparūs tos klasės antihelmin tikams.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šis veterinarinis vaistas gali sukelti alergines reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas flubendazolui ar pagalbinėms medžiagoms metilo parahidroksibenzoatui ir propilo parahidroksibenzoatui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Šis veterinarinis vaistas gali šiek tiek dirginti akis ir odą. Reikia vengti tiesioginio vaisto sąlyčio su oda. Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu švaraus vandens.

Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys neturėtų dirbti su šiuo veterinariniu vaistu.

Nurytas šis veterinarinis vaistas gali būti kenksmingas, ypač vaikams. Būtina vengti atsitiktinio veterinarinio vaisto nuri jimo. Negalima palikti švirkšto vaikams matomoje ir pasiekiamoje vietoje. Kad vaikai negalėtų pasiekti panaudotų švirkštų, po naudojimo švirkštą reikia laikyti originalioje pakuotėje. Atsitiktinai nuri jus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Papildomi įspėjimai, šio veterinarinio vaisto dedant į ėdalą
Reikia užtikrinti, kad vaikai negalėtų pasiekti šuns ėdalo su vaistu. Kad vaikai negalėtų pasiekti šuns ėdalo su vaistu, reikia užpilti vaisto ant nedidelio kiekio ėdalo ir palaukti, kol gyvūnas jį visą suės, tada sudėti likusį ėdalą. Vaistą reikia suduoti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Visą nesuėstą ėdalą su vaistu būtina nedelsiant pašalinti ir kruopščiai išplauti dubenėlį. Panaudojus vaistą ir išplovus užterštą dubenėlį, būtina nusiplauti rankas.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Šunys:

Labai reta (< 1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Vėmimas ¹ .
--	------------------------

¹ Trumpalaikis

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba jo vietiniam atstovui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas ir laktacija

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis nustatytas teratogeninis ir fetotoksinis poveikis naudojant dideles dozes. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Rekomenduojama dozė:

22 mg flubendazolo viename kg kūno svorio; viename 7,5 ml švirkšte yra 330 mg flubendazolo.

Naudojimas:


1 ml gelio 2 kg kūno svorio, vieną kartą per dieną, tris dienas iš eilės.

Vienas švirkštas skirtas šuniui iki 15 kg.

Naudojimo būdas

Gelį galima naudoti taip:

- tiksli dozė turi būti užšvirkščiama tiesiai ant šuns liežuvio;
- tiksli dozė turi būti įmaišyta į šuns ėdalą (rekomenduojama, jei šio agresyvus ir jį sudėtinga gydyti).



Nuimti apsauginį dangtelį (3). Pasukti žiedą (2) prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsidurs ties dozavimo stūmoklio (1) žyma, atitinkančia gyvūno kūno svorį kilogramais. Šią dozę gyvūnui reikia suduoti. Kito gydymo metu gyvūno kūno svorį reikia pridėti prie skaičiaus, ties kuriuo anksčiau buvo nustatytas žiedas (2), tada žiedą reikia pasukti iki naujos žymos ir suduoti atitinkamą dozę.

Pavyzdys: 3 kg sveriančiam šuniui pirmo gydymo metu žiedas nustatomas ties 3 kg žyma, antro gydymo metu – ties 6 kg, o trečio – ties 9 kg žyma.

Gydymo rekomendacijos

Šunys:

- šuniukai: 1–2 sav. amžiaus,
- jauni šunys (iki 12 mėn. amžiaus): kas 2–3 mėn.,
- vaikingos kalės: rujos metu, 10 dienų prieš ir 10 dienų po atsivedimo,
- suaugę šunys: kas 3–4 mėn., atsižvelgiant į vietos reikalavimus,
- visiems šunims: prieš vakcinaciją.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Šis veterinarinis vaistas pasižymi plačiomis terapinio saugumo ribomis. Penkis kartus didesnė nei rekomenduojama dozė nepalankių reakcijų nesukelia.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinų ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Netaikytina.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QP52AC12

4.2. Farmakodinamika

Flubendazolas yra sintetinis antihelminitikas, priklausantis benzimidazolo karbamatų grupei. Flubendazolas prisijungia prie parazitų mikrovamzdelių tubulino ir blokuoja tubulino molekulių polimerizaciją. Šie pokyčiai vyksta gana greitai ir daugiausia stebimi tikslinėse, tiesiogiai paveiktose parazito ląstelėse, tuo tarpu šeimininko ląstelėse jų nepastebima.. Flubendazolas blokuoja ląstelių funkcijas, sumažina maistinių medžiagų absorbciją ir virškinimą parazito virškinimo trakte, dėl to kaupiasi baltymus skaidantys fermentai, todėl parazitas žūva. Flubendazolas taip pat slopina parazitų kiaušinėlių vystymąsi ir dėjumą.

4.3. Farmakokinetika

Flubendazolas prastai absorbuojamas iš virškinimo trakto. Tai rodo didelis su išmatomis išskiriamo nepakitusio veterinarinio vaisto kiekis. Labai maža dalis ekstensyviai metabolizuojama kepenyse, vykstant hidrolizei ir redukcijai. Biotransformacijos produktai konjuguojami su gliukuronidais arba sulfato konjugatais ir nedideliais kiekiais pašalinami su tulžimi ir šlapimu. Su šlapimu pašalinamas kiekis yra santykinai mažas; jį sudaro beveik vien metabolitai ir tik nedidelis nepakitusio junginio kiekis.

Šunims sušėrus 10 mg/kg radioaktyviai ženklinto flubendazolo, maksimali nepakitusios medžiagos koncentracija plazmoje buvo mažesnė nei 10 ng/ml. Flubendazolo ir jo metabolitų pusinės eliminacijos laikas plazmoje yra 16 val. Sušėrus veterinarinio vaisto 22 mg/kg kūno svorio dozę, maksimali koncentracija plazmoje buvo apie 5 ng/ml.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 90 dienų.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar sušaldyti.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

7,5 ml gelio linijinio mažo tankio polietileno (LMTPE) plastikiniame geriamajame švirkšte su polistireniniu stūmokliu, kartoninėje dėžutėje.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

ALPHAVET Zrt.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/25/2898/001

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2025-08-26

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2026-01-29

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**Kartoninė dėžutė****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Alphafluben, 44 mg/ml, geriamasis gelis

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekviename ml yra:
veikliosios medžiagos:
flubendazolo 44 mg.

3. PAKUOTĖS DYDIS

7,5 ml

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Naudoti per burną.

7. IŠLAUKA**8. TINKAMUMO DATA**

Exp. {mėnuo/metai}
Atidarius sunaudoti per 90 dienų.
Atidarius sunaudoti iki....

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar sušaldyti.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

ALPHAVET Zrt.

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/25/2898/001

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Etiketė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Alphafluben

2. VEIKLIŲJŲ MEDŖIAGŲ KIEKYBINė INFORMACIJA

Flubendazolo 44 mg/ml

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti per 90 dienų.

Atidarius sunaudoti iki....

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Alphafluben, 44 mg/ml, geriamasis gelis šunims

2. Sudėtis

Kiekviename ml yra:

veikliosios medžiagos:

flubendazolo 44 mg,

pagalbinių medžiagų:

metilo parahidroksibenzoato (E218) 1,8 mg,

propilo parahidroksibenzoato 0,2 mg.

Balta ar beveik balta bekvapė suspensija geliui.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4. Naudojimo indikacijos

Antihelmintikas šunims, užsikrėtusiems apvaliosiomis kirmėlėmis, ankilostomomis ar plaukagalviais, gydyti.

Apvaliosios kirmėlės: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*.

Ankilostomos: *Ancylostoma caninum*.

Plaukagalviai: *Trichuris vulpis*.

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Būtina vengti toliau išvardintų veiksmų, nes jie didina atsparumo išsivystymo riziką ir gydymas gali būti neveiksmingas:

- per dažnai ir pakartotinai naudoti tos pačios klasės antihelmintikus ilgą laiką;
- naudoti per mažomis dozėmis dėl neteisingai nustatyto kūno svorio arba netinkamo veterinarinio vaisto naudojimo.

Sprendimas naudoti šį veterinarinį vaistą turi būti pagrįstas parazitų rūšies ir užsikrėtimo sunkumo patvirtinimu arba užsikrėtimo rizikos, atsižvelgiant į epidemiologines savybes, įvertinimu kiekvienam gyvūnui atskirai.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Dėl pernelyg dažno ir pakartotinio tos pačios klasės antihelmintikų naudojimo parazitai gali tapti atsparūs tos klasės antihelmintikams.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šis veterinarinis vaistas gali sukelti alergines reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas flubendazolui ar pagalbinėms medžiagoms metilo parahidroksibenzoatui ir propilo parahidroksibenzoatui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Šis veterinarinis vaistas gali šiek tiek dirginti akis ir odą. Reikia vengti tiesioginio vaisto sąlyčio su oda. Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu švaraus vandens.

Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys neturėtų dirbti su šiuo veterinariniu vaistu.

Nurytas šis veterinarinis vaistas gali būti kenksmingas, ypač vaikams. Būtina vengti atsitiktinio veterinarinio vaisto nurijimo. Negalima palikti švirkšto vaikams matomoje ir pasiekiamoje vietoje. Kad vaikai negalėtų pasiekti panaudotų švirkštų, po naudojimo švirkštą reikia laikyti originalioje pakuotėje. Atsitiktinai nurijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Papildomi įspėjimai, šio veterinarinio vaisto dedant į ėdalą

Reikia užtikrinti, kad vaikai negalėtų pasiekti šuns ėdalo su vaistu. Kad vaikai negalėtų pasiekti šuns ėdalo su vaistu, reikia užpilti vaisto ant nedidelio kiekio ėdalo ir palaukti, kol gyvūnas jį visą suės, tada sudėti likusį ėdalą. Vaistą reikia suduoti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Visą nesuėtą ėdalą su vaistu būtina nedelsiant pašalinti ir kruopščiai išplauti dubenėlį. Panaudojus vaistą ir išplovus užterštą dubenėlį, būtina nusiplauti rankas.

Specialiosios aplinkos apsaugos priemonės

Netaikytinos.

Vaikingumas ir laktacija

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis nustatytas teratogeninis ir fetotoksinis poveikis naudojant dideles dozes. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

Perdozavimas

Šis veterinarinis vaistas pasižymi plačiomis terapinio saugumo ribomis. Penkis kartus didesnė nei rekomenduojama dozė nepalankių reakcijų nesukelia.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Šunys:

Labai reta (< 1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Vėmimas ¹ .
--	------------------------

¹Trumpalaikis

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui arba jo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma: <https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Rekomenduojama dozė:

22 mg flubendazolo vienam kg kūno svorio; viename 7,5 ml švirkšte yra 330 mg flubendazolo.

Naudojimas:

1 ml gelio 2 kg kūno svorio, vieną kartą per dieną, tris dienas iš eilės.


Vienas švirkštas skirtas šuniui iki 15 kg.

Naudojimo būdas

Gelį galima naudoti taip:

- tiksli dozė turi būti užšvirkščijama tiesiai ant šuns liežuvio;
- tiksli dozė turi būti įmaišyta į šuns ėdalą (rekomenduojama, jei šio agresyvus ir jį sudėtinga gydyti).

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo



Nuimti apsauginį dangtelį (3). Pasukti žiedą (2) prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsidurs ties dozavimo stūmoklio (1) žyma, atitinkančia gyvūno kūno svorį kilogramais. Šią dozę gyvūnui reikia suduoti. Kito gydymo metu gyvūno kūno svorį reikia pridėti prie skaičiaus, ties kuriuo anksčiau buvo nustatytas žiedas (2), tada žiedą reikia pasukti iki naujos žymos ir suduoti atitinkamą dozę.

Pavyzdys: 3 kg sveriančiam šuniui pirmo gydymo metu žiedas nustatomas ties 3 kg žyma, antro gydymo metu – ties 6 kg, o trečio – ties 9 kg žyma.

Gydymo rekomendacijos

Šunys:

- šuniukai: 1–2 sav. amžiaus,
- jauni šunys (iki 12 mėn. amžiaus): kas 2–3 mėn.,
- vaikingos kalės: rujos metu, 10 dienų prieš ir 10 dienų po atsivedimo,
- suaugę šunys: kas 3–4 mėn., atsižvelgiant į vietos reikalavimus,
- visiems šunims: prieš vakcinaciją.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

10. Išlauka

Netaikytina.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės dėžutės po „Exp.“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 90 dienų.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/25/2898/001

7,5 ml gelio linijinio mažo tankio polietileno (LMTPE) plastikiniame geriamajame švirkšte su polistireniniu stūmokliu, kartoninėje dėžutėje.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2026-01-29

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

ALPHAVET Zrt., Hofherr Albert utca 42., H-1194 Budapest, Vengrija

Tel. +36 22534500

el. p. alpha-vet@alpha-vet.hu

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

ALPHAVET Zrt., Bábolna, Köves János utca 13, H-2943 Bábolna, Vengrija

17. Kita informacija