vetoquinol	**Nom du Produit : MEGECAT FR**
Crée par : M.MARQUES	**Référence Article :** 0922 A L
Date :	**Dimensions :** 160X120 mm
Visa :	**Couleur d'impression :** 1 COULEUR

281 U

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHEANT
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE
07/07/2022

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 6 comprimés
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

0922 A

vetoquinol

MEGECAT®

COMPRIMÉS

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS
VETOQUINOL S.A.
MAGNY VERNOIS
70200 LURE, France

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE
MEGECAT

LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)
Un comprimé de 70 mg contient :
Substance(s) active(s) :
Mégestrol..... 4,45 mg
(sous forme d'acétate)
(équivalant à 5 mg d'acétate de mégestrol)

INDICATION(S)
Chez les chattes :
- Prévention des chaleurs et interruption des chaleurs.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les femelles impubères, chez les femelles gestantes, chez les femelles sous imprégnation œstrogénique thérapeutique, en cas de pathologie(s) génitale(s), de tumeur(s) mammaire(s), d'insuffisance hépatique et chez les sujets diabétiques.

EFFETS INDÉSIRABLES
Après administration unique ou répétée du produit, l'apparition d'affections de l'appareil génital (hypertrophies, pyomètres et tumeurs utérines), d'affections de la mamelle (hypertrophies, tumeurs mammaires), ainsi que des cas de diabète sucré et de modifications du comportement (polyphagie, agressivité,

ou apathie), ont été très rarement rapportés.
En cas d'apparition d'effet(s) indésirable(s), cesser l'administration du médicament et contacter un vétérinaire.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :
- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 à 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux traités sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

ESPÈCE(S) CIBLE(S)
Chats.

POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie orale.
Le risque d'effet indésirable grave augmentant avec la durée de traitement, l'administration doit être limitée à une durée la plus courte possible. Le risque d'effet indésirable grave augmentant en cas de surdosage, l'animal doit être pesé avant prescription et la dose ajustée à son poids.
- Prévention des chaleurs :
1 mg d'acétate de mégestrol par kg de poids corporel en une administration tous les 15 jours, correspondant à 1 comprimé pour 5 kg de poids corporel.
- Interruption des chaleurs :
Traiter dès les premiers signes de chaleurs.
1 mg d'acétate de mégestrol par kg de poids corporel et par jour pendant 8 jours, correspondant à 1 comprimé pour 5 kg de poids corporel.

CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE
Afin de garantir un dosage correct, le poids corporel des animaux doit être déterminé aussi précisément que possible afin d'éviter un sous-dosage.

TEMPS D'ATTENTE
Sans objet.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)
Aucune.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :
En raison du risque d'effets indésirables graves, ce médicament doit être administré uniquement après une analyse bénéfice/risque réalisée par un vétérinaire.
Le risque d'effet indésirable grave augmentant avec la durée de traitement, l'administration doit être limitée à une durée la plus courte possible.
Le risque d'effet indésirable grave augmentant en cas de surdosage, l'animal doit être pesé avant prescription et la dose ajustée à son poids.
En cas d'administration trop tardive (au-delà du 3e jour du cycle après l'apparition des chaleurs), l'ovulation risque de ne pas être bloquée rendant possible une éventuelle gestation.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :
L'acétate de mégestrol est un progestatif de synthèse qui peut entrainer des effets indésirables sur le système reproducteur.
Des effets indésirables sur les enfants à naître ne peuvent pas être exclus.
Les femmes enceintes ou en âge de procréer doivent manipuler le médicament avec précaution.
En cas d'ingestion accidentelle, notamment par un enfant, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.
Se laver les mains après utilisation.

Gestation et lactation :
Ne pas administrer aux femelles en gestation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :
Voir la rubrique « Contre-indications »

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :
Le risque de développer les effets indésirables, mentionnés dans la rubrique « Effets indésirables (fréquence et gravité) », augmente en cas de surdosage.

vetoquinol **Nom du Produit : MEGECAT FR**	
Crée par : M.MARQUES	**Référence Article :** 0922 A L
Date :	**Dimensions :** 44X18X68mm
Visa :	**Couleurs d'impression :**

375 7740 124 NOIR 485 248