

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield 1,04 g vaistinis antkaklis dideliems šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename 65 cm ilgio (26 g) antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

deltametrino 1,04 g

pagalbinių medžiagų:

išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Vaistinis antkaklis.

Juodas antkaklis, išskiriantis baltus miltelius.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys

4.2 Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šis veterinarinis vaistas pasižymi:

- 16 savaičių trunkančiu žudomuoju poveikiu blusoms (*Ctenocephalides felis*);
- 6 mėnesius trunkančiu žudomuoju poveikiu erkėms (*Ixodes ricinus*);
- 5,5 mėnesio trunkančiu maitinimosi slopinamuoju ir žudomuoju poveikiu smėlinėms blusoms (*Phlebotomus perniciosus*).

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti jaunesniems kaip 7 sav. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti šunims, turintiems odos pažeidimų.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms. Deltametrinas yra kenksmingas katėms.

4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Kadangi antkaklio poveikis galutinai pasireiškia po savaitės, rekomenduojama užsegti antkaklį 1 savaitę iki galimo gyvūnų užsikrėtimo.

Paprastai erkės ir smėlinės blusos žūva ir nukrenta nuo antkaklį seginčio gyvūno atitinkamai per 48 ir 24 valandas, nes nebegali misti krauju. Negalima atmesti pavienių erkių įsisiurbimo ar smėlinių blusų įkandimo galimybės po gydymo. Todėl, esant nepalankioms sąlygoms, negalima visiškai atmesti infekcinių ligų perdavimo per erkes ar smėlines blusas.

Norint užtikrinti optimalią kontrolę, kad gyvūnai neužsikrėstų blusomis, rekomenduojama vienu metu gydyti visus šunis, laikomus tuose pačiuose namuose. Blusų dažnai gali būti gyvūnų krepšyje, guolyje, įprastose poilsio vietose, pvz., ant kilimų arba minkštų baldų. Jeigu blusų labai daug, kontrolės priemonių taikymo pradžioje šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu ir po to reguliariai valyti dulkių siurbliu..

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Atsiradus odos pažeidimų, reikia nusegti antkaklį ir palaukti, kol išnyks simptomai.

Gyvūnų maudymo ar prausimo šampūnu įtaka antkaklio veiksmingumo trukmei tirta nebuvo. Atsitiktinis sąlytis su vandeniu nesumažina antkaklio veiksmingumo.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos, įskaitant neurotoksinį poveikį. Produktą laikykite originalioje dėžutėje. Iki naudojimo antkaklį laikykite pakelyje. Dedant antkaklį negalima rūkyti, valgyti ar gerti. Negalima leisti mažiems vaikams žaisti su antkakliu arba dėti jo į burną. Antkaklio likučius ar nukirptus galiukus reikia nedelsiant išmesti..

Užsegus antkaklį, reikia kruopščiai nusiplauti rankas šaltu vandeniu.

Vengti ilgesnį laiką liesti antkaklį arba šunį, kuris dėvi šį antkaklį. Negalima leisti gyvūnų, seginčių antkaklį miegoti vienoje lovoje su šeimnininkais, o ypač vaikais..

Atsitiktinai prarijus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Jautriems žmonėms deltametrinas gali sukelti padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidintas jautrumas deltametrinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistiniu preparatu ir juo gydomu gyvūnu. Esant padidėjusio jautrumo reakcijoms, kreiptis medicininės pagalbos.

Kitos atsargumo priemonės

Deltametrinas yra toksiškas vandens organizmams. Negalima leisti šį antkaklį dėvintiems šunims plaukioti vandens telkiniuose.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Retais atvejais kaklo srityje ar bendrai ant odos pastebėtos vietinės reakcijos (niežulys, paraudimas, plaukų slinkimas). Labai retais atvejais taip pat pastebėti elgesio pakitimai (pvz., letargija ar hiperaktyvumas), paprastai susiję su odos sudirgimu.

Labai retais atvejais pastebėti virškinimo trakto sutrikimų požymiai, tokie kaip vėmimas, viduriavimas ar padidėjęs seilėtekis.

Labai retais atvejais pastebėti nervų ir raumenų sutrikimai, tokie kaip ataksija, raumenų drebulys. Nusegus antkaklį, minėti simptomai paprastai išnyksta per 48 val.

Pasireiškus bent vienam iš minėtų simptomų, antkaklį reikia nusegti ir kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimais nenustatytas poveikis vystymuisi ar embriotoksinis poveikis. Tačiau veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms kalėms nenustatytas. Todėl šį vaistą vaikingumo ir laktacijos metu galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti su kitomis ektoparaziticidinėmis medžiagomis (piretroidais, organofosfatais).

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Tik išoriniam naudojimui ant odos. Vieną antkaklį užsegti ant kaklo vienam gyvūnui. Antkaklį iš apsauginio pakelio reikia išimti tik prieš naudojimą. Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad nebūtų per laisvas ir kad neveržtų: tarp antkaklio ir kaklo turi likti dviejų pirštų pločio tarpas. Reikia nukirpti nereikalingą jo dalį, jei ji ilgesnė nei 5 cm. Būtina periodiškai patikrinti antkaklį ir sureguliuoti užveržimą paspaudžiant sagtį ir nustatant tinkamą padėtį.



4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Mažai tikėtina atveju, šuniui suėdus antkaklį, gali pasireikšti šie simptomai: nekoordinuoti judesiai, drebulys, seilėtekis, vėmimas, užpakalinių kojų stingimas. Šie simptomai paprastai išnyksta per 48 val.

Daugiau informacijos apie simptominių gydymą jums suteiks veterinarijos gydytojas.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos, insekticidai ir repelentai, piretrinai ir piretroidai

ATCvet kodas: QP53AC11.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Deltametrinas veikia vabzdžius ir erkes kontakto būdu. Veikimo mechanizmas pagrįstas ilgalaikiu vabzdžio nervų membranų natrio kanalų pralaidumo padidėjimu. Tai sukelia hiperaktyvumą, o po jo paralyžių (šoko efektą), drebulį ir parazito žūtį.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Deltametrinas nepertraukiamai išsiskiria iš antkaklio į šuns kailį. Veiklioji medžiaga iš tiesioginio kontakto vietos pasiskirsto po visą odos paviršių per lipidus ir patenka į kailį. Gyvūnas neabsorbuoja deltametrino sistemiškai.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Juodoji anglis,
epoksidintas sojų aliejus,
diizononiladipatas,
trifenilfosfatas,
polivinilchloridas,
kalcio stearatas,
cinko stearatas,
stearino rūgštis.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 30 mėn.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.
Pakelius laikyti kartoninėje dėžutėje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Pirminės pakuotės medžiaga:

PET / PE / aliumininis / polimerinis pakelis, kuriame yra vienas antkaklis.

Pakuotės dydžiai:

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 ar 2 vaikų neatidaromi pakeliai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Deltametrino negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

7. REGISTRUOTOJAS

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

Nyderlandai

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/18/2474/001-002

9. REGISTRAVIMO DATA

2018-07-02

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2018-06-29

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield 1,04 g vaistinis antkaklis dideliems šunims
Deltametrinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS)

Viename 26 g antkaklyje yra:
deltametrino 1,04 g.

3. VAISTO FORMA

Vaistinis antkaklis.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 antkaklis
2 antkakliai

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Šis veterinarinis vaistas pasižymi:

- 16 savaičių trunkančiu žudomuoju poveikiu blusoms (*Ctenocephalides felis*);
- 6 mėnesius trunkančiu žudomuoju poveikiu erkėms (*Ixodes ricinus*);
- 5,5 mėnesio trunkančiu maitinimosi slopinamuoju ir žudomuoju poveikiu smėlinėms blusoms (*Phlebotomus perniciosus*).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui ant odos.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Norint, kad nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu būtų apsaugoti vaikai, vaistą iki naudojimo laikyti originalioje pakuotėje. Negalima leisti gyvūnų, seginčių antkaklį miegoti vienoje lovoje su šeiminkais, ypač vaikais

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nyderlandai

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/18/2474/001
LT/2/18/2474/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
PAKELIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield antkaklis

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Deltametrinas 1,04 g

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 x 65 cm

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)



Naudoti *ant odos*

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}



[Pasirinktinai „Beaphar“ logotipas]

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS:

Canishield 1,04 g vaistinis antkaklis dideliems šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg 9
8102 EV Raalte
Nyderlandai

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield 1,04 g vaistinis antkaklis dideliems šunims
Deltametrinas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Juodas vaistinis antkaklis, išskiriantis baltus miltelius. Viename 65 cm ilgio (26 g) antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

deltametrino 1,04 g

4. INDIKACIJA (-OS)

Šis veterinarinis vaistas pasižymi:

- 16 savaičių trunkančiu žudomuoju poveikiu blusoms (*Ctenocephalides felis*);
- 6 mėnesius trunkančiu žudomuoju poveikiu erkėms (*Ixodes ricinus*);
- 5,5 mėnesio trunkančiu maitinimosi slopinamuoju ir žudomuoju poveikiu smėlinėms blusoms (*Phlebotomus perniciosus*).

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti jaunesniems kaip 7 sav. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti šunims, turintiems odos pažeidimų.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms. Deltametrinas yra kenksmingas katėms.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retais atvejais kaklo srityje ar bendrai ant odos pastebėtos vietinės reakcijos (niežulys, paraudimas, plaukų slinkimas). Labai retais atvejais taip pat pastebėti elgesio pakitimai (pvz., letargija ar hiperaktyvumas), paprastai susiję su odos sudirgimu.

Labai retais atvejais pastebėti virškinimo trakto sutrikimų požymiai, tokie kaip vėmimas, viduriavimas ar padidėjęs seilėtekis.

Labai retais atvejais pastebėti nervų ir raumenų sutrikimai, tokie kaip nekoordinuoti judesiai, raumenų drebulys. Nusegus antkaklį, minėti simptomai paprastai išnyksta per 48 val.

Pasireiškus bent vienam iš minėtų simptomų, antkaklį reikia nusegti ir kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Tik išoriniam naudojimui ant odos. Vieną antkaklį užsegti ant kaklo vienam gyvūnui.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO



Antkaklį iš apsauginio pakelio antkaklį reikia išimti tik prieš pat naudojimą. Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad nebūtų per laisvas ir kad neveržtų: tarp antkaklio ir kaklo turi likti dviejų pirštų pločio tarpas. Reikia nukirpti nereikalingą jo dalį, jei ji ilgesnė nei 5 cm. Būtina periodiškai patikrinti antkaklį ir sureguliuoti užveržimą paspaudžiant sagtį ir nustatant tinkamą padėtį.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės po < Tinka iki >. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.
Pakelį laikyti kartoninėje dėžutėje.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Kadangi antkaklio poveikis galutinai pasireiškia po savaitės, rekomenduojama užsegti antkaklį 1 savaitę prieš iki galimo gyvūnų užsikrėtimo.

Paprastai erkės ir smėlinės blusos žūva ir nukrenta nuo antkaklį seginčio gyvūno atitinkamai per 48 ir 24 valandas, nes nebegali misti krauju. Negalima atmesti pavienių erkių įsisiurbimo ar smėlinių musių įkandimo galimybės po gydymo. Todėl, esant nepalankioms sąlygoms, negalima visiškai atmesti infekcinių ligų perdavimo per erkes ar smėlines blusas.

Norint užtikrinti optimalią kontrolę, kad gyvūnai neužsikrėstų blusomis rekomenduojama vienu metu gydyti visus šunis, laikomus tuose pačiuose namuose. Blusų dažnai gali būti gyvūnų krepšyje, guolyje, įprastose poilsio vietose, pvz., ant kilimų arba minkštų baldų. Jeigu blusų labai daug, kontrolės priemonių taikymo pradžioje šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu ir po to reguliariai valyti dulkių siurbliu.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Atsiradus odos pažeidimų, reikia nusegti antkaklį ir palaukti, kol išnyks simptomai.
Gyvūnų maudymo ar prausimo šampūnu įtaka antkaklio veiksmingumo trukmei tirta nebuvo.
Atsitiktinis sąlytis su vandeniu nesumažina antkaklio veiksmingumo.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Atsitiktinai prarijus gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos, įskaitant neurotoksinį poveikį.
Vaistą laikyti originalioje dėžutėje. Iki naudojimo antkaklį laikyti pakelyje. Dedant antkaklį negalima rūkyti, valgyti ar gerti. Negalima leisti mažiems vaikams žaisti su antkakliu arba dėti jo į burną.
Antkaklio likučius ar nukirptus galiukus reikia nedelsiant išmesti.. Užsegus antkaklį, reikia kruopščiai nusiplauti rankas šaltu vandeniu.
Vengti ilgesnį laiką liesti antkaklį arba šunį, kuris dėvi šį antkaklį. Negalima leisti gyvūnų, seginčių antkaklį miegoti vienoje lovoje su šeiminkais, o ypač vaikais..
Atsitiktinai prarijus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Jautriems žmonėms deltametrinas gali sukelti padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidintas jautrumas deltametrinui, turi vengti kontakto su veterinariniu vaistiniu preparatu ir juo gydomu gyvūnu. Esant padidėjusio jautrumo reakcijoms, kreiptis medicininės pagalbos..

Kitos atsargumo priemonės

Deltametrinas yra toksiškas vandens organizmams. Negalima leisti šį antkaklį dėvintiems šunims plaukioti vandens telkiniuose.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimais nenustatytas poveikis vystymuisi ar embriotoksinis poveikis. Tačiau veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms kalėms nenustatytas. Todėl šį vaistą vaikingumo ir laktacijos metu galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Negalima naudoti su kitomis ektoparaziticidinėmis medžiagomis, kurių sudėtyje yra organofosfatų.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Mažai tikėtiniu atveju, šuniui suėdus antkaklį, gali pasireikšti šie simptomai: nekoordinuoti judesiai, drebulys, seilėtekis, vėmimas, užpakalinių kojų stingimas. Šie simptomai paprastai išnyksta per 48 val. Daugiau informacijos apie simptominių gydymą jums suteiks veterinarijos gydytojas.

Nesuderinamumai:

Netaikytina.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Vaisto negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

2018-06-29

15. KITA INFORMACIJA

Pakuotės dydžiai:

kartono dėžutė, kurioje yra 1 ar 2 antkakliai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.