

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

vnější obal všechny balení
vnitřní obal 250g, 1 kg, 5 kg

ESB₃ Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok
(Sulfaclozinum natrium monohydricum)

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Sulfaclozinum natricum monohydricum 300 mg
(odpovídá Sulfaclozinum báze 262,11 mg)

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro perorální roztok
Bílý až nažloutlý krystalický prášek.

VELIKOST BALENÍ

5 x 10 g, 250 g, 1 kg, 5 kg

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Brojleři a chovná jedinci kura domácího, krůty, králíci.

INDIKACE

Kokcidióza způsobená např. *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis-mivati*, *E. praecox*, dále *E. adenoides*, *E. meleagrimitis*.

Bakteriální onemocnění drůbeže a králíků vyvolané např. *Salmonella gallinarum*, *Pasteurella multocida*.

U drůbeže dále např. *Coryza contagiosa*, nekrotická enteritida.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorálně ve vodě.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kur domácí: maso: 16 dnů.

Krůta: maso: 28 dnů.

Králík: maso: 15 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 3 týdny

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin

Po 1. otevření spotřebujte do

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Uchovávat mimo dosah dětí.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/037/00-C

Šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**10 g Al folie**

ESB₃ Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok
(Sulfaclozinum natricum monohydricum)

MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Sulfaclozinum natricum monohydricum 300 mg
(odpovídá Sulfaclozinum báze 262,11 mg)

OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 g

CESTA PODÁNÍ

Perorálně ve vodě.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kur domácí: maso: 16 dnů.

Krůta: maso: 28 dnů.

Králík: maso: 15 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Šarže: {číslo}

EXP: {měsíc/rok}

Po prvním otevření spotřebujte do 3 týdnů.

Po rozpuštění v pitné vodě spotřebujte do 24 hodin.

Denně připravujte čerstvý roztok.

Pouze pro zvířata.