

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****50 / 100 / 250 ml Durchstechflasche aus Glas****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

TYLUCYL 200 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Tylosin..... 200 000 I.E./ml
(entsprechend etwa 200 mg)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

100 ml

250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre (i. m.) oder langsame intravenöse (i. v.) Anwendung (nur bei Rindern).

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 28 Tage

Milch: 108 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 16 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.
Nicht einfrieren.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
In der Originalverpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Vetoquinol GmbH
AT: Vetoquinol Österreich GmbH

14. ZULASSUNGNUMMERN

DE: 402211.00.00
AT: Z.Nr.: 836829

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Etikett der 50 ml Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

TYLUCYL 200 mg/ml



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Tylosin.....200 000 IE/ml
(entsprechend etwa 200 mg)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Etikett 100/250 ml Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

TYLUCYL 200 mg/ml

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Tylosin.....200 000 IE/ml
(entsprechend etwa 200 mg)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein



4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre (i. m.) oder langsame intravenöse (i. v.) Anwendung (nur bei Rindern).

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 28 Tage
Milch: 108 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 16 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.
Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
In der Originalverpackung aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Vetoquinol GmbH
AT: Vetoquinol Österreich GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}