

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boite contenant un flacon de 100 mL ou de 500 mL

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

MULTIMIN Solution injectable pour bovins

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient :

Zinc : 60 mg (équivalent à 74,68 mg d'oxyde de zinc)

Manganèse : 10 mg (équivalent à 20,92 mg de carbonate de manganèse)

Cuivre : 15 mg (équivalent à 26,09 mg de carbonate de cuivre)


Sélénium : 5 mg (équivalent à 10,95 mg de sélénite de sodium)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 mL

500 mL

4. ESPÈCES CIBLES



5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Uniquement pour injection sous-cutanée. Ne pas administrer par voie intramusculaire.

Posologie :

Bovins jusqu'à 1 an : 1 mL pour 50 kg

Bovins de 1 à 2 ans : 1 mL pour 75 kg

Bovins de plus de 2 ans : 1 mL pour 100 kg

Volume maximum par site d'injection : 7 mL.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : 28 jours.

Lait : zéro heures.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture utiliser dans les 28 jours. À utiliser avant le ...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Warburton Technology Limited

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V583733

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}


MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon de 100 mL et 500 mL****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

MULTIMIN Solution injectable pour bovins

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient :

Zinc : 60 mg (équivalent à 74,68 mg d'oxyde de zinc)
Manganèse : 10 mg (équivalent à 20,92 mg de carbonate de manganèse)
Cuivre : 15 mg (équivalent à 26,09 mg de carbonate de cuivre)
Sélénium : 5 mg (équivalent à 10,95 mg de sélénite de sodium)

3. ESPÈCES CIBLES**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Uniquement pour injection sous-cutanée. Ne pas administrer par voie intramusculaire.

Posologie :

Bovins jusqu'à 1 an : 1 mL pour 50 kg
Bovins de 1 à 2 ans : 1 mL pour 75 kg
Bovins de plus de 2 ans : 1 mL pour 100 kg

Volume maximum par site d'injection : 7 mL.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : 28 jours.

Lait : zéro heures.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture utiliser dans les 28 jours. À utiliser avant le ...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Warburton Technology Limited

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}