

## **KENNZEICHNUNG**

## **ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Karton mit**  
**2 DURCHSTECHFLASCHEN ZU 10 ml und**  
**20 und 25 DURCHSTECHFLASCHEN ZU 10 ml**

### **1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

GESTAVET OXI 10 IE/ml synthetisches Oxytocin - Injektionslösung

### **2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

**Wirkstoff:**

Synthetisches Oxytocin 10 IE

### **3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

2 x 10 ml

20 x 10 ml

25 x 10 ml

### **4. ZIELTIERART(EN)**

Sauen, Schafe (weiblich), Kühe, Hündinnen und Katzen (weiblich).

### **5. ANWENDUNGSGEBIETE**

### **6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskulär:

**Sauen und Schafe (weiblich):** 0,2 bis 1 ml/Tier (2 bis 10 IE/Tier).

**Kühe:** 1 bis 4 ml/Kuh (10 bis 40 IE /Kuh).

**Hündinnen:** 0,2 bis 1 ml/Hund (2 bis 10 IE /Hund).

**Katze (weiblich):** 0,2 bis 0,5 ml/Katze (2 bis 5 IE /Katze).

Intravenös:

**Sauen und Schafe (weiblich):** 0,05 bis 0,25 ml/Tier (0,5 bis 2,5 IE /Tier).

**Kühe:** 0,25 bis 1 ml/Kuh (2,5 bis 10 IE /Kuh).

**Hündinnen:** 0,05 bis 0,25 ml/Hund (0,5 bis 2,5 IE /Hund).

**Katze (weiblich):** 0,05 bis 0,125 ml/Katze (0,5 bis 1,25 IE /Katze).

Intravenöse Injektionen sollten langsam in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser für Injektionszwecke verabreicht werden.

Es wird eine niedrige Anfangsdosis empfohlen, die nur erhöht werden sollte, wenn keine Wirkung beobachtet wird.

Falls erforderlich, kann die Anwendung alle 30 Minuten wiederholt werden.

### **7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 12 Stunden.

Milch: 12 Stunden.

### **8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

### **9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN,,**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.

**14. ZULASSUNGSNR.**

8-00541

**17. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot. {Nummer}

## **ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Karton mit 1 FLASCHE ZU 50 ml**

### **1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

GESTAVET OXI 10 IE/ml synthetisches Oxytocin - Injektionslösung

### **2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Synthetisches Oxytocin 10 IE

### **3. PACKUNGSGRÖSSE**

50 ml

### **4. ZIELTIERART(EN)**

Sauen, Schafe (weiblich), Kühe, Hündinnen und Katzen (weiblich).

### **5. ANWENDUNGSGEBIETE**

### **6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskulär:

**Sauen und Schafe (weiblich):** 0,2 bis 1 ml/Tier (2 bis 10 IE/Tier).

**Kühe:** 1 bis 4 ml/Kuh (10 bis 40 IE /Kuh).

**Hündinnen:** 0,2 bis 1 ml/Hund (2 bis 10 IE /Hund).

**Katze (weiblich):** 0,2 bis 0,5 ml/Katze (2 bis 5 IE /Katze).

Intravenös:

**Sauen und Schafe (weiblich):** 0,05 bis 0,25 ml/Tier (0,5 bis 2,5 IE /Tier).

**Kühe:** 0,25 bis 1 ml/Kuh (2,5 bis 10 IE /Kuh).

**Hündinnen:** 0,05 bis 0,25 ml/Hund (0,5 bis 2,5 IE /Hund).

**Katze (weiblich):** 0,05 bis 0,125 ml/Katze (0,5 bis 1,25 IE /Katze).

Intravenöse Injektionen sollten langsam in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser für Injektionszwecke verabreicht werden.

Es wird eine niedrige Anfangsdosis empfohlen, die nur erhöht werden sollte, wenn keine Wirkung beobachtet wird.

Falls erforderlich, kann die Anwendung alle 30 Minuten wiederholt werden.

### **7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 12 Stunden.

Milch: 12 Stunden.

### **8. VERFALLDATUM**

Exp {MM/JJJJ}

### **9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).

Vor Licht schützen.

### **10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung vor Tiere.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.

**14. ZULASSUNGSNR.**

8-00541

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****ETIKETT FÜR Durchstechflasche ZU 10 ml und 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

GESTAVET OXI 10 IE/ml synthetisches Oxytocin - Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Synthetisches Oxytocin 10 IE

**3. ZIELTIERART(EN)**

Sauen, Schafe (weiblich), Kühe, Hündinnen und Katzen (weiblich).

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenös oder intramuskulär.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 12 Stunden.

Milch: 12 Stunden.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}