

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/01/1373

**Tirsan injection** 250mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, sivēniem

### 1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:  
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija.

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Tirsan injection** 250mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, sivēniem  
*Thiamphenicolium*

### 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1ml satur -

**Aktīvā viela:**

Tiamfenikols 250mg

**Palīgvielas:** līdz 1ml

### 4. INDIKĀCIJA(-S)

*Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Clostridium* spp. un citu mikroorganismu izraisītas septicēmijas, zarnu infekciju, bronhopneimonijas, sekundāru infekciju, urīnizvadceļu infekciju, metrīta, piometras, mastīta, nagu infekciju un dermatītu ārstēšanai liellopiem, aitām, cūkām, sivēniem.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

### 6. IESPĒJAMĀ BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējams imunoloģisko procesu nomākums. Tiamfenikols penetrē placentāro barjeru, tāpēc grūšņiem dzīvniekiem izraisa teratogēnu un fetotoksisku iedarbību.

Pārdozēšanas gadījumā iespējama mikrosēņu superinfekcija un/vai mikroorganismu disbalance organismā. Injekcijas vietā iespējama sāpju sajūta.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

### 7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, cūkas, sivēni.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Devas:

- liellopiem, aitām un cūkām dienas deva sadalot divām ievadīšanas reizēm 10-20 ml/100kg ķermeņa svara (25-50 mg tiamfenikola/kg) intramuskulāri vai intravenozi;
- sivēniem dienas deva sadalot to divām ievadīšanas reizēm 2-4 ml/10kg ķermeņa svara (50-100 mg tiamfenikola/kg) intramuskulāri.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Skat. 8. punktā.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Pienam: 48 stundas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt tumšā vietā istabas temperatūrā.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Tiamfenikols penetrē placentāro barjeru un var izraisīt teratogēnu un fetotoksisku iedarbību grūsnības agrīnajās stadijās.

Pārdozēšanas gadījumā iespējama mikrosēņu superinfekcija un/vai mikroorganismu disbalance organismā. Injekcijas vietā iespējama sāpju sajūta.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

10/2015

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 40ml, 100ml, 250ml un 500ml. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

**SIA "Optim Vet"**

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija

