

# RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

## **1. Dénomination du médicament vétérinaire**

VOLACRINE SULFA

## **2. Composition qualitative et quantitative**

Un mL contient :

Substance(s) active(s) :

Sulfadimidine ..... 18,4 mg

(sous forme de sel de sodium)

Sulfaquinoxaline..... 5,6 mg

(sous forme de sel de sodium)

Excipient(s) :

Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E 219)..... 1,5 mg

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ».

## **3. Forme pharmaceutique**

Solution buvable.

### **4.1. Espèces cibles**

Volailles.

### **4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Affections à germes sensibles à la sulfadimidine et à la sulfaquinoxaline.

Chez les volailles :

- Traitement et prévention des infections respiratoires et digestives.

- Traitement et prévention des coccidioses digestives.

#### **4.3. Contre-indications**

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux sulfamides.

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d'insuffisances rénale ou hépatique graves.

#### **4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Ne pas utiliser chez les volailles pondeuses (voir rubrique « Temps d'attente »).

##### **i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Ne pas traiter plus de 3 jours consécutifs.

##### **ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Les personnes ayant des antécédents d'hypersensibilité aux sulfamides doivent éviter tout contact avec le produit.

En cas de symptômes après exposition (rougeur cutanée), demander conseil à un médecin et lui montrer la notice.

Un oedème de la face, des lèvres ou des yeux ou des difficultés respiratoires peuvent constituer des signes graves qui nécessitent un traitement médical d'urgence.

##### **iii) Autres précautions**

Aucune.

#### **4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Non connus.

#### **4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

Sans objet.

#### **4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Non connues.

#### **4.9. Posologie et voie d'administration**

Voie orale :

Diluer le produit directement dans l'eau de boisson des animaux.

La quantité d'eau de boisson médicamenteuse consommée par les animaux dépend de leur état physiologique et clinique. Afin d'obtenir la posologie en mg/kg recommandée, les concentrations en sulfadimidine et en sulfaquinoxaline doivent être ajustées en conséquence.

- Traitement préventif en milieu infecté :

9,2 mg de sulfadimidine et 2,8 mg de sulfaquinoxaline par kg de poids vif, correspondant à 5 mL de la spécialité par litre d'eau de boisson pendant 3 jours sur la base d'une consommation hydrique de 100 mL par kg de poids vif.

Après 3 jours d'arrêt, renouveler le traitement à nouveau pendant 3 jours consécutifs.

- Traitement curatif :

27,6 mg de sulfadimidine et 8,4 mg de sulfaquinoxaline par kg de poids vif, correspondant à 15 mL de la spécialité par litre d'eau de boisson pendant 3 jours sur la base d'une consommation hydrique de 100 mL par kg de poids vif.

Après 3 jours d'arrêt, renouveler le traitement à nouveau pendant 3 jours consécutifs.

Pour améliorer l'appétence de la solution, 2 cuillères à café de sucre par litre d'eau peuvent être ajoutées.

#### **4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

Non connu.

#### **4.11. Temps d'attente**

Viandes et abats : 12 jours.

Œufs : En l'absence de LMR pour les oeufs, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices d'oeufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci.

### **5. Propriétés pharmacologiques**

Groupe pharmacothérapeutique : Anti-infectieux à usage systémique, association de sulfamides.

Code ATC-vet : QJ01EQ30.

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

Association de deux sulfamides bactériostatiques possédant un large spectre d'activité (germes Gram positif et Gram négatif) et doués d'une action anticoccidienne.

La sulfadimidine est un sulfamide à action rapide dans l'organisme. Il a une action uniquement bactériostatique, bloquant l'utilisation de l'acide folique par les bactéries. Il possède un large spectre d'activité allant des germes Gram positif et germes Gram négatif aux protozoaires.

La sulfaquinoxaline présente une activité plus particulièrement orientée vers les coccidies.

#### **5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques**

Non documentées.

### **6.1. Liste des excipients**

Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E 219)  
Citrate de sodium (E331)  
Hydroxyde de sodium  
Eau purifiée

### **6.2. Incompatibilités majeures**

Non connues.

### **6.3. Durée de conservation**

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 4 ans.

### **6.4. Précautions particulières de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

### **6.5. Nature et composition du conditionnement primaire**

Flacon verre  
Bidon polypropylène

### **6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## **7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

HUVEPHARMA SA  
34 RUE JEAN MONNET  
ZONE INDUSTRIELLE D'ETRICHE  
SEGRE  
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU  
FRANCE

## **8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché**

FR/V/8877790 6/1992

Flacon de 150 mL  
Flacon de 300 mL  
Flacon de 500 mL  
Bidon de 1 litre  
Bidon de 5 litres  
Bidon de 25 litres

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation**

12/02/1992 - 10/02/2012

**10. Date de mise à jour du texte**

25/03/2019