

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Qivitan 25 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

Cefkinom 25 mg

(kar ustreza 29,64 mg cefkinom sulfata)

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

6 x 50 ml

12 x 50 ml

100 ml

6 x 100 ml

12 x 100 ml

250 ml

6 x 250 ml

12 x 250 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči.

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo vialo dobro pretresite.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 5 dni

Mleko: 24 ur

Prašiči: Meso in organi: 3 dni

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Industrial Veterinaria, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0557/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Nalepka****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Qivitan 25 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

Cefkinom 25 mg

(kar ustreza 29,64 mg cefkinom sulfata)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči.

4. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo vialo dobro pretresite.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 5 dni

Mleko: 24 ur

Prašiči: Meso in organi: 3 dni

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto zdravilo uporabite do:

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Industrial Veterinaria, S.A.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}