

ANNESS I
KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi/L4R lijofiliżat u sospensjoni għal sospensjoni għall-injezzjoni għall-klieb

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doža ta' 1 ml fiha:

Sustanzi Attivi:

Lijofiliżat (attenwat haj):

Canine distemper virus, strejn CDV Bio 11/A
Canine adenovirus tip 2, strejn CAV-2-Bio 13
Canine parvovirus tip 2b, strejn CPV-2b-Bio 12/B
Canine parainfluenza virus tip 2, strejn CPiV-2-Bio 15

	Minimu	Massimu
10 ^{3.1} TCID ₅₀ *	10 ^{5.1} TCID ₅₀ *	
10 ^{3.6} TCID ₅₀ *	10 ^{5.3} TCID ₅₀ *	
10 ^{4.3} TCID ₅₀ *	10 ^{6.6} TCID ₅₀ *	
10 ^{3.1} TCID ₅₀ *	10 ^{5.1} TCID ₅₀ *	

Sospensjoni (inattivat):

Leptospira interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae strejn MSLB 1089
Leptospira interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, strejn MSLB 1090
Leptospira kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, strejn MSLB 1091
Leptospira interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, strejn MSLB 1088
Rabies virus, strejn SAD Vnukovo-32

ALR** titre ≥ 1:51
ALR** titre ≥ 1:51
ALR** titre ≥ 1:40
ALR** titre ≥ 1:51 ≥ 5 IU***

* 50% doža infettiva tat-tessut ikkultivat.

** Antibody micro agglutination-lytic reaction.

*** Unitajiet internazzjonali.

Sustanza mhux attiva:

Idrossidu tal-aluminju 1.8-2.2 mg.

Ingredjenti oħra:

Kompożizzjoni kwalitattiva tal-ingredjenti u kostitwenti oħra
Lijofiliżat:
Trometamol
Edetic Acid
Sucrose
Dextran 70
Sospensjoni:
Klorur tas-sodju
Klorur tal-potassju
Potassium dihydrogen phosphate
Disodium phosphate dodecahydrate
Ilma għall-injezzjoni

Id-dehra viżwali hi kif ġejja:

Lijofiliżat: materjal bħal sponża ta' lewn bajdani.

Sospensjoni: kulur roża b'sediment fin.

3. TAGHRIF KLINIKU

3.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb

3.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott lijispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Tilqim attiv għal klieb minn età ta' 8-9 ġimġhat

- biex tilqa' għal mortalità u sinjali kliniči kkawżati mill-canine distemper virus
- biex tilqa' għal mortalità u sinjali kliniči kkawżati mill-canine adenovirus tip 1
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči u tixrid virali kkawżati mill-canine adenovirus tip 2
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči, lewkopinja u tixrid virali kkawżati mill-canine parvo virus
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči (tnixxija mill-imnieħer u l-ghajnejn) u tnaqqas it-tixrid virali kkważat mill-canine parainfluenza virus
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči, infekzjoni u tixrid mal-urina kkawżat minn *L.interrogens* serogrupp Australis serovar Bratislava
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči u tixrid mal-urina u tnaqqas l-infezzjoni kkawżati minn *L.interrogens* serogrupp Canicola serovar Canicola u *L.interrogens* serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči u tnaqqas l-infezzjoni u tixrid mal-urina kkawżati minn *L.kirschneri* serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa u
- biex tilqa' għall-mortalità, sinjali kliniči u infezzjoni kkawżati mill-virus tar-rabbja.

Bidu tal-immunità:

- Ĝimaghtejn wara tilqima waħda minn età ta' 12-il ġimħha għar-rabbja,
- 3 ġimħat wara l-ewwel tilqima għal CDV, CAV, CPV,
- 3 ġimħat wara li jintem il-kors primarju għal CpiV u
- 4 ġimħat wara li jintem il-kors primarju għall-komponenti tal-*Leptospira*.

Tul tal-immunità:

Tal-anqas tliet snin wara l-kors primarju għall-canine distemper virus, canine adenovirus type 1, canine adenovirus type 2, canine parvovirus u rabbja. It-tul tal-immunità għall-CAV-2 ma ġiex stabbilit permezz ta' sfida. Ĝie muri li tliet snin wara t-tilqima, l-antikorpi għall-CAV-2 kienu għadhom preżenti. Rispons immunitarju protettiv għal mard respiratorju assoċċjat mal-CAV-2 huwa kkunsidrat li jdum tal-anqas tliet snin.

Tal-anqas sena wara l-kors primarju għall-CPiV u għall-komponenti tal-*Leptospira*. Tul tal-immunità għar-rabbja ġie ddimostrat wara tilqima waħda f'età ta' 12-il ġimħha.

3.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

3.4 Twissijiet speċjali

Rispons immunitarju tajjeb jiddejdi fuq sistema immunitarja kompletament kompetenti. Il-kompetenza immunitarja tal-annimal tista' tiġi kompromessa minn varjetà ta' fatturi li jinklu saħħa fqira, stat nutrizzjonali, fatturi ġenetiċi, kura b'mediċini fl-istess ħin u stress.

Ir-rispons immunoloġiku għall-komponenti CDV, CAV u CPV tal-vaċċin jistgħu jiġi ttardjati minħabba interferenza mal-antikorpi derivati mill-omm. Mandankollu, ġie ppruvat li t-tilqima toffri protezzjoni fil-preżenza ta' antikorpi dderivati mill-omm kontra sfidi viral tal-CDV, CAV u CPV f'livelli daqs jew oħla minn dawk li x'aktarx jinstabu f'kundizzjonijiet reali. F'sitwazzjonijiet fejn wieħed jistenna livelli għoljin hafna ta' antikorpi derivati mill-omm, il-protokol ta' tilqim għandu jiġi ppjanat skont il-bżonn.

Laqqam biss annimali f'saħħithom.

3.5 Prekawzjonijiet specjali għall-użu

Prekawzjonijiet specjali għall-użu sigur fl-ispeci li fuqhom ser jintuża l-prodott:

Tużax f'animali li qiegħdin juru sinjal ta' rabbja jew fejn hemm suspett li huma infettati bil-virus tar-rabbja.

L-istrejn attenwati ġajjin mill-vaċċin tal-virus CAV-2, CPiV u CPV-2b jistgħu jinxterdu mill-klieb imlaqqma wara t-tilqima, tixrid ta' CPV deher sa 10 ijiem. Mandankollu, minħabba fil-patoġeniċità baxxa ta' dawn l-istrejns m'hemm x-ghalfejn li klieb imlaqqma jiġu sseparati minn klieb mhux imlaqqma u minn q-tat's domestiċi. L-istrejn tal-virus CPV-2b tal-vaċċin ma ġiex ittestjat fuq u karnivori ohra (ħlief klieb u q-tat's domestiċi) li hu magħruf li huma suxxettibbli għall-canine parvoviruses u għalhekk klieb imlaqqma għandhom jiġu sseparati minnhom wara t-tilqima.

Prekawzjonijiet specjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-animali

F'każ ta' amministrazzjoni aċċidentalni lilek innifsek, hu parir mediku fil-pront u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Prekawzjonijiet specjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mhux applikabbli.

3.6 Effetti mhux mixtieqa

Klieb:

Komuni (1 sa 10 animali / 100 animali trattati):	neħha fis-sit tal-injezzjoni ¹
Rari (1 sa 10 animali / 10,000 animali trattati):	reazzjoni ipersensittiva ² (anafilassi, angjoedima, xokk cirkulatorju, kollass, dijarea, dispnea, remettar) anoressija, attività mnaqqsa
Rari ħafna (<1 animale / 10,000 animale trattati, inkluż rapporti iż-żolati):	ipertermja, letargija, telqa' ġenerali anemija ħimolitika minn effett immunitarju, trombosajtopinja minn effett immunitarju, poliartrite minn effett immunitarju

¹Nefha fis-sit tal-injezzjoni li tgħaddi (sa 5 cm) li tista' tkun tweġġa', shuna jew ħamra. Sal-14-il jum wara t-tilqima kull nefha ta' dan it-tip għandha tkun telqet wahedha jew naqset ħafna.

²Jekk isseħħ reazzjoni ipersensittiva, għandha tingħata kura xierqa mingħajr dewmien. Dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jevolvu f'kundizzjoni ħafna aktar gravi li tista' tkun ta' periklu tal-mewt.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott medicinali veterinarju. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu, preferibbilment permezz ta' veterinarju, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-taqegħid fis-suq jew ir-rappreżentant lokali tiegħi jew lill-awtorità nazzjonali kompetenti permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali. Ara wkoll l-aħħar sejjoni tal-fuljett ta' tagħrif għad-dettalji ta' kuntatt rispettivi.

3.7 Użu fit-tqala, fit-treddiġ u fi żmien il-bidien

Tqala u treddiġ:

Jista' jintuża waqt it-tieni u it-tielet stadju tat-tqala. Is-sigurtà tal-prodott ma gietx investigata waqt l-istadju bikri tat-tqala u fit-treddiġħ.

3.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vacċin jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Għaldaqstant id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vacċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għandha tittieħed kaž b'każ.

3.9 Metodi ta' amministrazzjoni u dožagg

Użu għal taħt il-ġilda.

Doža u metodu ta' amministrazzjoni:

Irrikostitwixxi b'mod assettu l-l-ijofiliżat bis-sospensjoni. Hallat sew u immedjatament amministra l-kontenut kollu (1 ml) tal-prodott rikostitwit.

Dehra tal-vacċin rikostitwit: roža/aħmar, jew kulur safrani b'opalexxa hafifa.

Skema għat-tilqima primarja:

Żewġ doži ta' Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 ġimħat minn xulxin minn età ta' 8-9 ġimħat. It-tieni doža m'għadhiex tingħata qabel l-età ta' 12-il ġimħa.

Rabbja:

Fi studji fil-laboratorju l-effikaċja tal-frazzjoni tar-rabbja ġiet ippruvata wara doža waħda minn età ta' 12-il ġimħa. Għalhekk l-ewwel doža tista' tingħata bl-użu ta' Versican Plus DHPPi/L4. F'dan il-każ, it-tieni tilqima b'Versican Plus DHPPi/L4R m'għandhiex tingħata qabel 12-il ġimħa.

Mandankollu, f'*field studies* 10% ta' klieb sero-negattivi ma wrewx serokonverżjoni ($> 0.1 \text{ IU/ml}$) 3-4 ġimħat wara tilqima primarja waħda kontra r-rabbja. Xi annimali jistgħu ukoll ma jurux livelli ta' $> 0.5 \text{ IU/ml}$ wara t-tilqima primarja. Il-livelli tal-antikorpi jaqgħu matul il-kors tat-tliet snin tul-tal-immunità, għalkemm il-klieb huma protetti meta mhedda. F'każ ta' vjaġġar lejn postijiet ta' riskju jew barra mill-UE, il-veterinarji jistgħu jagħżlu li jagħtu tilqima tar-rabbja żejda wara l-età ta' 12-il ġimħa biex jiżguraw li l-klieb imlaqqma għandhom livell ta' antikorpi $\geq 0.5 \text{ IU/ml}$, li huwa generalment meqjuż li jagħti proteżżejjoni biżżejjed u li jilħqu r-rekwiżiti tat-test tal-ivjaġġar (livelli ta' antikorpi $\geq 0.5 \text{ IU/ml}$).

F'każ ta' bżonn klieb iżgħar minn 8 ġimħat jistgħu jiġu mlaqqma billi s-sigurtà ta' dan il-prodott għet iddimostrata fi klieb ta' 6 ġimħat.

Skema għat-tilqima ripetuta:

Doža waħda ta' Versican Plus DHPPi/L4R għandha tingħata kull tliet snin. Hemm bżonn ta' tilqima repetuta kull sena għall-Parainfluenza u għall-komponenti tal-*Leptospiragħ* halhekk doža waħda tal-vacċin kompatibbli Versican Plus Pi/L4R tista' tingħata kull sena skont il-bżonn.

3.10 Sintomi ta' doža eċċessiva (u fejn applikabbi, proċeduri ta' emerġenza u antidoti)

L-ebda episodji mhux mixtieqa barra dawk imsemmija f'sezzjoni 3.6 ma kienu osservati wara l-amministrazzjoni ta' doža eċċessiva tal-vacċin b'10 darbiet. Madankollu f'minoranza tal-annimali inħass uġiġi fis-sit tal-injezzjoni immedjatamente wara l-amministrazzjoni ta' doža eċċessiva tal-vacċin b'10 darbiet.

3.11 Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu, inkluži restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti medicinali veterinarji antimikrobiċi u antiparassitiċi sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' žvilupp ta' rezistenza

Hemm bżonn ta' ħruġ tal-lott minn awtorità ta' kontroll uffiċjali għal dan il-prodott.

3.12 Perjodi ta' tiżmim

Mhux applikabbli.

4. INFORMAZZJONI IMMUNOLOGIKA

4.1 Kodiċi ATC veterinarja: QI07AJ06.

It-tilqima hija intenzjonata għall-immunizzazzjoni attiva fi ġriewi f'sahħithom u klieb kontra mard ikkawżat mill-virus tal-canine distemper, mill-canine parvovirus, mill-canine adenovirus tip 1 and 2, mill-canine parainfluenza virus, mill-*Leptospira interrogens* serogrupp Australis serovar Bratislava, *Leptospira interrogens* serogrupp Canicola servar Canicola, *Leptospira kirschneri* serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, *Leptospira interrogens* serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, u virus tar-rabbja.

5. TAGHRIF FARMAČEWTIKU

5.1 Inkompattibiltajiet maġġuri

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompatibilità, dan il-prodott medicinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien ma' prodotti medicinali veterinarji oħra.

5.2 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali

Żmien kemm idum tajjeb l-prodott medicinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: sentejn. Żmien kemm idum tajjeb wara li jithallat skont l-istruzzjonijiet: uža fil-pront.

5.3 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżeen u ttrasporta go frigg (2°C – 8°C).

Tiffrizax

Ipprotegi mid-dawl.

5.4 In-natura u l-ġħamla tal-ippakkjar li jmiss mal-prodott

Kunjett tal-ħgieg Tip I li fih doža waħda ta' lijofiliżat magħluqa b'tapp tal-bromobutyl rubber u kappa tal-aluminju.

Kunjett tal-ħtieg Tip I li fih 1 ml sospensjoni magħluqa b'tapp tal-lastiku chlorobutyl u kappa tal-aluminju.

Daqsijiet tal-pakketti:

Kaxxa tal-plastik b'25 kunjett (doža waħda) tal-lijofiliżat u 25 kunjett (1 ml) tas-sospensjoni Kaxxa tal-plastik b'50 kunjett (doža waħda) tal-lijofiliżat u 50 kunjett (1 ml) tas-sospensjoni.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq.

5.5 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti medicinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uža skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbi għall-prodott medicinali veterinarju kkonċernat.

6. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Zoetis Belgium

7. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/14/163/001

EU/2/14/163/002

8. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07/05/2014.

9. DATA TAL-AHHAR REVIŽJONI TAL-KARTTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

TBD

10. KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDICINALI VETERINARJI

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-ricetta.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fil-Baži tad-data tal-prodotti tal-Unjoni.

ANNESS II

**KONDIZZJONIJIET U HTIĞIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID
FIS-SUQ**

Xejn.

ANNESS III
TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi/L4R lijofiliżat u sospensjoni għal sospensjoni għall-injezzjoni.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doža ta' 1 ml fiha:

Sustanzi attivi:

Lijofiliżat (attenwat haj):

	Minimu	Massimu
Canine distemper virus	$10^{3.1}$ TCID ₅₀	$10^{5.1}$ TCID ₅₀
Canine adenovirus tip 2	$10^{3.6}$ TCID ₅₀	$10^{5.3}$ TCID ₅₀
Canine parvovirus tip 2b	$10^{4.3}$ TCID ₅₀	$10^{6.6}$ TCID ₅₀
Canine parainfluenza virus tip 2	$10^{3.1}$ TCID ₅₀	$10^{5.1}$ TCID ₅₀

Sospensjoni (inattivat):

<i>L.interrogans</i> serovar Icterohaemorrhagiae	ALR titré $\geq 1:51$
<i>L.interrogans</i> serovar Canicola	ALR titré $\geq 1:51$
<i>L.kirschneri</i> serovar Grippotyphosa	ALR titré $\geq 1:40$
<i>L.interrogans</i> serovar Bratislava	ALR titré $\geq 1:51$
Virus tar-rabja	≥ 5 IU

3. DAQS TAL-PAKKETT

25 x 1 doža

50 x 1 doža

4. SPEĆI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

5. INDIKAZZJONIJIET

6. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

7. ŻMIEN TA' TIŻMIM

8. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ssss}

Ladarba jithallat uža fil-pront.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN

Aħżeen u ttrasporta gó frigġ.

Tiffrizax

Ipprotegi mid-dawl.

10. IL-KLIEM “AQRA L-FULJETT TA’ TAGHRIF QABEL L-UŻU”

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

11. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

12. IL-KLIEM “ ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL ”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

13. L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Zoetis Belgium

14. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/14/163/001

EU/2/14/163/002

15. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI
JMISS MAL-PRODOTT**

KUNJETT (LIJOFILIŻAT DOŽA WAHDA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi/L4R



2. ID-DETTALJI KWANTITATTIVI TAS-SUSTANZI ATTIVI

DHPPi
1 doża

3. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

4. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ssss}

Ladarba jithallat uža fil-pront.

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI
JMISS MAL-PRODOTT**

KUNJETT (SOSPENSJONI 1 ML)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

Versican Plus DHPPi/L4R



2. ID-DETTALJI KWANTITATTIVI TAS-SUSTANZI ATTIVI

L4R
1 ml

3. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

4. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ssss}

B. FULJETT TA' TAGHRIF

FULJETT TA' TAGHRIF GHAL:

1. L-isem tal-prodott mediciinali veterinarju

Versican Plus DHPPi/L4R lijofiliżat u sospensjoni għal sospensjoni għall-injezzjoni għall-klieb

2. Kompożizzjoni

Kull doža ta' 1 ml fiha:

Sustanzi attivi:

Lijofiliżat (attenwat ħaj):

	Minimu	Massimu
Canine distemper virus, strejn CDV Bio 11/A	$10^{3.1}$ TCID ₅₀ *	$10^{5.1}$ TCID ₅₀ *
Canine adenovirus tip 2, strejn CAV-2-Bio 13	$10^{3.6}$ TCID ₅₀ *	$10^{5.3}$ TCID ₅₀ *
Canine parvovirus tip 2b, strejn CPV-2b-Bio 12/B	$10^{4.3}$ TCID ₅₀ *	$10^{6.6}$ TCID ₅₀ *
Canine parainfluenza virus tipe 2, strejn CPiV-2-Bio 15	$10^{3.1}$ TCID ₅₀ *	$10^{5.1}$ TCID ₅₀ *

Sospensjoni (inattivat):

<i>Leptospira interrogans</i> serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae strejn MSLB 1089	ALR** titre $\geq 1:51$
<i>Leptospira interrogans</i> serogrupp Canicola serovar Canicola, strejn MSLB 1090	ALR** titre $\geq 1:51$
<i>Leptospira kirschneri</i> serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, strejn MSLB 1091	ALR** titre $\geq 1:40$
<i>Leptospira interrogans</i> serogrupp Australis serovar Bratislava, strejn MSLB 1088	ALR** titre $\geq 1:51$
Rabies virus, strejn SAD Vnukovo-32	≥ 5 IU***

* 50% doža infettiva tat-tessut ikkultivat.

** Antibody micro agglutination-lytic reaction.

*** Unitajiet internazzjonali.

Sustanza mhux attiva:

Idrossidu tal-aluminju	1.8-2.2 mg.
------------------------	-------------

Id-dehra viżwali hi kif ġejja:

Lijofiliżat: materja bħal sponża ta' lewn bajdani.

Sospensjoni: kulur roža b'sediment fin.

3. Speċi li għalihom huwa indikat il-prodott

Klieb.

4. Indikazzjonijiet għall-użu

Tilqim attiv għall-klieb minn età ta' 8-9 ġimgħat:

- biex tilqa' għal mortalità u sinjali kliniči kkawżati mill-canine distemper virus
- biex tilqa' għal mortalità u sinjali kliniči kkawżati mill-canine adenovirus tip 1
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči u tixrid virali kkważat mill-canine adenovirus tip 2
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči, lewkopinja u tixrid virali kkawżat mill-canine parvo virus
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči (tnixxija mill-imnieħer u l-ghajnejn) u tnaqqas it-tixrid virali kkawżati mill-canine parainfluenza virus

- biex tilqa' għas-sinjali kliniči, infezzjoni u tixrid mal-urina kkawżati minn *L.interrogens* serogrupp Australis serovar Bratislava
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči u tixrid mal-urina u tnaqqas l-infezzjoni kkawżati minn *L.interrogens* serogrupp Canicola serovar Canicola u *L.interrogens* serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae
- biex tilqa' għas-sinjali kliniči u tnaqqas l-infezzjoni u tixrid mal-urina kkawżati minn *L.kirschneri* serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa u
- biex tilqa' għall-mortalitā, sinjali kliniči u infezzjoni kkawżati mill-virus tar-rabbja.

Bidu tal-immunità:

- Ġimħtejn wara tilqima waħda minn età ta' 12-il ġimgħa għar-rabbja.
- 3 ġimħat wara l-ewwel tilqima għal CDV, CAV, CPV
- 3 ġimħat wara li jintemm il-kors primarju għal CpiV u
- 4 ġimħat wara li jintemm il-kors primarju għall-komponenti tal-*Leptospira*.

Tul tal-immunità:

Tal-anqas tliet snin wara l-kors primarju għall-canine distemper virus, canine adenovirus type 1, canine adenovirus type 2, canine parvovirus u rabbja. It-tul tal-immunità għall-CAV-2 ma ġiex stabbilit permezz ta' sfida. Ĝie muri li tliet snin wara t-tilqima, l-antikorpi għall-CAV-2 kienu għadhom preżenti. Rispons immunitarju protettiv għal mard respiratorju assoċċjat mal-CAV-2 huwa kkunsidrat li jdum tal-anqas tliet snin. Tal-anqas sena wara l-kors primarju għall-CPiV u għall-komponenti tal-*Leptospira*. Tul tal-immunità għar-rabbja ġie ddimostrat wara tilqima wahda f'età ta' 12-il ġimgħa.

5. Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

6. Twissijiet speċjali

Twissijiet speċjali:

Rispons immunitarju tajjeb jiddeppendi fuq sistema immunitarja kompletament kompetenti. Il-kompetenza immunitarja tal-annimal tista' tiġi kompromessa minn varjetà ta' fatturi li jinkludu saħħa fqira, stat nutrizzjonal, fatturi ġenetiċi, kura b'mediċini fl-istess ħin u stress.

Ir-rispons immunoloġiku għall-komponenti CDV, CAV u CPV tal-vacċin jistgħu jiġu ttardjati minħabba interferenza mal-antikorpi derivati mill-omm. Mandankollu, ġie ppruvat li t-tilqima toffri protezzjoni fil-presenza ta' antikorpi derivati mill-omm kontra sfidi viral tal-CDV, CAV u CPV f'livelli daqs jew oħla minn dawk li x'aktarx jinstabu f'kundizzjonijiet reali. F'sitwazzjonijiet fejn wieħed jistenna livelli għoljin ħafna ta' antikorpi derivati mill-omm, il-protokol ta' tilqim għandu jiġi ppjanat skont il-bżonn.

Laqqam biss annimali f'saħħithom.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċi għal xiex huwa indikat:

Tużax f'annimali li qegħdin juru sinjali ta' rabbja jew fejn hemm suspett li huma infettati bil-virus tar-rabbja.

L-istrejn attenwati ħajjin mill-vacċin tal-virus CAV-2, CPiV u CPV-2b jistgħu jinxterdu mill-klieb mlaqqma wara t-tilqima, tixrid ta' CPV deher sa 10 ijiem. Mandankollu, minħabba fil-patoġeniċità baxxa ta' dawn l-istrejns m'hemmx għalfejn li klieb imlaqqma jiġu sseparati minn klieb mhux imlaqqma u minn qstates domestiċi. L-istrejn tal-virus CPV-2b tal-vacċin ma ġiex ittestjat fuq u karnivori ohra (ħlief klieb u qstates domestiċi) li hu magħruf li huma suxxettibbli għall-canine parvoviruses u għalhekk klieb imlaqqma għandhom jiġu sseparati minnhom wara t-tilqima.

Prekawzjonijiet specjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-animali:

F'każ ta' amministrazzjoni aċċidentalni lilek innifsek, hu parir mediku fil-pront u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Prekawzjonijiet specjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mhux applikabbli.

Tqala u treddiġħ:

Jista' jintuża waqt it-tieni u it-tielet stadju tat-tqala. Is-sigurtà tal-prodott ma ġietx investigata waqt l-istadju bikri tat-tqala u fit-treddiġħ.

Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju ieħor. Għaldaqstant id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott medicinali veterinarju ieħor, għandha tittieħed każ b'każ.

Doża eċċessiva:

L-ebda episodji mhux mixtieqa barra dawk imsemmija f'sezzjoni 7 (Effetti mhux mixtieqa) ma kienu osservati wara l-amministrazzjoni ta' doża eċċessiva tal-vaċċin b'10 darbiet. Madankollu f'minoranza tal-animali inħass uġiġ fis-sit tal-injezzjoni immedjatament wara l-amministrazzjoni ta' doża eċċessiva tal-vaċċin b'10 darbiet.

Restrizzjonijiet specjali għall-użu u kundizzjonijiet specjali għall-użu:

Hemm bżonn ta' ħruġ tal-lott minn awtorità ta' kontroll uffiċċiali għal dan il-prodott.

Inkompatibilitajiet maġġuri:

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompatibilità, dan il-prodott medicinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien ma' prodotti medicinali veterinarji oħra.

7. Effetti mhux mixtieqa

Klieb:

Komuni (1 sa 10 animali / 100 animali trattati):
neħħa fis-sit tal-injezzjoni ¹
Rari (1 sa 10 animali / 10,000 animali trattati):
reazzjoni ipersensitiva ² (anafilassi, anġjoedima, xokk ċirkulatorju, kollass, dijarea, dispnea, remettar)
anoressija, attività mnaqqsa
Rari ħafna (<1 animale / 10,000 animale trattato, incluso rapporti isolati):
ipertermja, letargija, telqa' generali anemija ħimolitika minn effett immunitarju, trombosajtopinja minn effett immunitarju, poliartrite minn effett immunitarju

¹Nefha fis-sit tal-injezzjoni li tħaddi (sa 5 cm) li tista' tkun tweġġa', sħuna jew ħamra. Sal-14-il jum wara t-tilqima kull nefha ta' dan it-tip għandha tkun telqet waħedha jew naqset ħafna.

²Jekk isseħħi reazzjoni ipersensitiva, għandha tingħata kura xierqa mingħajr dewmien. Dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jevolvu f'kundizzjoni ħafna aktar gravi li tista' tkun ta' periklu tal-mewt.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott. Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma hadmitx, jekk jogħġibok ikkuntattja, mal-ewwel, lill-verinarju tiegħek. Tista' tirrapporta wkoll kwalunkwe effett mhux mixtieq lir-rappreżtant lokali tad-detentur tal-

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq billi tuża d-dettalji ta' kuntatt fit-tmiem ta' dan il-fuljett, jew permezz tas-sistema ta' rapportaġġ nazzjonali.

8. Doža għal kull speċi, mod u metodu ta' amministrazzjoni

Użu għal taħt il-ġilda.

Skema għat-tilqima primarja:

Żewg doži ta' Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 ġimħat minn xulxin minn età ta' 8-9 ġimħat. It-tieni doža m'għadhiex tingħata qabel l-età ta' 12-il ġimħa.

Rabbja:

Fi studji fil-laboratorju l-effikaċja tal-frazzjoni tar-rabbja ġiet ippruvata wara doža waħda minn età ta' 12-il ġimħa. Għalhekk l-ewwel doža tista' tingħata bl-użu ta' Versican Plus DHPPi/L4. F'dan il-każ, it-tieni tilqima b'Versican Plus DHPPi/L4R m'għandhiex tingħata qabel 12-il ġimħa.

Mandankollu, f'*field studies* 10% ta' klieb sero-negattivi ma serokonverżjoni ($> 0.1 \text{ IU/ml}$) 3-4 ġimħat wara doža primarja waħda kontra r-rabbja. Xi annimali jistgħu ukoll ma jurux livelli ta' $> 0.5 \text{ IU/ml}$ wara t-tilqima primarja. Il-livelli tal-antikorpi jaqgħu matul il-kors tat-tliet snin tul-tal-immunità, ghalkemm il-klieb huma protetti meta mhedda. F'każ ta' vjaġġar lejn postijiet ta' riskju jew barra mill-UE, il-veterinarji jistgħu jagħżlu li jagħtu tilqima tar-rabbja żejda wara l-età ta' 12-il ġimħa biex jiżguraw li l-klieb imlaqqma għandhom livell ta' antikorpi $\geq 0.5 \text{ IU/ml}$, li huwa generalment meqjuż li jgħati protezzjoni biżżejjed u li jilhqu r-rekwiżiti tat-test tal-ivjaġġar (livelli ta' antikorpi $\geq 0.5 \text{ IU/ml}$).

F'każ ta' bżonn klieb iż-ġħar minn 8 ġimħat jistgħu jiġu mlaqqma billi s-sigurtà ta' dan il-prodott ġiet iddimostrata fi klieb ta' 6 ġimħat.

Skema għat-tilqima ripetuta:

Doža waħda ta' Versican Plus DHPPi/L4R għandha tingħata kull tliet snin. Hemm bżonn ta' tilqima repetuta kull sena għall-Parainfluenza u għall-komponenti tal-*Leptospira* għalhekk doža waħda tal-vaċċin kompatibbli Versican Plus Pi/L4R tista' tingħata kull sena skont il-bżonn.

9. Parir sabiex tamministra b'mod korrett

Irrikostitwixxi b'mod asettiku l-ljofiliżat u s-sospensjoni. Hallat sew u immedjatament amministra l-kontenut kollu (1 ml) tal-prodott rikostitwit.

Apparenza tal-vaċċin rikostitwit: roża/aħmar, jew kulur safrani b'opalex-xenza hafifa.

10. Perjodi ta' tiżmim

Mhux applikabbi.

11. Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżeen u ttrasporta go frigg (2°C – 8°C).

Tiffrizax. Ipprotegi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq it-tikketta wara Exp. Id-data tal-iskadenza tirreferi għall-ahħar ġurnata tax-xahar.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jiġi rikostitwit skont kif rakkmandat: uža fil-pront.

12. Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uža skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

13. Klassifikazzjoni tal-prodotti medicinali veterinarji

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

14. Numri tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-daqqsijet tal-pakkett

EU/2/14/163/001-002

Kaxxa tal-plastik b'25 kunjett (doża waħda) tal-lijofiliżat u 25 kunjett (1 ml) tas-sospensjoni.
Kaxxa tal-plastik b'50 kunjett (doża waħda) tal-lijofiliżat u 50 kunjett (1 ml) tas-sospensjoni.

Mhux id-daqqsijet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq.

15. Id-data li fiha ġie rivedut l-aħħar il-fuljett ta' tagħrif

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fil-Baži tad-data tal-prodotti tal-Unjoni.

16. Dettalji ta' kuntatt

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Il-Belġju

Manifattur responsabbi għall-ħrug tal-lott:

Bioveta a.s.
Komenskeho 212/12
683 23 Ivanovice Na Hane
Ir-Repubblika Čeka

Rappreżentanti lokali u d-dettalji ta' kuntatt biex jiġu rrappurtati effetti mhux mixtieqa:

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
BE-1930 Zaventem
Tél/Tel: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgija
Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Белгия
Тел: +359 888 51 30 30

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belsch
Tél/Tel: +32 (2) 746 80 11

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.
náměstí 14. října 642/17
CZ 150 00 Praha
Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.
Csörsz u. 41.
HU-1124 Budapest
Tel.: +36 1 224 5200

Danmark

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Tlf: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Malta

Agrimed Limited
Mdina Road, Zebbug ZBG 9016,
MT
Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH
Schellingstr. 1
DE-10785 Berlin
Tel: +49 30 2020 0049
tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com

Nederland

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
NL-2909 LD Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgia
Tel: +370 610 05088

Norge

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark
Tlf: +47 23 29 86 80
adr.scandinavia@zoetis.com

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.
Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι
EL-15125 Αττική
Τηλ: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH
Floridsdorfer Hauptstr. 1
AT-1210 Wien
Tel: +43 (0)1 2701100 100
tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com

España

Zoetis Spain, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte Edificio nº1,
c/ Quintanavides nº13
ES-28050 Madrid
Tel: +34 91 4191900

France

Zoetis France
10 rue Raymond David
FR-92240 Malakoff
Tél: +33 (0)800 73 00 65

Hrvatska

Zoetis B.V.
Podružnica Zagreb za promidžbu
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 6441 462

Ireland

Zoetis Belgium S.A. (Irish Branch)
2nd Floor, Building 10,
Cherrywood Business Park,
Loughlinstown,
Co. Dublin,
IE – Dublin D18 T3Y1
Tel: +353 (0) 1 256 9800

Ísland

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmörku
Sími: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Italia

Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria 41M,
IT-00192 Roma
Tel: +39 06 3366 8111

Κύπρος

Zoetis Hellas S.A.
Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι
15125, Αττική
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6791900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
PL - 02-676 Warszawa
Tel.: +48 22 2234800

Portugal

Zoetis Portugal Lda.
Lagoas Park, Edifício 10
PT-2740-271 Porto Salvo
Tel: +351 21 042 72 00

România

Zoetis România S.R.L.
Expo Business Park, 54A Aviator Popișteanu,
Clădirea 2, Etaj 1-3, Sector 1,
București, 012095 - RO
Tel: +40785019479

Slovenija

Zoetis B.V.
Podružnica Zagreb za promidžbu
Petra Hektorovića 2,
10000 Zagreb,
Hrvaška
Tel: +385 1 6441 462

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.
náměstí 14. října 642/17
150 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 257 101 111

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy
Bulevardi 21 / SPACES
FI-00180 Helsinki/Helsingfors
Suomi/Finland
Puh/Tel: +358 10 336 7000
laaketurva@zoetis.com

Sverige

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark
Tel: +46 (0) 76 760 0677
adr.scandinavia@zoetis.com

Latvija
Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgija
Tel: +370 610 05088

United Kingdom (Northern Ireland)
Zoetis Belgium S.A. (Irish Branch)
2nd Floor, Building 10,
Cherrywood Business Park,
Loughlinstown,
Co. Dublin,
IE – Dublin D18 T3Y1
Tel: +353 (0) 1 256 9800

17. Tagħrif ieħor

It-tilqima hija intenzjonata għall-immunizzazzjoni attiva fi ġriewi f'sahħithom u klieb kontra mard ikkawżat mill-virus tal-canine distemper, mill-canine parvovirus, mill-canine adenovirus tip 1 and 2, mill-canine parainfluenza virus, mill-*Leptospira interrogens* serogrupp Australis serovar Bratislava, *Leptospira interrogens* serogrupp Canicola servar Canicola, *Leptospira kirschneri* serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, *Leptospira interrogens* serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, u virus tar-rabbja.