

NAVODILO ZA UPORABO

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITUTEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

VETOQUINOL SA
MAGNY-VERNOIS
F-70200 LURE
FRANCIJA

Izdelovalec, odgovoren za sprostitutev serije:

VETOQUINOL SA
MAGNY VERNOS
F-70200 LURE
Francija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

DOLPAC 25 tablete za velike pse

3. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN

Ena tableta vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

Oksantel	500,70 mg (kar ustreza 1397,5 mg oksantelijskega embonata)
Pirantel	124,85 mg (kar ustreza 360 mg pirantelijskega embonata)
Prazikvantel	125,00 mg

Pomožne snovi do 2375 mg deljive tablete.

4. INDIKACIJE

Zdravljenje psov z mešanimi parazitarnimi infestacijami z odraslimi oblikami naslednjih vrst nematodov in cestod:

Nematodi: *Toxocara canis*,
Toxascaris leonina,
Ancylostoma caninum,
Uncinaria stenocephala,
Trichuris vulpis.

Cestodi: *Dipylidium caninum*,
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis
Echinococcus granulosus

5. KONTRAINDIKACIJE

Glejte poglavje 12.

6. NEŽELENI UČINKI

Po zdravljenju se občasno lahko pojavita bruhanje in driska.

Pojavi se lahko anoreksija, čeprav je v izvedenih študijah z zdravilom niso opazili, je pa pogost neželen učinek pri zdravilih, ki vsebujejo prazikvantel.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Priporočena kombinacija odmerkov je 20 mg oksantela / 5 mg pirantela / 5 mg prazikvantela na kg telesne mase, kar ustreza eni tableti na 25 kg telesne mase v enkratnem odmerku. Zdravilo se daje peroralno.

Psom, najbolje na tešče, dajte v enem peroralnem odmerku potrebno število tablet v skladu s telesno maso. Hrano lahko daste eno uro ali več po zdravljenju.

Telesna masa	Število tablet
Od 10,1 do 12,5 kg	½
Od 12,6 do 25 kg	1
Od 25,1 do 50 kg	2
Od 50,1 do 75 kg	3

Tableto lahko razdelite na dva enaka dela.

Pse, ki so skupaj ali v pesjaki, zdravite istočasno.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Jih ni.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega po EXP.

Preostanek neuporabljenih prelomljenih tablet zavrzite.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto

Rezistenca parazitov na katerikoli razred antihelmintikov se lahko razvije po pogosti, ponavljajoči uporabi antihelmintikov tega razreda.

Bolhe služijo kot vmesni gostitelj ene pogostih trakulj – *Dipylidium caninum*. Infestacije s trakuljami se lahko ponovijo, če ne odpravite vmesnih gostiteljev (bolh).

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Infestacije z valjastimi in kavljastimi črvi:

Pri nekaterih živalih z zdravljenjem ne moremo popolnoma eradicirati *Ancylostoma caninum* in *Toxocara canis*, česar posledica je stalno tveganje izločanja jajčec v okolje. Priporočeno je pregledovanje blata in glede na rezultate po potrebi zdraviti z nematocidnimi zdravili.

Zdravila ni priporočljivo uporabljati pri mladičkih mlajših od dveh mesecev ali lažjih od 1 kg.

Pri oslabljenih in močno infestiranih živalih zdravilo uporabite le v skladu z oceno razmerja korist/tveganje odgovornega veterinarja.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilne učinkovine, na dodatke ali na katero koli pomožno snov.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Nekatere sestavine zdravila lahko povzročijo alergijske reakcije ali draženje kože.

Izogibajte se stiku s kožo.

Ljudje z znano preobčutljivostjo se morajo izogibati stiku z zdravilom.

Po dajanju si operite roke.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena. Uporaba ni priporočljiva v obdobju brejosti in laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ne uporabite skupaj z levamizolom, piperazinom ali inhibitorji holinesteraze.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

Pri dajanju zdravila zdravim psom v 5-krat večjem odmerku od priporočenega 6 zaporednih tednov ni bilo neželenih stranskih učinkov.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO**15. DRUGE INFORMACIJE**

Samo za živali - na veterinarski recept.

Škatla z 1 pretisnim omotom s 3 tabletami

Škatla s 6 pretisnimi omoti s 3 tabletami

Škatla z 10 pretisnimi omoti s 3 tabletami

Škatla z 20 pretisnimi omoti s 3 tabletami

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.