

ЛИСТОВКА :

TS-11

Жива, замразена ваксина срещу *Mycoplasma gallisepticum* при пилета.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценз за употреба :

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S. p. A
Via Vezza d'Oglio 3,
Milan 20139
Italy

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health S.p.A
Via Baviera9
35027 NOVENTA PADOVANA
Italy

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

TS-11

Жива, замразена ваксина срещу *Mycoplasma gallisepticum* при пилета.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

СЪСТАВ НА 1 ДОЗА:

Активна субстанция:

Mycoplasma gallisepticum, щам TS-11..... най-малко..... 10^{7.4} CCU

Ексципиенти:

Ексципиенти, до 1 доза.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на подрастващи стокови носачки срещу *Mycoplasma gallisepticum*.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилагат антибиотици срещу микоплазми две седмици преди и две седмици след ваксинацията.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Птици.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Една доза (една капка) за птица на възраст 9-14 седмици.

Размразената ваксина се прилага очно.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ваксината трябва бързо да се размрази в топла вода (температура под 30 °C)

Да се разклати преди да се махне капачката.

След махане на капачката и запушалката, монтирайте капкомера .

Ваксината трябва да се използва до 2 часа след размразяване.

Веднъж размразена ваксината не трябва да се замразява отново.

Ваксината трябва да се използва до два часа след размразяване и да се изхвърли остатъка от нея след това.

Броят на птиците, които ще се ваксинират, трябва да съответства на броя дози, съдържащи се във флакона.

Да не се замразява остатъка от ваксината, който не е използван.

Ваксината трябва да се пази от високи температури.

Да се прилагат обичайните асептични процедури.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в замразено състояние при температура -70 °C.

Да се пази от светлина.

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години при температура -70 °C
1 месец при температура -20 °C

Срок на годност след размразяване в съответствие с инструкциите: 2 часа.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се ваксинират само здрави птици.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Няма.

Яйценосене:

Да не се използва при птици в периода на яйценосене и в рамките на 4 седмици преди началото на яйценосния период.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не се препоръчва едновременното прилагане на ваксината TS-11 с други ваксини.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

Да не се прилагат антибиотици срещу микоплазми две седмици преди и две седмици след ваксинацията

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

12/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Д-Р ИВАН ШИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР