

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

INSPECTOR QUADRO TABS таблетки за възрастни кучета и котки, кученца и котенца.

2. Състав

Активни вещества в една таблетка за котки и кучета 0.5 - 2 kg:

Lufenuron	20 mg
Moxidectin	0.6 mg
Praziquantel	10 mg

Активни вещества в една таблетка за котки и кучета 2 - 8 kg:

Lufenuron	40 mg
Moxidectin	1.2 mg
Praziquantel	20 mg

Активни вещества в една таблетка за котки и кучета 8 - 16 kg:

Lufenuron	160 mg
Moxidectin	4.8 mg
Praziquantel	80 mg

Активни вещества в една таблетка за кучета над 16 kg:

Lufenuron	320 mg
Moxidectin	9.6 mg
Praziquantel	160 mg

Светло бежови до бежови, овални таблетки с дълбока разделителна линия в средата.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Възрастни кучета и котки, кученца и котенца.

4. Показания за употреба

INSPECTOR QUADRO TABS е предназначен за възрастни кучета и котки, кученца и котенца за лечение и профилактика на инвазии от кръвосмучещи насекоми, демодекозна краста, заразяване с ушни акари, саркоптозна краста, нотоедрозна краста, инвазии на иксодидни кърлежи, стомашно-чревни нематодози (токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза, трихуроза), цестодози (инвазии с тения, дипилидиоза, ехинококоза, дифилоботриоза, мезоцестоидоза), комплексни нематодно-цестодни инвазии, както и за профилактика на диروفилариоза.

Комбинацията от лufenuron, moxidectin и praziquantel, осигурява широк спектър от антипаразитно действие срещу всички стадии на развитие на бълхи (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), саркоптидни кърлежи (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*), демодекозни акари (*Demodex canis*), иксодидни кърлежи (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), кръгли червеи и тении, паразитиращи в стомашно-чревния тракт при кучета и котки, включително *Toxocara canis*, *Toxocara cati* (*Toxocara mystax*), *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*, *Multiceps multiceps*, както и ларвения стадий на развитие на *Dirofilaria immitis* и *Dirofilaria repens*.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към луфенурон, моксидектин и празиквантел или към някое от помощните вещества.

Да не се използва при увредена бъбречна и/или чернодробна функция.

Да не се използва при кученца и котенца на възраст под 6 седмици.

Да не се използва при изтощени животни, болни от инфекциозни заболявания и/или с телесна маса под 0.5 kg.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Употребата на продукта при кученца от породите Коли, Бобтейл, Шелти и други породи, чувствителни към макроциклични лактони, ако е необходимо, се извършва само в съответствие с преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към луфенурон, моксидектин или празиквантел трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

При работа с INSPECTOR QUADRO TABS трябва да се спазват общите правила за лична хигиена и професионална безопасност при работа с ВЛП. След приключване на работата внимателно измийте ръцете си със сапун и топла вода. При случайно попадне на продукта върху кожата или лигавиците на очите, измийте с голямо количество вода.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се използва продуктът едновременно с други антипаразитни продукти, съдържащи макроциклични лактони, с пиперазин и продукти, които инхибират холинестераза.

Предозиране:

В случай на предозиране на продукта могат да се проявят депресивно състояние, отказ от храна, прекомерно слюноотделяне и стомашно-чревни разстройства. В тези случаи се прилагат ентеросорбенти и симптоматична терапия.

Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба:

Не е приложимо.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

Не използвайте продукта едновременно с други антипаразитни продукти, съдържащи макроциклични лактони, с пиперазин и продукти, които инхибират холинестераза.

7. Неблагоприятни реакции

Възрастни кучета и котки, кученца и котенца:

Редки (1 до 10 на 10 000 третирани животни):	Стомашно-чревни разстройства* и повишено слюноотделяне.*
---	---

* Някои животни могат да проявят тези признаци. Обикновено изчезват без допълнително лечение. Когато се наблюдава повишена чувствителност към продукта и поява на алергични реакции, употребата му се прекратява и, ако е необходимо, се прилагат антихистамини и симптоматично лечение.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или на местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване:

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

INSPECTOR QUADRO TABS се прилага индивидуално, перорално, със сутрешно хранене с малко количество храна или принудително в основта на езика след хранене в минимална терапевтична доза от 10 mg луфенурон, 5 mg празиквантел и 0.3 mg моксидектин на 1 kg телесна маса по следния начин:

	Inspector Quadro Tabs, съдържа в 1 таблетка луфенурон/моксидектин/празиквантел			
Телесна маса	за котки и кучета 0.5 - 2 kg	за котки и кучета 2 - 8 kg	за котки и кучета 8 - 16 kg	за кучета над 16 kg
	20 mg/0.6 mg/10 mg	40 mg/1.2 mg/20 mg	160 mg/4.8 mg/80 mg	320 mg/9.6 mg/160 mg
0.5 - 1 kg	½ таблетка	-	-	-
>1 – 2 kg	1 таблетка	-	-	-
>2 – 4 kg	-	1 таблетка	-	-
>4 – 8 kg	-	2 таблетки	-	-
>8 – 16 kg	-	-	1 таблетка	-
>16 – 32 kg	-	-	-	1 таблетка
>32 – 48 kg	-	-	-	1+½ таблетка
>48 - 64 kg	-	-	-	2 таблетки

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

След еднократно приложение на продукта антипаразитният му ефект продължава до 5 седмици. Продължителността на инсектоакарицидният ефект на продукта зависи от индивидуалните характеристики на животното (степен на активност, състояние на кожата и козината, възраст на животното, характеристики на метаболизма, хранене и др.) и дозата от продукта.

При заразяване с бълхи, кърлежи или отодектоза на кучета и котки, INSPECTOR QUADRO TABS се използва еднократно, за предотвратяване на повторна инвазия - веднъж на всеки 4-6 седмици през целия сезон на активност на ектопаразитите. Инсектицидният ефект на продукта се проявява след 24 часа, достигайки максимално ниво след 48 часа.

Като се има предвид, че акарицидният ефект на продукта се проявява за 12-24 часа след приложението, третиранията трябва да се извършват не по-късно от 24 часа преди очакваното

пускане на животно на открити места, където има вероятност от наличие на кърлежи (паркове, градини, гори).

За унищожаване на ектопаразити в помещението и предотвратяване на повторно заразяване на животните, развъдниците, клетките, постелките и одеялата се третира с разрешен за употреба инсектоакарициден продукт в съответствие с инструкцията за употреба.

Когато животните са засегнати от саркоптозна, нотоедозна или демодекозна краста, третирането се провежда два до пет пъти с интервал от 7 до 14 дни преди клиничното възстановяване на животното, което се потвърждава от два отрицателни резултата от изследвания за акари.

Лечението на животни се препоръчва да се извършва в комплекс с използването на патогенетични и симптоматични продукти.

При хелминтоза продуктът се използва за терапевтични цели еднократно според показанията; при силна степен на инвазия се препоръчва повторение на третирането след 10 до 14 дни. За превантивни цели продуктът се използва в терапевтична доза веднъж на всеки 3 месеца, както и 10 до 14 дни преди всяка ваксинация.

За предотвратяване на диروفилариоза в засегнатите от болестта райони, продуктът се прилага през пролетно-лятно-есения период: преди началото на летенето на комарите (носители на *D. immitis*) еднократно, след това веднъж месечно и последния път в рамките на един месец след приключване на летенето на насекомите. INSPECTOR QUADRO TABS не унищожава зрели диروفиларии, но намалява броя на микрофилариите, циркулиращи в кръвта и може да се прилага безопасно и при инвазирани животни.

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 30 °C. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-3125

PE/PVDC/PVC - алуминиеви блистери, съдържащи 2 таблетки.

Кутия с 2 блистера, всеки съдържащ по 2 таблетки.

Кутия с 4 блистера, всеки съдържащ по 2 таблетки.

Кутия с 6 блистера, всеки съдържащ по 2 таблетки.

Кутия с 8 блистера, всеки съдържащ по 2 таблетки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

02/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия, производител, отговарящ за освобождаването на партии и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
4023 Пловдив, България
ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап. 2
Телефон: +359 897 84 39 18
Email: info@vepco.bg
Р. България

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП