

## **В. ЛИСТОВКА**

**ЛИСТОВКА**  
**SYVA-BAH**  
Инжекционна суспензия

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба:

Laboratorios Syva S.A.U.  
Av/Parroco Pablo Diez, 49-57  
24010 Leon  
Spain

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Laboratorios Syva S.A.U.  
Parque Tecnológico de León  
Av/Portugal s/n, parcelas M15-M16.  
24009 Leon  
Spain

**2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

SYVA-BAH

**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦЕПИЕНТИТЕ**

**Активни субстанции в 2 ml:**

*Clostridium perfringens* toxoid

Type A, B, C, and D.....0.3 IU  $\alpha$

.....10 IU  $\beta$

.....5 IU  $\epsilon$

*Clostridium septicum*.....2.5 IU  $\alpha$

*Clostridium novyi* Type B.....3.5 IU  $\alpha$

*Clostridium tetani*.....2.5 IU

*Clostridium sordellii*.....100 % защита при контролни животни

*Clostridium chauvoei*.....100 % защита при контролни животни

**Ексцепиенти:**

Aluminium hydroxide gel at 3%

Phenol

Formaldehyde

Phosphate buffer (PBS) pH 7.4

**4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Активна имунизация срещу емфизематозна гангрена, инфекциозен некротичен хепатит, брадзот, тетанус и ентеротоксемия, причинени от *Clostridium perfringens* A, B, C и D, *Clostridium septicum*, *Clostridium novyi* Type B, *Clostridium tetani*, *Clostridium sordellii* и *Clostridium chauvoei*.

**5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Противопоказано е ваксинирането на хипертермични животни и на животни непосредствено преди транспортиране.

**6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

При животни с тенденция към заболяване или с проявена чувствителност от предходно лечение е възможна проявата на алергични реакции. Това се случва много рядко.

## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Едри преживни, свине, овце, кози и зайци.

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

Инжекционна суспензия.

**Крави:** 5 ml за мускулно или подкожно приложение;

**Овце и кози:** 2 ml за подкожно приложение;

**Свине:** 2 ml за мускулно приложение;

**Зайци:** 1 ml за подкожно приложение;

### **Ваксинационна програма:**

- Първа ваксинация: две приложения с интервал от 4-6 седмици;
- Реваксинация: всеки 6 месеца.

**Бременни животни:** активната имунизация на бременните животни дава пасивна протекция за новородените през първите 3 месеца.

### **Млади животни:**

- Родени от имунизирани майки: ваксинацията се извършва от 8 седмична възраст;
- Родени от неимунизирани майки: ваксинацията се извършва от 2 седмична възраст.

**Други животни:** две ваксинации с интервал от 4-6 седмици, последвани от реваксинация на всеки 6 месеца.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Преди да се използва ваксината е препоръчително затоплянето и до температурата на помещението, където ще се извърши ваксинацията; следователно трябва да се извади от хладилника и да се държи при стайна температура за необходимото време.

Да се разклати енергично преди и след употреба.

Трябва да се използва цялото съдържание на флакона след отварянето му. Останало във флакона съдържание не може да се използва за друга ваксинация.

Да се ваксинират само здрави животни.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Не се изисква.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява в хладилник (2 °C - 8 °C).

Да не се замръзва.

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)**

Да не се използва като разтворител на живи ваксини и да не се смесва с други продукти, които могат да доведат до реципитация.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

## **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

Март, 2017 г.

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

„ФАРМА СИС” ООД

гр. Добрич, ул. "Сан Стефано" № 6б, ет. 1,офис 3  
тел. 058/604 266