

GEBRAUCHSINFORMATION
Panacur Puppy 100 mg/ml Suspension zum Einnehmen

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Niederlande

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Intervet Productions S.A., Rue de Lyons, 27460 Igoville, Frankreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Panacur Puppy 100 mg/ml Suspension zum Einnehmen
Fenbendazol

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Pro. ml:

Wirkstoff :

Fenbendazol: 100 mg

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Für die Behandlung von Hunden und Welpen, infiziert mit reifen sowie unreifen Stadien von Magen-Darm-Rundwürmern und auch für die Behandlung von Bandwürmern (*Taenia* spp.) bei Hunden.

Bei Hunden und Welpen: *Toxocara canis* (reifen und unreifen Stadien), *Toxascaris leonina* (reifen Stadien), *Ancylostoma caninum* (reifen und unreifen Stadien), *Uncinaria stenocephala* (reifen und unreifen Stadien), *Trichuris vulpis* (reifen Stadien), *Taenia pisiformis* (reifen Stadien).

Auch für die Behandlung von Lungwürmern bei Hunden (*Oslerus osleri*).

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Gastrointestinale Störungen (wie Erbrechen und Durchfall) können in seltenen Fällen bei Hunden In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen bei Hunden auftreten.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Welpen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die Basisdosierung beträgt 50 mg Fenbendazol pro kg Körpergewicht an 3 aufeinanderfolgenden Tagen.

Für die Behandlung von *Oslerus osleri* ist es indiziert während 8 Tagen zu behandeln und nach Intervall von 1 Woche die Behandlung während 8 Tagen zu wiederholen.

Hunde und Welpen:

Körpergewicht	Dosierung
bis 1 kg	0,5 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen
1 bis 2 kg	1 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen
2 bis 4 kg	2 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen
4 bis 6 kg	3 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen
6 bis 8 kg	4 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen
8 bis 10 kg	5 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen
mehr als 10 kg	5 ml täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen + 0,5 ml für jeder kg Gewicht extra

Welpen behandeln im Alter von 2 Wochen und für die weitere Behandlung sollte ein Tierarzt konsultiert werden.

Wiederholen Sie die Behandlung, wenn eine natürliche Infektion mit parasitären Würmern auftritt. Abhängig von der epidemiologischen Situation (engem Kontakt mit Kindern, Landleben, häufigen Kontakt mit anderen Hunden, erhöhten Infektionsdruck, Trächtigkeit, Gebrauch für die Jagd...), kann in den meisten Fällen eine prophylaktische Routinebehandlung von 2 bis 4 mal pro Jahr für erwachsene Tiere empfohlen werden.

Für Hunde in Kennel ist eine häufigere Behandlung mit einem Intervall von 6 - 8 Wochen zu empfehlen. Ihr Tierarzt kann Ihnen hierüber weitere Informationen geben.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Für entwöhnte Tiere Panacur Puppy vorzugsweise in das Futter mischen (für nicht entwöhnte Tiere nach der Fütterung direkt ins Maul eingeben).

Bestimmen Sie das Körpergewicht so genau wie möglich, bevor Sie die Dosis berechnen.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Unter 25°C lagern.
Vor Frost schützen.

Nach erstmaligem Öffnen: sofort verwenden.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nach dem „EXP.“ nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Die Anwendung dieses Tierarzneimittels sollte auf lokalen epidemiologischen Informationen zur Empfindlichkeit der Nematoden und auf Empfehlungen zur Einschränkung der weiteren Selektion auf Resistenz gegen Anthelmintika beruhen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Der direkte Hautkontakt muss auf ein Minimum beschränkt werden.

Nach Gebrauch Hände waschen.

Während der Anwendung nicht rauchen, trinken oder essen.

Trächtigkeit und Laktation:

Kann mit trächtigen Hündinnen verwendet werden.

Da teratogene Wirkungen bei Hunden in sehr seltenen Fällen nicht vollständig ausgeschlossen werden können, sollte die Behandlung in den ersten beiden Schwangerschaftstrimestern auf einer Nutzen-Risiko-Bewertung durch den zuständigen Tierarzt beruhen.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Benzimidazole haben eine hohe Sicherheitsmarge. In Laborüberdosierungsstudien wurde eine vorübergehende lymphatische Hyperplasie in der Magenschleimhaut oder in den mesenterialen Lymphknoten von Hunden beobachtet. Diese Befunde waren nicht mit klinischen Symptomen verbunden.

Während der Überwachung nach dem Inverkehrbringen wurden keine anderen Nebenwirkungen als die in Abschnitt 4.6 aufgeführten beobachtet, wenn eine Überdosierung verabreicht wurde. Bei unerwünschten klinischen Symptomen nach einer Überdosierung muss eine geeignete Behandlung durchgeführt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Dieses Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Dezember 2023

15. WEITERE ANGABEN

100 mL PE-Behälter mit PE-Schraubverschluss.

Zulassungsnummer: BE-V205703

Abgabemodus: Verschreibungsfrei.