

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Faltschachtel für 4 ml Flasche  
Faltschachtel für 10 ml Flasche  
Faltschachtel für 20 ml Flasche  
Faltschachtel für 50 ml Flasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ovarelin 50 µg/ml, Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält 50,0 µg Gonadorelin (als Diacetat-Tetrahydrat).

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

4 ml  
10 ml  
20 ml  
50 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind: Kuh und Färse

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN****Wartezeit:**

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

Nach Anbrechen verwendbar bis \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**



**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V297062 (GLAS TYPE I) - BE-V372084 (GLAS TYPE II)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etiketten für 4 ml-Flaschen

Etiketten für 10 ml-Flaschen

Etiketten für 20 ml-Flaschen

Etiketten für 50 ml-Flaschen

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ovarelin



### 2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

50,0 µg Gonadorelin pro ml

### 3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

### 4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

Nach Anbrechen verwendbar bis \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_