

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

100 ml Durchstechflasche in einer Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bisolvon 3 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Bromhexinhydrochlorid 3 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder und Schweine: Zur intramuskulären Anwendung.
Hunde und Katzen: Zur intramuskulären oder subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Essbare Gewebe:
Rinder: 3 Tage
Schweine: 2 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht unter 8 °C lagern.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 14.143

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bisolvon 3 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Bromhexinhydrochlorid 3 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Rinder und Schweine: i.m.

Hunde und Katzen: i.m., s.c.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe:

Rinder: 3 Tage

Schweine: 2 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch verwendbar bis...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht unter 8°C lagern.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}