

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:

HIPRAVIAR – B1

Λυοφιλοποιημένο εμβόλιο

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:
LABORATORIOS HIPRA S.A.

Avda. la Selva 135

Amer (Girona)

ΙΣΠΑΝΙΑ

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

HIPRAVIAR – B1

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σύνθεση ανά δόση του εμβολίου:

Δραστικό συστατικό:

Ιός της νόσου του NEWCASTLE , στέλεχος Hitchner B1... $\dots \geq 10^{6.5}$ EID50

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Πρόληψη και έλεγχος της Νόσου του Newcastle (ψευδοπανώλους).

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Όρνιθες.

8. ΛΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οφθαλμορρινική ενστάλαξη: Αφού το λυοφιλοποιημένο υλικό έχει διαλυθεί με το διαλύτη (καθαρό, μη χλωριωμένο νερό), πρέπει να χορηγηθεί μια δόση του εναιωρήματος σε κάθε πτηνό (0,03 mL) στους οφθαλμούς ή στους ρώθωνες χρησιμοποιώντας τον δοσομετρικό ενσταλλάκτη.

Χορήγηση από το στόμα: Διαλύστε το λυοφιλοποιημένο υλικό με το διαλύτη (πόσιμο νερό) μέχρι το μισό του φιαλιδίου, ανακινείτε και ρίξτε το σε πόσιμο νερό για κατανάλωση εντός 30 έως 60 λεπτών της ώρας το αργότερο.

Ηλικία πτηνών	Ποσότητα νερού ανά 1000 λίτρα
1-3 εβδομάδες	5-10 λίτρα
4-9 εβδομάδες	12-23 λίτρα
10-16 εβδομάδες	27-37 λίτρα

Χορήγηση με εκνέφωση (ψεκασμός): Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο διάλυμα και εξοπλισμό για κάθε εμβολιασμό.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

- Ελέγξτε την ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.
- Να αναμιγνύεται το λυοφιλοποιημένο υλικό με τον διαλύτη.
- Να το χρησιμοποιείται μόνο με αποστειρωμένα υλικά.
- Εάν το εμβόλιο χορηγηθεί με το νερό, να χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό (π.χ. όχι χλωριωμένο). Το νερό που περιέχει απολυμαντικά πρέπει να απορρίπτεται.
- Σιγουρευτείτε ότι τα πτηνά λαμβάνουν τουλάχιστον 1 δόση το ελάχιστο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: Μηδέν ημέρες.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).
Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

<DD/MM/YYYY>

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες:

5 FL× (1000 δόσεις) & 5 FL ×30 ml

10 FL× (2500 δόσεις)

10 FL× (5000 δόσεις)

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΟΣ:

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: 210 4978660