

Engemycin Vet. injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Volitatud

- Oxytetracycline hydrochloride
- Oxytetracycline hydrochloride

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:

Engemycin Vet. injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Toimeaine:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Loomaliigid:

lammas

veis

sig

Manustamisviis:

Intramuskulaarne

Intravenoosne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

113.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Termini tõlkekeel(ed) English

113.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ravimvorm:

Süstelahus

Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:

Intramuskulaarne:

•

lammas

- liha ja söödavad koed. 30 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- liha ja söödavad koed. 30 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

veis

- liha ja söödavad koed. 30 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- liha ja söödavad koed. 30 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

sigá

- liha ja söödavad koed. 30 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- liha ja söödavad koed. 30 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

Intravenoosne:

•

veis

- liha ja söödavad koed. 6 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- liha ja söödavad koed. 6 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

sigá

- liha ja söödavad koed. 6 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- liha ja söödavad koed. 6 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

lammas

- liha ja söödavad koed. 6 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- liha ja söödavad koed. 6 day

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni

(ATCvet) kood:

QJ01AA06

Ravimi kuuluvus:

Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:

Valid

Müügiluba riikides:

Taani

Saadaval:

Taani

Pakendi kirjeldus:

Termini tõlkekeel(ed) [Danish](#)

Termini tõlkekeel(ed) [Danish](#)

Lisateave

Loa liik:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#)
[Icelandic](#) [Norwegian](#)

Ravimi müügiloa õiguslik alus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Müügiloa hoidja:

Intervet International B.V.

Müügiloa kuupäev:

7/02/1983

Partii vabastamise tootmiskohad:

Intervet International GmbH

Intervet Productions S.r.l.

Vastutav asutus:

Danish Medicines Agency

Müügiloa number:

09743

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:

7/02/1983

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Ravimi omaduste kokkuvõte

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.