

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Metabolase, süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, küülikutele, koertele ja kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml süstelahust sisaldab:

Toimeained:

L-karnitiinvesinikkloriid	6,133 mg, mis vastab 5 mg levokarnitiinile
Tiokthape	0,2 mg
Püridoksiinvesinikkloriid	0,15 mg
Tsüanokobolamiin	0,03 mg
d,l-atsetüülmetioniin	20 mg
L-arginiin	2,4 mg
L-ornitiinvesinikkloriid	1,532 mg, mis vastab 1,2 mg l-ornitiinile
L-tsitulliin	1,2 mg
L-lüsiinvesinikkloriid	0,625 mg, mis vastab 0,5 mg l-lüsiinile
Glütsiin	1,5 mg
Tauriin	1,5 mg
Aspartaamhape	1,5 mg
Glutamiinhape	1,5 mg
Fruktoos	50 mg
Sorbitool	80 mg

Abiained:

Abiainete ja muude koostisosade kvalitatiivne koostis	Kvantitatiivne koostis, kui see teave on oluline veterinaarravimi nõuetekohaseks manustamiseks
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat	0,15 mg
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat	1,5 mg
Naatriumhüdroksiid	
Etanool	
Süstevesi	

Selge roosa lahus.

3. KLIINILISED ANDMED

3.1 Loomaliigid

Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass.

3.2 Näidustused loomaliigiti

Üldtoniseeriv vahend.

3.3. Vastunäidustused

Ei ole.

3.4 Erihoiatused

Ei ole.

3.5 Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks loomaliikidel

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ettevaatusabinõud keskkonna kaitseks

Ei rakendata.

3.6 Kõrvaltoimed

Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass:

Ei ole teada.

Kõrvaltoimetest teatamine on oluline. See võimaldab veterinaarravimi ohutuse pidevat jälgimist. Teatised tuleb eelistatavalt veterinaararsti kaudu saata müügiloa hoidjale või tema kohalikule esindajale või riikliku teavitussüsteemi kaudu riigi pädevale asutusele. Vastavad kontaktandmed on pakendi infolehes.

3.7 Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni või munemise perioodil

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

3.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

3.9 Manustamisviis ja annustamine

Intravenoosne, subkutaanne või intraperitoneaalne manustamine.

Soovitav annus on:

- täiskasvanud veis, hobune ja siga: 250-500 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
- vasikas, varss, täiskasvanud lammas ja kits 250 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
- põrsas ja nuumsiga: 20-40 ml 10 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
- lambatall ja kitsetall: 20-40 ml 10 kg kehamassi kohta intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt kaks korda päevas;
- küülik ja kass: 2-4 ml 1 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
- koer: 2-4 ml 1 kg kehamassi kohta intravenoosselt või subkutaanselt, kaks korda päevas

Subkutaansel süstimisel jagada annus mitmesse süstekohta.

3.10 Üleannustamise sümptomid (esmaabi ja antidoodid, vajadusel)

Ei ole teada.

3.11 Kasutamise eripiirangud ja kasutamise eritingimused, sealhulgas mikroobi- ja parasiidivastaste veterinaarravimite kasutamise piirangud, et vähendada resistentsuse tekke riski

Ei rakendata.

3.12 Keeluajad

Hobune, veis, lammas, kits:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

Siga, küülik:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Koer, kass:

Ei rakendata.

4. FARMAKOLOOGILINE TEAVE

4.1 ATCvet kood: QB05BA80

4.2 Farmakodünaamika

Tegemist on L-karnitiinil, B-grupi vitamiinidel, aminohapetel ja suhkrutel baseeruva intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt süstitava veterinaarravimiga.

Vitamiinid: l-karnitiin (ainult L-vorm on aktiivne) hõlbustab mitteestriiliste rasvhapete oksüdeerimist. Tiokthape osaleb koensüümina rasvade ainevahetuses. Tiokthappel on lipotroopne ja antinekrootiline toime maksa rasva infiltreerumise ja akumulierumise korral ja hepaatilise nekroosi korral.

Vitamiinid B6 ja B12 osalevad ainevahetuse vaheprotsessides, toimides lipotroopselt ja maksa toetavalt.

Aminohapped: ravimis sisalduvad aminohapped on koensüümide prekursorid ja/või ensüümreaktsioonides osalevad ained. Nendeks on: atsetüülmetioniin, mis on lipotroopne ja maksa kaitsva toimega; l-ornitiin, l-arginiin; l-tsitrulliin (aitavad alandada lämmastiku taset veres); l-lüsiin (l-karnitiini prekursor); glütsiin, tauriin, aspartaamhape ja glutamiinhape, mis aitavad kaasa neerude ja maksa detoksikatsioonile.

Suhkrud: fruktoos ja sorbitool, mis on glükogeense ja antiketogeense toimega.

Ravim toetab valkude, süsivesikute ja rasvade ainevahetust ning hepatotsüütide ja lihasrakkude tegevust.

5. FARMATSEUTILISED ANDMED

5.1 Kokkusobimatus

Ei rakendata.

5.2 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

5.3 Säilitamise eritingimused

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

5.4 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Klaaspudel elastse korgiga ja alumiiniumist äärega.

Pakendi suurus:

Pappkarp, mis sisaldab 1 x 500 ml.

5.5 Erinõuded kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kasutamata jäänud veterinaarravimi või selle jäätmete hävitamiseks kasutada kohalikele nõuetele vastavaid ravimite ringlusest kõrvaldamise skeeme ja veterinaarravimile kehtivaid kogumissüsteeme.

6. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

FATRO S.p.A.

7. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1128

8. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002

9. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2024

10. VETERINAARRAVIMITE KLASSIFIKATSIOON

Retseptiravim.

Üksikasjalik teave selle veterinaarravimi kohta on liidu ravimite andmebaasis (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).