

Kennzeichnung

Gebrauchsinformation

KENOSTART SPRAY AND DIP
3 mg/g Zitzenspray / Zitzentauchmittel (Lösung) für Rinder (Milchkühe), Iod

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

CIDLINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 IEPER
BELGIEN
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com

Bezeichnung des Tierarzneimittels

KENOSTART SPRAY AND DIP
3 mg/g Zitzenspray / Zitzentauchmittel (Lösung) für Rinder (Milchkühe), Iod

Verzeichnis der in den Mitgliedstaaten genehmigten Namen:

KENOSTART SPRAY AND DIP
(Großbritannien, Belgien, Zypern, Estland, Portugal, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Spanien)
KENOSPRAY 3000
(Frankreich)

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

Die Lösung enthält:
Wirkstoff: 3 mg/g Iod

Anwendungsgebiet(e)

Zitzendesinfektion zur Unterstützung der Mastitisprophylaxe bei Rindern.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Jod oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Nebenwirkungen

Wiederholte Anwendung von Jod kann Jodallergie auslösen. Allergische Reaktionen auf Jod können sich in allergischen Hautreaktionen, aber in seltenen Fällen auch als anaphylaktischer Schock äußern.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/ Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart(en)

Rind (Milchkuh)

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

KENOSTART SPRAY AND DIP ist ein dipp- und sprühfähiges Zitzendesinfektionsmittel zur Anwendung unmittelbar nach dem Melken. Das Arzneimittel ist ein gebrauchsfertiges Zitzentauchmittel und Zitzensprühmittel. Wird ein Becher zum Tauchen der Zitzen verwendet, sollte dieser mindestens 5 ml der Tauchlösung fassen. Die Zitzen sind sofort nach dem Melken einzutauchen. Dabei sollen sie über Dreiviertel ihrer Länge vollständig benetzt werden. Beim Einsprühen der Zitzen wird die gesamte Oberfläche jeder Zitze sofort nach dem Melken mit KENOSTART SPRAY AND DIP eingesprüht. Becher oder Sprüher wenn nötig nachfüllen. Becher oder Sprüher nach der Behandlung leeren und vor einer erneuten Verwendung reinigen. Das Arzneimittel ist als Zitzentauchmittel oder Zitzensprühmittel nach dem Melken vorgesehen und kann bis zu zweimal täglich angewendet werden.

Hinweise für die richtige Anwendung

Euter und Zitzen sind vor dem Melken zu säubern und zu trocknen.

Wartezeit

Rind: Essbare Gewebe: 0 Tage
Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Mittel im verschlossenen Originalgebinde aufrecht stehend lagern.

Vor Frost schützen.

Wenn das Mittel eingefroren ist, in einen warmen Raum bringen, langsam auftauen lassen und vor der Anwendung sorgfältig schütteln.

Vor Licht schützen.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 6 Monate.

Nach Ablauf dieser Frist sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

Besondere Warnhinweise

Euter und Zitzen sind vor dem Melken zu säubern und zu trocknen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Die Anwendung bei verletzten Zitzen kann den Wundheilungsprozess verzögern. Es wird empfohlen, die Behandlung bis zur Abheilung der Zitzen auszusetzen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Spritzern in die Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei oraler Aufnahme viel Wasser trinken und sofort medizinischen Rat einholen.
- Fernhalten von Lebensmitteln und Tierfutter.
- Nach Gebrauch Hände waschen.
- Jod hat ein allergenes Potential. Personen mit bekannter Jodüberempfindlichkeit dürfen nicht mit dem Arzneimittel umgehen.

Kann während Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Dieses Arzneimittel wird äußerlich angewendet und kaum resorbiert.

KENOSTART SPRAY AND DIP sollte nicht gleichzeitig mit anderen Euterdesinfektions- oder Pflegemitteln angewendet werden sowie nicht mit anderen Chemikalien, Arzneimitteln oder Zitzenpflegemitteln vermischt werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Abgelaufene oder nicht vollständig entleerte Packungen sind als gefährlicher Abfall zu behandeln und gemäß den geltenden Vorschriften einer unschädlichen Beseitigung zuzuführen

KENOSTART SPRAY AND DIP darf nicht in Gewässer gelangen, da es für Wasserorganismen gefährlich ist.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Oktober 2011

Weitere Angaben

Packungsgrößen: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 60 l und 200 l

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Zitzenspray / Zitzentauchmittel (Lösung)

Zitzenbehandlung

Nur für Tiere

Lot:

EXP:

Zul.-Nr.: 8-00721

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

1 Liter /
5 Liter /
10 Liter /
20 Liter /
25 Liter /
60 Liter
bzw. 200 Liter

Abgabe: Rezeptfrei, Abgabe gemäß § 59 Abs. 7a AMG, auch außerhalb von Apotheken und Drogerien