

## ETIQUETADO

### DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

#### Etiquetas para jeringas de 5 g

○

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BICLOX SECADO 500 mg suspensión intramamaria

#### 2. CANTIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada jeringa (5 g) contiene:  
Cloxacilina (benzatina) ..... 500 mg

#### 3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

5 g

#### 4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

#### 5. TIEMPO DE ESPERA

Lea el prospecto antes de usar.

#### 6. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

#### 7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}  
Una vez abierto el envase, uso inmediato.

#### 8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

**9. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE  
COMERCIALIZACIÓN**

S.P. VETERINARIA, S.A.  
Crta. Reus-Vinyols, Km 4,1 Apto. 60  
43330 Riudoms (ESPAÑA)

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL ENVASE PRIMARIO**

Caja con un blíster con 4 jeringas  
Caja con 15 blísteres con 4 jeringas (60 jeringas)  
Caja con 1 blíster con 60 jeringas

○

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BICLOX SECADO 500 mg suspensión intramamaria

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA**

Cada jeringa (5 g) contiene:  
Cloxacilina (benzatina) ..... 500 mg

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Suspensión intramamaria

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

Caja con 1 blíster con 4 jeringas  
Caja con 15 blísteres con 4 jeringas (60 jeringas)

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino (vacas en secado), ovino (ovejas en secado) y caprino (cabras en secado).

**6. INDICACIONES DE USO****7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA****Bovino:**

- Carne: 28 días.
- Leche: 2 días (48 horas) tras el parto cuando el período de secado es superior a 30 días.  
32 días tras el parto cuando el período de secado es de 30 días o inferior.

**Ovino y caprino:**

- Carne: 28 días
- Leche: 4 días (96 horas) tras el parto cuando el período de secado es superior a 45 días.  
7 días (168 horas) tras el parto cuando el período de secado está entre 30 y 45 días.  
37 días después del tratamiento cuando el período de secado es de 30 días o inferior

**9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}  
Una vez abierto el envase, uso inmediato.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 30°C

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

S.P. VETERINARIA, S.A.  
Ctra. Reus-Vinyols, Km 4,1 Aptdo. 60  
43330 Riudoms (ESPAÑA)

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2821 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}