

# ANHANG III

## KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton mit 50 ml, 100 ml oder 250 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Wellicox 50 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält 50 mg Flunixin, entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml  
100 ml  
250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schwein.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind/Schwein: intramuskuläre Anwendung  
Rind/Pferd: intravenöse Anwendung.

**7. WARTEZEITEN****Wartezeiten:**Rinder:

Essbare Gewebe:

4 Tage (IV Anwendung).

31 Tage (IM Anwendung).

Milch:

24 Stunden (IV Anwendung).

36 Stunden (IM Anwendung).

Schweine:

Essbare Gewebe:

24 Tage (IM Anwendung).

Pferde:

Essbare Gewebe:

5 Tage (IV Anwendung).

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung nicht über 25 °C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**



**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V437771 Durchstechflasche (Glas)

BE-V574746 Durchstechflasche (PP/EVOH/PP)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Etikett von 100 oder 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Wellicox 50 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält 50 mg Flunixin, entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin.

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schwein.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind/Schwein: i.m.

Rind/Pferd: i.v.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN****Wartezeiten:**Rinder:

Essbare Gewebe:

4 Tage (IV Anwendung).

31 Tage (IM Anwendung).

Milch:

24 Stunden (IV Anwendung).

36 Stunden (IM Anwendung).

Schweine:

Essbare Gewebe:

24 Tage (IM Anwendung).

Pferde:

Essbare Gewebe:

5 Tage (IV Anwendung).

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: \_\_\_\_\_

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung nicht über 25 °C lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**




|                              |
|------------------------------|
| <b>9. CHARGENBEZEICHNUNG</b> |
|------------------------------|

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN****Etikett von 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Wellicox

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Flunixin 50 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen:

