

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AquaVac Vibrio Oral

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικά συστατικά

Αδρανοποιημένα κύτταρα *Listonella (Vibrio) anguillarum* strain 78-SKID RPS₆₀(*) > 60% μετά τη χορήγηση

Αδρανοποιημένα κύτταρα *Vibrio ordalii*¹ strain MSC275 RPS₆₀(*) > 60% μετά τη χορήγηση

Φορμαλδεΰδη < 0,5 mg/ml

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

(*)RPS₆₀ : σχετικό ποσοστό επιβίωσης σε εμβολιασμένα, κατά τη χρονική στιγμή θνησιμότητας 60% των μαρτύρων, μετά από εμβολιασμό από το στόμα και επακόλουθη πρόκληση.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πόσιμο γαλάκτωμα

Ανοικτό κίτρινο γαλάκτωμα

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Είδη ζώων

Ιριδίζουσα πέστροφα (*Onchorynchus mykiss*)

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Στην ιριδίζουσα πέστροφα, 12 γραμμαρίων και μεγαλύτερα:

Ενεργητική ανοσοποίηση των ψαριών για τη μείωση της θνησιμότητας από τη δονακίωση που προκαλείται από *Listonella (Vibrio) anguillarum* και *Vibrio ordalii*.

Έναρξη της ανοσίας: 336 βαθμοήμερες σε περίπτωση χρήσης του Aquavac Vibrio Oral σαν αρχικός εμβολιασμός. Η διάρκεια της ανοσίας δεν έχει αποδειχθεί μετά από αυτή.

Για ψάρια που εμβολιάζονται με εμβάπτιση με Aquavac Vibrio Immersion και Injection και επανεμβολιάζονται με Aquavac Vibrio Oral, προστασία έχει παρατηρηθεί μετά από 336 βαθμοήμερες.

4.3 Αντενδείξεις

Να μην εμβολιάζονται ψάρια κατά τη διάρκεια επώασης της δονακίωσης.

Να μην εμβολιάζετε, εάν η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από 10°C.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα βάρη των ψαριών κατά τον εμβολιασμό.

¹Το *Vibrio ordalii* είναι υποείδος του *Listonella (Vibrio) anguillarum* O2

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να εμβολιάζετε μόνο υγιή ψάρια.

Να αποφεύγεται η καταπόνηση κατά τον χρόνο των χειρισμών των ψαριών, όπως επίσης οι διαφορές θερμοκρασίας.

Να μην επαναλαμβάνετε εμβολιασμό με το εμβόλιο Aquavac Vibrio Oral.

Να μην χρησιμοποιείται η τροφή που περιέχει το εμβόλιο εάν παρατηρηθεί μόλυνση από μύκητες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν προετοιμάζετε το εμβόλιο και την εμβολιούχο τροφή.

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Καμία γνωστή

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Λόγω της απουσίας ειδικών μελετών για την ασφάλεια, το εμβόλιο να μη χορηγείται σε γεννήτορες ή σε ψάρια που προορίζονται για γεννήτορες.

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναμνηστικός εμβολιασμός, ακολουθώντας τον αρχικό εμβολιασμό με εμβάπτιση με Aquavac Vibrio Immersion και Injection. Αυτό το σχήμα έχει αξιολογηθεί για ψάρια τουλάχιστον 12 gr στον αρχικό εμβολιασμό.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την ταυτόχρονη χρήση αυτού του εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό κτηνιατρικό προϊόν. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου, θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το προϊόν χορηγείται από το στόμα, αναμεμιγμένο με σύμπτηκτα τροφής, σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο:

Αρχικός εμβολιασμός

Ημέρα 1-5	0,02ml ανά ψάρι ανά ημέρα
Ημέρα 6-10	Τροφή χωρίς εμβόλιο
Ημέρα 11-15	0,02ml ανά ψάρι ανά ημέρα
Σύνολο	0,2ml ανά ψάρι σε 10 ημέρες

Επαναληπτικός εμβολιασμός μετά τον αρχικό εμβολιασμό με Aquavac Vibrio Immersion και Injection: η εμπειρία από την εφαρμογή υποδεικνύει ότι η ανοσία στον αρχικό εμβολιασμό με εμβάπτιση είναι τουλάχιστον 3 μήνες. Όταν η ανοσία μειώνεται, συστήνεται το σχήμα επανεμβολιασμού.

Ημέρα 1-5	0,01ml ανά ψάρι την ημέρα
Ημέρα 6-10	Τροφή χωρίς εμβόλιο
Ημέρα 11-15	0,01ml ανά ψάρι την ημέρα
Σύνολο	0,1ml ανά ψάρι σε 10 ημέρες.

Προετοιμασία της εμβολιούχου τροφής

Το εμβόλιο διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (20°C) για 1 ώρα πριν τη χρήση ώστε το εμβόλιο να γίνει περισσότερο υγρό. Εάν εμφανιστούν 2 διαχωρισμένες φάσεις, η φιάλη πρέπει να ανακινηθεί καλά έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Τα σύμπηκτα τροφής περιστρέφονται αργά σε αναδευτήρα και το εμβόλιο επιχύνεται κατευθείαν πάνω στα σύμπηκτα. Εάν χρησιμοποιείται ψεκαστήρας, πρέπει να ρυθμιστεί να χορηγεί χονδρό ψεκασμό χωρίς τη δημιουργία σωματιδίων αερολύματος και ο περιέκτης του ψεκαστήρα πρέπει να αδειάζει πλήρως κατά την διαδικασία της ανάμιξης. Τα σύμπηκτα τροφής αναμιγνύονται καλά για τουλάχιστον 2 λεπτά ακόμα, μετά την προσθήκη όλου του εμβολίου. Η εμβολιούχος τροφή πρέπει να παραμένει για 1 ώρα πριν τη χρήση ώστε το εμβόλιο να διαποτίσει τα σύμπηκτα πλήρως. Το εμβόλιο μπορεί να αναμιχθεί με όλη ή με ένα μέρος της ημερήσιας ποσότητας τροφής.

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Δεν έχουν σημειωθεί ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τη χορήγηση διπλάσιας δόσης εμβολίου στην πέστροφα.

4.11 Χρόνος αναμονής

Μηδέν βαθμοημέρες

5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ATCvet code: QI 10BB01

Το εμβόλιο προκαλεί ενεργητική ανοσοποίηση κατά της δονακίωσης που προκαλείται από *Listonella* (*Vibrio*) *anguillarum* και *Vibrio ordalii*

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Formaldehyde

Saline

Fish oil

Lecithin

6.2 Ασυμβατότητες

Να μην αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο ή ανοσολογικό προϊόν

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη.

Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στη τροφή:: 10 ημέρες.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως. Μην καταψύχεται.

Εάν αποθηκεύεται εμβολιούχος τροφή, πρέπει να φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος και σε θερμοκρασία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 16°C. Εάν ξεπεραστεί αυτή η θερμοκρασία, η εμβολιούχος τροφή μπορεί να αλλοιωθεί.

6.5 Φύση και σύνθεση του περιέκτη

Φύση της άμεσης συσκευασίας:

Φιάλες υψηλής πυκνότητας πολυεθυλενίου με πώμα βρωμοβουτυλίου και κάλυμμα αλουμινίου.

Φιάλη 1000 ml (10000 δόσεις για επανεμβολιασμό, 5000 δόσεις για αρχικό εμβολιασμό).

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός μη χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

7. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

A.A.K. Κύπρου: CY00118V

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Ημ. Πρώτης έκδοσης (Κύπρος): 22/08/2008

Ημ. Ανανέωσης (Κύπρος): 30/10/2018

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

02/05/2022

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ:¹

AquaVac Vibrio Oral

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
Ολλανδία

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: ²

MSD Animal Health UK, Ltd.
Walton Manor, Walton
Milton Keynes
Buckinghamshire, MK7 7AJ
United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Poligono Industrial El Montalvo I
C/Zeppelin 6, Parcela 38,
37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca)
Spain

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AquaVac Vibrio Oral
Πόσιμο γαλάκτωμα

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Δραστικά συστατικά

Αδρανοποιημένα κύτταρα *Listonella (Vibrio) anguillarum* RPS₆₀(*) > 60% μετά τη χορήγηση strain 78-SKID

Αδρανοποιημένα κύτταρα *Vibrio ordalii*¹ strain MSC275 RPS₆₀(*) > 60% μετά τη χορήγηση

Φορμαλδεΰδη < 0,5 mg/ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ

Ιριδίζουσα πέστροφα (*Onchorynchus mykiss*), 12 γραμμαρίων και πάνω:

Ενεργητική ανοσοποίηση των ψαριών για τη μείωση της θνησιμότητας από τη δονακίωση που προκαλείται από *Listonella (Vibrio) anguillarum* και *Vibrio ordalii*.

Έναρξη της ανοσίας: 336 βαθμοήμερες σε περίπτωση χρήσης του Aquavac Vibrio Oral σαν αρχικός εμβολιασμός. Η διάρκεια της ανοσίας δεν έχει αποδειχθεί μετά από αυτή.

Για ψάρια που εμβολιάζονται με εμβάπτιση με Aquavac Vibrio Immersion και Injection και επανεμβολιάζονται με Aquavac Vibrio Oral, η προστασία έχει παρατηρηθεί μετά από 336 βαθμοήμερες.

¹ Το κείμενο με αυτή τη μορφή θα αποτελεί την ετικέτα της φιάλης. Δεν θα υπάρχει χωριστά φύλλο οδηγιών χρήσης για αυτό το προϊόν.

² Το έντυπο φύλλο οδηγιών θα αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του παρασκευστή που είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση της σχετικής παρτίδας μόνο.

³ Το *Vibrio ordalii* είναι υποείδος του *Listonella (Vibrio) anguillarum* O2

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εμβολιάζονται ψάρια κατά τη διάρκεια επώασης της δονακίωσης.

Να μην εμβολιάζετε, εάν η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από 10°C.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια δεν έχει αναφερθεί. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Ιριδίζουσα πέστροφα (*Oncorhynchus mykiss*).

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το προϊόν χορηγείται από το στόμα, αναμεμιγμένο με σύμπληκτα τροφής, σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο:

Αρχικός εμβολιασμός

Ημέρα 1-5	0,02ml ανά ψάρι ανά ημέρα
Ημέρα 6-10	Τροφή χωρίς εμβόλιο
Ημέρα 11-15	0,02ml ανά ψάρι ανά ημέρα
Σύνολο	0,2ml ανά ψάρι σε 10 ημέρες

Επαναληπτικός εμβολιασμός μετά τον αρχικό εμβολιασμό με Aquavac Vibrio Immersion και Injection: η εμπειρία από την εφαρμογή υποδεικνύει ότι η ανοσία στον αρχικό εμβολιασμό με εμβάπτιση είναι τουλάχιστον 3 μήνες. Όταν η ανοσία μειώνεται, συστήνεται το σχήμα επανεμβολιασμού.

Ημέρα 1-5	0,01ml ανά ψάρι την ημέρα
Ημέρα 6-10	Τροφή χωρίς εμβόλιο
Ημέρα 11-15	0,01ml ανά ψάρι την ημέρα
Σύνολο	0,1ml ανά ψάρι σε 10 ημέρες.

Προετοιμασία της εμβολιούχου τροφής

Το εμβόλιο διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (20°C) για 1 ώρα πριν τη χρήση ώστε το εμβόλιο να γίνει περισσότερο υγρό. Εάν εμφανιστούν 2 διαχωρισμένες φάσεις, η φιάλη πρέπει να ανακινηθεί καλά έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Τα σύμπληκτα τροφής περιστρέφονται αργά σε αναδευτήρα και το εμβόλιο επιχύνεται κατευθείαν πάνω στα σύμπληκτα. Εάν χρησιμοποιείται ψεκαστήρας, πρέπει να ρυθμιστεί να χορηγεί χονδρό ψεκασμό χωρίς τη δημιουργία σωματιδίων αερολύματος και ο περιέκτης του ψεκαστήρα πρέπει να αδειάζει πλήρως κατά την διαδικασία της ανάμιξης. Τα σύμπληκτα τροφής αναμιγνύονται καλά για τουλάχιστον 2 λεπτά ακόμα, μετά την προσθήκη όλου του εμβολίου. Η εμβολιούχος τροφή πρέπει να παραμένει για 1 ώρα πριν τη χρήση ώστε το εμβόλιο να διαποτίσει τα σύμπληκτα πλήρως. Το εμβόλιο μπορεί να αναμιχθεί με όλη ή με ένα μέρος της ημερήσιας ποσότητας τροφής.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δεν ισχύει

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν βαθμοημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται και μεταφέρεται σε ψυγείο (2°C έως 8°C). Να μην καταψύχεται. Να προστατεύεται από το φως.

Να χρησιμοποιείται ολόκληρο το περιεχόμενο μετά το πρώτο άνοιγμα. Τα εμβολιούχα σύμπηκτα τροφής πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 10 ημέρες από την ανάμιξη του εμβολίου. Εάν αποθηκεύεται εμβολιούχος τροφή, πρέπει να φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος και σε θερμοκρασία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 16°C. Εάν ξεπεραστεί αυτή η θερμοκρασία, η εμβολιούχος τροφή μπορεί να αλλοιωθεί.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ψάρια. Να αποφεύγεται η καταπόνηση κατά τον χρόνο των χειρισμών των ψαριών, όπως επίσης οι διαφορές θερμοκρασίας. Να μην επαναλαμβάνετε εμβολιασμό με το εμβόλιο Aquavac Vibrio Oral.

Λόγω της απουσίας ειδικών μελετών για την ασφάλεια, το εμβόλιο να μη χορηγείται σε γεννήτορες ή σε ψάρια που προορίζονται για γεννήτορες.

Να μην χρησιμοποιείται η τροφή που περιέχει το εμβόλιο εάν παρατηρηθεί μόλυνση από μύκητες.

Πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα βάρη των ψαριών κατά τον εμβολιασμό.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν προετοιμάζετε το εμβόλιο και την εμβολιούχο τροφή.

Το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναμνηστικός εμβολιασμός, ακολουθώντας τον αρχικό εμβολιασμό με εμβάπτιση με Aquavac Vibrio Immersion και Injection. Αυτό το σχήμα έχει αξιολογηθεί για ψάρια τουλάχιστον 12 gr στον αρχικό εμβολιασμό.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την ταυτόχρονη χρήση αυτού του εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο.

Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου, θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Να μην αναμειγνύεται με άλλο εμβόλιο ή ανοσολογικό προϊόν.

13. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

02/05/2022

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση -να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου:

Αριθμός Παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Μέγεθος συσκευασίας 1000 ml