

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

OXYTOCINE 10 Un./ml, Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF**

Oxytocin 10 I.E./ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 50 ml

1 x 100 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)****5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

(i.m.- i.v.)

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

V.M.D. n.v.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V104291

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Flasche (50 ml und 100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

OXYTOCINE 10 Un./ml, Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF**

Oxytocin 10 I.E./ml

**3. ZIELTIERARTEN****4. ARTEN DER ANWENDUNG**

(i.m. - i.v.)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

V.M.D. n.v.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}