

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS (dieselben Angaben wie auf einer ÄUSSEREN UMHÜLLUNG)****100 ml-FLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Effipro 2,5 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Fipronil 2,5 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Katze und Hund.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**


Für Tierarzneimittel, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen.

Behandlung eines Flohbefalls (*Ctenocephalides spp.*) bei Hunden und Katzen.Behandlung eines Zeckenbefalls (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bei Hunden und Katzen.Behandlung eines Haarlingsbefalls bei Hunden (*Trichodectes canis*) und Katzen (*Felicola subrostratus*).

Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle von Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden.

Die insektizide Wirksamkeit gegen einen Neubefall mit adulten Flöhen besteht bei Katzen für bis zu 6 Wochen, bei Hunden bis zu 3 Monaten, je nach Umfeld.

Das Tierarzneimittel hat eine persistierende akarizide Wirksamkeit gegen Zecken von bis zu 4 Wochen, je nach Umfeld.



Flöhe und Zecken

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung auf der Haut

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Hochentzündlich.

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

VIRBAC

**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V336953

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS (dieselben Angaben wie auf einer ÄUSSEREN UMHÜLLUNG)****250 ml-FLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Effipro 2,5 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Fipronil 2,5 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Katze und Hund.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**


Für Tierarzneimittel, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen.

Behandlung eines Flohbefalls (*Ctenocephalides spp.*) bei Hunden und Katzen.Behandlung eines Zeckenbefalls (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bei Hunden und Katzen.Behandlung eines Haarlingsbefalls bei Hunden (*Trichodectes canis*) und Katzen (*Felicola subrostratus*).

Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle von Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden.

Die insektizide Wirksamkeit gegen einen Neubefall mit adulten Flöhen besteht bei Katzen für bis zu 6 Wochen, bei Hunden bis zu 3 Monaten, je nach Umfeld.

Das Tierarzneimittel hat eine persistierende akarizide Wirksamkeit gegen Zecken von bis zu 4 Wochen, je nach Umfeld.



Flöhe und Zecken

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung auf der Haut

**7. WARTEZEITEN**

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Hochentzündlich.

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

VIRBAC

**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V336953

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS (dieselben Angaben wie auf einer ÄUSSEREN UMHÜLLUNG)****500 ml-FLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Effipro 2,5 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Fipronil 2,5 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

500 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Katze und Hund.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**


Für Tierarzneimittel, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen.

Behandlung eines Flohbefalls (*Ctenocephalides spp.*) bei Hunden und Katzen.Behandlung eines Zeckenbefalls (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bei Hunden und Katzen.Behandlung eines Haarlingsbefalls bei Hunden (*Trichodectes canis*) und Katzen (*Felicola subrostratus*).

Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle von Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden.

Die insektizide Wirksamkeit gegen einen Neubefall mit adulten Flöhen besteht bei Katzen für bis zu 6 Wochen, bei Hunden bis zu 3 Monaten, je nach Umfeld.

Das Tierarzneimittel hat eine persistierende akarizide Wirksamkeit gegen Zecken von bis zu 4 Wochen, je nach Umfeld.



Flöhe und Zecken

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung auf der Haut

**7. WARTEZEITEN**

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Hochentzündlich.

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

VIRBAC

**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V336953

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}