

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

#### CAJA DE CARTÓN

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Flordofen 300 mg/ml Solución inyectable

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Florfenicol 300 mg/ml

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml  
100 ml  
250 ml

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía subcutánea e intramuscular.

Porcino: Vía intramuscular.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: por IM (a 20 mg / kg de p.v, dos veces): 30 días.

por SC (a 40 mg / kg de p.v, una vez): 44 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 18 días.

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el vial: 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25°C.  
Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Dopharma Research B.V.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2946 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****VIAL****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Flordofen 300 mg/ml Solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Florfenicol 300 mg/ml

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino y porcino

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

Bovino: Vía subcutánea e intramuscular.Porcino: Vía intramuscular.**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: por IM (a 20 mg / kg de p.v, dos veces): 30 días.

por SC (a 40 mg / kg de p.v, una vez): 44 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 18 días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el vial: 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización...

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Dopharma Research B.V.



**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}