

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

Flacons de 500 mL et 750 mL

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution pour perfusion pour bovins  
gluconate de calcium monohydraté + chlorure de magnésium hexahydraté

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Gluconate de calcium monohydraté	240 mg/mL (équivalent à 21,5 mg ou 0,54 mmol de calcium)
Chlorure de magnésium hexahydraté	126 mg/mL (équivalent à 15,1 mg ou 0,62 mmol de magnésium)

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution pour perfusion

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**500 mL  
750 mL**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intraveineuse lente  
Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :  
Viande et abats : Zéro jour  
Lait : Zéro heure

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: à utiliser immédiatement.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Élimination : lire la notice

**13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Alfasan Nederland B.V.  
Kuipersweg 9  
3449 JA Woerden  
Pays-Bas

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-VXXXXXX

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}