

**ETIQUETA-PROSPECTO PARA:
ZOOGAMA-D
Concentrado para emulsión para baño o pulverización**

Símbolo "O" y el Código Nacional XXXXX
250 ml
1 l
5 l

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.
Polígono Industrial El Montalvo I
C/ Zeppelin, nº 6, parcela 38
37008 Carbajosa de la Sagrada-Salamanca

Fabricante responsable de la liberación del lote:

LABORATORIOS ZOTAL, S.L.
Ctra. Nal. 630, KM. 809
41900- Camas - Sevilla

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ZOOGAMA-D
Dimpilato

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Dimpilato (estabilizado) 150 mg

Excipientes, c.s.

4. INDICACIONES DE USO

ZOOGAMA-D está indicado para el control y prevención de la sarna, pulgas, piojos, garrapatas, melófaeos, moscas y sus larvas en ovino.

5. CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales enfermos, convalecientes, débiles, exhaustos o sedientos.

No suministrar a animales con heridas o lesiones abiertas.
No tratar a animales de menos de 4 semanas.

6. REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad cutánea.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta etiqueta-prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Ovino.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso cutáneo (baño o pulverización).

Para eliminar infestaciones por insectos y ácaros previa dilución en agua.

BAÑO: (para infestaciones por ácaros, larvas de moscas, garrapatas, piojos y *Melophagus ovinus*)

Preparar el baño con una solución de 250 mg de dimpilato/l de agua (equivalente a 20 ml de ZOOGAMA-D en 12 litros de agua).

Para reponer el volumen perdido, preparar una solución de 750 mg de dimpilato/l de agua (equivalente a 60 ml de ZOOGAMA-D en 12 litros de agua).

PULVERIZACIÓN: (para infestaciones por larvas de mosca, garrapatas, piojos y *Melophagus ovinus*)

Pulverizar con una solución de 625 mg de dimpilato/l de agua (equivalente a 50 ml de ZOOGAMA-D en 12 litros de agua)

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

La cantidad de producto que se tiene que utilizar debe mezclarse previamente con una pequeña cantidad de agua, agitando y diluyendo después a volumen.

10. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 15 días.

Leche: No usar.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Periodo de validez después de abierto el envase: 6 meses

Periodo de validez después de su disolución según las instrucciones: 6 horas

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie de destino:

No administrar a hembras en lactación cuya leche se destine a consumo humano.

Precauciones especiales para su uso en animales:

No mezclar con ningún otro baño.

Para el tratamiento de sarnas, las ovejas deben sumergirse totalmente en el baño, excepto la cabeza y las orejas, durante no menos de un minuto. La cabeza se sumergirá al menos dos veces, permitiendo respirar al animal entre cada inmersión.

Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas se recomienda bañar a las ovejas en primavera, antes de la paridera. Si la infestación es grave, repetir el baño 6 semanas después.

No bañar a los animales inmediatamente después de comer.

No bañar a las ovejas con menos de 2 semanas de crecimiento de la lana.

No bañar a las ovejas cuando el tiempo sea húmedo y tormentoso; si hace frío o calor extremos, ni cuando la lana está mojada.

Mantener la concentración del baño, rellenándolo cuando el volumen ha descendido en un 10%.

El baño debe vaciarse y limpiarse al final del día con lo que se evita la acumulación de bacterias como *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel, no inhalar los vapores.

Usar guantes, botas de goma, ropa adecuada y mascarilla cuando se maneja el concentrado, el baño y las ovejas recién bañadas o pulverizadas.

En caso de contacto con ojos o piel, lavar inmediatamente. Lavarse la cara, manos y piel expuesta al abandonar el recinto de trabajo.

No fumar, comer, ni beber durante la aplicación del producto. No almacenar junto a bebidas, o alimentos.

Usar el producto en áreas bien ventiladas, preferiblemente al aire libre.

No eliminar el baño en aguas continentales ni en terrenos fácilmente encharcables.

En caso de padecer problemas respiratorios o si se ha presentado malestar persistente tras la manipulación de otros organofosforados, consultar con el médico antes de usar el producto.

Los síntomas de intoxicación son: sensación de cansancio, debilidad que puede ir acompañada de dolor abdominal, diarrea, sudoración y salivación excesiva hasta 12 horas después de la exposición. La intoxicación grave causa convulsiones musculares generalizadas.

Gestación y lactancia:

No se han descrito contraindicaciones en estos periodos.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No administrar con otros inhibidores de la colinesterasa.

No administrar con fármacos depresores del SNC tipo fenotiazinas.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación. La intoxicación por ingestión presenta los síntomas de una intoxicación colinérgica.

- Síntomas muscarínicos: hipersalivación, vómitos, diarrea, miosis y lagrimeo.
- Síntomas nicotínicos: temblores y contracciones musculares.

En la intoxicación como antídoto se usa atropina para bloquear los receptores muscarínicos y un reactivante de la colinesterasa como el 2-PAM.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

El dimpilato es tóxico para abejas, peces, aves y otras formas de vida.

Destruir los envases, restos y baño de forma segura, no contaminar con ellos las aguas continentales.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADA LA ETIQUETA-PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

19 de diciembre de 2014

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

ZOOGAMA-D solución está compuesto de dimpilato estabilizado, antiparasitario externo del grupo de los organofosforados, que actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa del parásito.

Formatos:



Frasco de 250 ml
Frasco de 1 litro
Frasco de 5 litros

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Reg. nº: 1435 ESP

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario

FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de...

TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml

1 l

5 l

NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote: {número}