

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
egyben címke 1 literes és 5 literes tartálynak

Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

V.M.D. nv/sa. Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk, Belgium

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártók:

Chemark Termelő és Kereskedő Kft. 8182 Peremarton-gyártelep, Tulipán utca

V.M.D. nv/sa Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk, Belgium

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag: diazinon: 600g/liter

Segédanyagok: emulzióképző anyagok, butil-hidroxitoluol és Solvesso 100

4. JAVALLATOK

A vízzel stabil emulziót képező ektoparazitikum alkalmas a juhok rühösségének (*Sarcoptes scabiei var. ovis*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*), tetvességének, (*Bovicola ovis*), paklincsosságának (*Melophagus ovinus*) és a légynyüvességének (*Lucilia sericata*, *Wolfarthia magnifica*) kezelésére és megelőzésére. Az állatok kezelésével egyidejűleg a juhok tartási környezetét, az istállót és a berendezési tárgyakat is kezelni szükséges.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható hígítás nélkül.

Ne kezeljünk beteg, gyenge, kimerült és szomjas állatokat!

Nem alkalmazható három hetesnél fiatalabb bárányok kezelésére.

A készítménnyel tejtermelő juh, macska, madár, baromfi, hal és méh nem kezelhető.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Organofoszfát típusú mérgezés előfordulhat, a tünetei a nyálzás, izzadás, izomrémgés, hiperventilláció, hiperesztézia, hányás, midriázis, tudatzavar.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ

Juh



8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A készítmény kizárólag külsőleg alkalmazható.

Juhok merülő fürösztéséhez 250 mg/l diazinon tartalmú induló töménységű emulziót kell alkalmazni: 425 ml Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.-t adunk 1000 liter csapvízhez.

A fürösztő emulziót a felhasználás előtt kell elkészíteni, a hígításhoz csapvizet használjunk. Folyamatos keverés szükséges a hatóanyag egyenletes eloszlása céljából. Az elkészített emulziót 24 órán belül fel kell használni!

A fürösztő emulziót a fogyással arányosan pótolni kell: ha 10 % elfogyott, akkor a fogyás pótlására 750 mg/l diazinon tartalmú Novacidol emulziót kell készíteni, ami 1250 ml Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz készítmény juhok részére A.U.V. 1000 liter vízhez történő adagolásával érhető el.

A juhokat kb. 30-60 másodpercre teljesen bele kell meríteni a fürösztő emulzióba, egy másodpercre a fejüket is be kell mártani, közben ügyelni kell arra, hogy ne iganak belőle, vagy ne aspirálják azt.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A kezelés időpontja és gyakorisága függ a fertőzöttség mértékétől, az ektoparaziták fejlődési ciklusától, és a környezeti feltételektől.

A rühös, vagy rühösségre gyanús állatokat 7-10 napos időközzel kétszer kell fürösztöni.

A hatóanyag megtapad a bőr felületén, oldódik a gyapjúsírban, s ezért hosszabb védőhatást fejt ki külső élősködőkkel szemben. Rühatkákkal fertőzött juhok kezelését célszerű a nyírást követő 4-6 héten belül elvégezni, mivel akkor már rendelkeznek elegendő vastagságú gyapjúréteggel, hogy a hosszabb védőhatáshoz szükséges mennyiségű 2-3 liter folyadékot felvegyék. Légnyüvesség esetén a kezelés hatékonyságát növeli, ha az imágók kezelését az első bábok kikelését megelőzően hajtják végre.

A csoportos kezelést lehetőleg a reggeli órákban, kültéri medencében, esőmentes időben kell végezni. Az együtt tartott állatokat egyidejűleg kell kezelni. Egyedileg, kádban is lehet fürösztöni, de kezelni ez esetben is a szabadban vagy jól szellőző helyiségben lehet. Az ampullás kiszerezés esetében egy ampullát (5 ml) 12 liter vízben kell elkeverni.

A fürdetést parlagon lévő, nem gabonatermelő területen kell végezni.

A kezeléssel egyidejűleg a juhok tartózkodási helyét, az istállót és berendezési tárgyakat is le kell permetezni, vagy le kell mosni 2,5 %-os töménységű Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.-vel. Ehhez 200 ml koncentrátumot öntsünk 5 liter csapvízbe. Öt liter permetlé szükséges 100 m² felületre.

Az istálló kezelésével egészségügyi gázmestert kell megbízni. A permetezés, vagy lemosás csak az üres istállóban, az állatok távollétében végezhető el.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Juh

Hús és egyéb ehető szövetek: 28 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra tejet termelő juhok kezelésére nem engedélyezett.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25°C alatt tárolandó. Fagyástól óvni kell. Közvetlen napfénytől védve tartandó.

Száraz, jól szellőző és jól zárható helyen, eredeti csomagolásban és jól lezárva tartandó.

Használat után a tároló edényt jól le kell zárni.

A szer gyúlékony!



12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A koncentrátum fokozottan tűzveszélyes! Mérgező! A készítmény használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és az óvintézkedéseket.

Veszély

		
GHS05	GHS07	GHS09

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan

Gátoljuk meg, hogy a juhok a fűrésztő emulzióból igyanak vagy aspirálják, ezért fűrésztés előtt adjunk inni az állatoknak. A macskákra és a madarakra mérgező! Mérgező a méhekre, a halakra és a gerinctelen édesvízi és tengeri élőlényekre! A koncentrátum fokozottan tűzveszélyes! Mérgező! A készítmény használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és az óvintézkedéseket.

Szem- és bőrizgató hatású. Lenyelés vagy belélegzés esetén a tüdőt károsíthatja.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

Négy hetesnél fiatalabb állatok esetén kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. Esőben ne kezeljünk, mert csökken a kezelés hatékonysága.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Kerüljük el, hogy a szer bőrre, szembe kerüljön! Kerüljük el a készítmény lenyelését vagy az inhalációját. Az emulzióval végzett munka ideje alatt vízhatlan védőruha, védőkötény, védősapka, szem/arcvédő, gumicsizma, gumikesztyű viselése szükséges! Permetezéskor védőruhát, védőkesztyűt, fejkvédőt, gumicsizmát, A1B2E1K1-P2 vagy annak megfelelő kombinált szűrőbetétellátott légzésvédő álarcot kell viselni.

Használat után kezét, arcot és haját kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, és ki kell mosni! A munkavégzés során felhasznált eszközöket el kell mosni. Véletlen bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, legalább 15 percig kell öblíteni, majd orvoshoz kell fordulni. Mérgezés gyanúja vagy rosszullét esetén a munkát azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Véletlen lenyelés esetén hánytatás és gyomormosás szükséges, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. A beteg kórházi megfigyelése még tünetmentes esetekben is legalább 12 óráig javasolt.


Ellenszere az atropin, súlyos mérgezési tünetek esetén hemoperfúzió, és amennyiben rendelkezésre áll, kolinészteráz reaktivátor (pralidoxim) adása. Több ampulla atropin iv. beadása szükséges, az atropinizáció tüneteinek megjelenéséig. Az atropinizációt mindaddig folytatni kell, amíg a fokozott bronchus szekréció meg nem szűnik.

Tahikardia, tág pupillák esetén nem kontraindikált az atropin adagjának növelése. A szérum- és vörösvértest kolinészteráz aktivitás monitorozása szükséges. Elhúzódó felszívódás miatt az atropin kezelést csak fokozatosan szabad leállítani, és csak akkor, ha a szérum és a vörösvértest kolinészteráz szint legalább a normálérték alsó határának a felét elérte. Mérgezés esetén morfin, teofillin, aminofillin, fenotiazinok, furoszemid, izomrelaxánsok adása kontraindikált!

Alkalmazás közben enni, inni, dohányozni tilos.

Vemhesség és laktáció: Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején. Alkalmazása vemhesség alatt nem javasolt.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók: Más organofoszfát és karbamát típusú vegyülettel együtt nem adható! A máj mikroszomális enziminduktorai növelik a diazinon toxicitását.



Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)

Túladagolás esetén szerves foszforsavészter típusú mérgezés fordulhat elő, a tünetei a nyálzás, izzadás, izomremegés, hiperventilláció, hiperesztézia, hányás, midriázis, tudatzavar. A diazinon kolinészteráz inhibitor, méreg! Ha a kezelt állatokon mérgezési tünetek mutatkoznak, azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Ellenszere az atropin; oxim-készítmények, (obidoxim, pralidoxim) melyeket csak az állatorvos adhat be.

Inkompatibilitások: Savas vagy lúgos közegben bomlik. Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény maradéka vagy az elkészített fűrésztő oldat nem kerülhet nem kerülhet a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba, természetes vizekbe, vagy a talajba, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre!

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni. A tárolótartályokat, a hígításhoz és a fűrésztéshez használt tartályokat, eszközöket többször öblítsük át, az erre kijelölt helyen biztonságosan tároljuk! A fűrésztés utáni maradék oldat hatóanyag tartalma 6-10 napon belül elbomlik, az észterkötés felbomlását savas vagy lúgos pH katalizálja. Gyakorlati biztonságos megsemmisítés lehet a maradék komposztálása 60 napig, másik módszer 5-10 kg oltott mészh keverése 1000 liter munkaoldathoz. Az oltott mészh hatására a diazinon 24-48 órán belül lebomlik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2020. január 7.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**Kiszerelési egységek**

5x5 ml barna üveg ampullában és papírdobozban, 1 liter és 5 liter csavaros zárású, koextrudált műanyag tartályban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.>

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Kizárólagos forgalmazó:

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
8000 Székesfehérvár, Homokosor 7

16. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

17. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA / TÖRZSKÖNYVI SZÁM

Törzskönyvi szám:

2669/2/10 MgSzH ÁTI (1 liter)

2669/3/10 MgSzH ÁTI (5 liter)

18. LEJÁRATI IDŐ

Felh. {hónap/év}

A fűrésztő emulziót az elkészítésétől számított 24 órán belül fel kell használni.

19. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: {szám}

