

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Dénomination du médicament vétérinaire

PARKAN COLLIER DIMPYLATE POUR CHATS

2. Composition qualitative et quantitative

Un collier de 14 g contient :

Substance(s) active(s) :
Dimpylate 2,1 g

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ».

3. Forme pharmaceutique

Collier.

4. Informations cliniques

4.1. Espèces cibles

Chats.

4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Affections à parasites sensibles au dimpylate.

Chez les chats :

- Elimination des puces et des tiques.
- Prévention des nouvelles infestations pendant une période de 4 mois pour les puces et de 3 mois pour les tiques.

4.3. Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chatons de moins de trois mois.

Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées.

4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Enlever le collier dès les premiers signes d'intolérance.

4.5. Précautions particulières d'emploi

i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Enlever le collier si le chat est lavé et le remettre lorsque le poil est sec. L'efficacité du collier peut-être réduite si le poil est mouillé de façon répétée et significative (pluie, bain). Dans ce cas, le collier doit être changé plus précocement.

La fixation d'une tique reste possible. Par conséquent, la transmission de maladies infectieuses par ce parasite ne peut être totalement exclue si les conditions sont défavorables.

ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l'animal.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant la pose du collier.

Eviter le contact avec la peau.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier.

iii) Autres précautions

Aucune.

4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)

Une irritation peut apparaître au niveau du cou de l'animal du fait du port du collier. Dans ce cas, ôter le collier jusqu'à disparition des symptômes.

Des effets indésirables ont été observés chez le chat : principalement tremblements, hypersalivation, anorexie, léthargie, et mydriase. Le traitement est symptomatique et éliminatoire.

4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

Les études menées chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène du dimpylate, mais une embryotoxicité et une maternotoxicité ont été notées.

L'innocuité de la spécialité chez la chatte en gestation ou allaitante n'a pas été montrée. Le dimpylate ayant un passage systémique et l'exposition se prolongeant plusieurs mois, l'utilisation de cette spécialité chez la chatte en gestation ou allaitante est déconseillée.

4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Ne pas utiliser d'autres insecticides organophosphorés sur l'animal tant que celui-ci porte le collier.

4.9. Posologie et voie d'administration

Usage externe.

Un collier par animal.

Ajuster la longueur du collier de manière à pouvoir passer un doigt entre le cou et le collier. Couper le bout de collier en excès.

4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Les principaux symptômes observés lors d'une intoxication accidentelle par les insecticides organophosphorés sont une hypersalivation, une diarrhée, un encombrement bronchique, des tremblements et des convulsions. Le traitement d'une intoxication accidentelle repose essentiellement sur l'administration de sulfate d'atropine.

4.11. Temps d'attente

Sans objet.

5. Propriétés pharmacologiques

Groupe pharmacothérapeutique : antiparasitaire externe pour usage externe, organophosphorés.
Code ATC-vet : QP53AF03.

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Le dimpylate (ou diazinon) est une molécule de la famille des organophosphorés. Il se caractérise par son activité insecticide. Agissant par inhibition des cholinestérases, le dimpylate provoque une accumulation d'acétylcholine qui conduit à un empoisonnement irréversible des insectes.

5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques

En application topique, le dimpylate est absorbé, mais l'absorption dermique n'a pas été quantifiée.

6. Informations pharmaceutiques

6.1. Liste des excipients

Huile de soja époxydée
Phtalate de dibutyle
Polychlorure de vinyle
Mélanges maître noir (collier noir)
Mélanges maître brun (collier marron)
Mélanges maître vert (collier vert)
Mélanges maître bleu (collier bleu)
Mélanges maître rouge (collier rouge)
Mélanges maître jaune (collier jaune)
Mélanges maître beige (collier beige)

6.2. Incompatibilités majeures

Aucune connue.

6.3. Durée de conservation

Durée de conservation du médicament tel que conditionné pour la vente : 2 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

A conserver dans le conditionnement d'origine.
Ne pas conserver à une température supérieure à 30°C.

6.5. Nature et composition du conditionnement primaire

Coque thermoformée Barex

Sachet (polyéthylène téréphtalate, polyéthylène basse densité, aluminium et Surlyn®)

6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Le dimpylate est toxique pour les organismes aquatiques.

7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BEAPHAR
2 ALLEE VIVALDI
LE SAN GIORGIO
06800 CAGNES SUR MER
FRANCE

8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/6923845 1/2004

Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux noir
Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux marron
Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux vert
Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux bleu
Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux rouge
Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux jaune
Carte de 1 coque thermoformée de 1 collier médicamenteux beige
Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux noir
Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux marron
Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux vert
Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux bleu
Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux rouge

Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux jaune
Boîte de 1 sachet de 1 collier médicamenteux beige

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation

01/09/2004 - 01/09/2009

10. Date de mise à jour du texte

20/05/2022